



Овцеводство на Харьковской учебной фермѣ.

Фермская племянная овчарня основана спустя нѣсколько лѣтъ послѣ открытія фермы (въ 1849 г.) съ цѣлью дать возможность хозяевамъ получать для своихъ стадъ хорошихъ производителей и тѣмъ избавить ихъ отъ выписки таковыхъ изъ заграницы, соединенной всегда съ большими затрудненіями,—а съ 1854 г. служить пособіемъ для учениковъ при демонстративномъ изученіи овцеводства.

Первая заведенная порода—чистокровная негретти—въ чистомъ видѣ держалась на фермѣ по 1869 годъ. Къ 1866 г. порода негретти начала перерождаться: произошли ухудшенія, какъ въ качествѣ шерсти, такъ и въ тѣлосложеніи овецъ, а потому явилась необходимость въ возобновленіи крови. Въ 1869 году были выписаны изъ Ransinà (въ Помераніи) бараны и матки породы рамбулье и негретти (по два номера барановъ той и другой породы), для того, чтобы частью освѣжить негретти, а главное произвести полукровныхъ рамбулье-негретти и дать совершенно другое направленіе стаду. Въ 1870 году фермское стадо состояло, такимъ образомъ, изъ чистыхъ рам-

булье, негретти и помѣси, происшедшей отъ смѣшенія фермскихъ негретти съ выписанными рамбулье. Въ послѣдующіе годы количество полукровныхъ старались увеличить, а чистокровныхъ и негретти уменьшить по слѣдующимъ причинамъ: 1) негретти, освѣжонная выписнымъ бараномъ, вполнѣ улучшилась въ своихъ качествахъ, приобрѣла полноту тѣла, густоту и уравниность руна и потому шерсти, — качества, къ которымъ ферма и стремилась. 2) Отъ смѣшенія негретти съ рамбулье получился хорошій приплодъ, вполнѣ удовлетворившій предположенной цѣли — получить овцу, которая бы при хорошемъ ростѣ и полнотѣ тѣла дала густую, ровную и тонкую шерсть. Нѣкоторые экземпляры одногодовалыхъ баранчиковъ давали въ 1870 году по 18 фунт. грязной шерсти, а чрезъ два года, въ 1873 году, получились баранчики и ярки, которые по своимъ качествамъ шерсти (по тонинѣ, достигавшей электы) и формамъ тѣла, вполнѣ уже удовлетворяли требованіямъ строгой бонитеровки. Всѣ негретти давали сравнительно небольшое количество шерсти и при томъ плохихъ качествъ. 4) Чистые негретти и рамбулье, оказались болѣе чувствительными къ разнымъ невздамъ, чѣмъ полукровныя рамбулье-негретти, — чаще болѣли, не смотря на то, что пользовались большими вниманіемъ со стороны хозяйства; новорожденные ягнята отъ нихъ были слабы, хилы и смертность между ними доходила до 50⁰/о; матки чистокровныя хуже другихъ выносили мокрѣя и песчанья фермскія пастбища. Вслѣдствіе такихъ причинъ въ 1873 г. уже всѣ матки негретти были случены съ баранами рамбулье, а частью съ полукровными.

Чтобы придать болѣе постоянства и упрочить за полукровными лучшія формы тѣлосложенія и лучшія качества шерсти, въ 1873 году всѣ полукровныя ярки рамбулье-негретти были случены съ своимъ отцомъ-бараномъ, выписаннымъ въ 1869 году. Изъ двухъ барановъ рамбулье и двухъ негретти, выписанныхъ въ 1869 году, по тщательной бонитировкѣ, 3 оказались совершенно непригодными для улучшения стада и только одинъ баранъ изъ породы рамбулье оказался годнымъ производителемъ. Приплодъ отъ кровнаго смѣшенія 1874 года получился съ ненормальнымъ, тощимъ тѣлосложеніемъ и съ задатками болѣзненности, что вполнѣ зависело отъ кровнаго смѣшенія (интересно, что отъ этого смѣшенія родились индивидуумы съ пятнами). Несчастіе угрожавшее фермскому овцеводству, можно было только исправить выпискою барановъ, что и было сдѣлано въ томъ же 1874 году. Освѣжонное полукровное овцеводство, уже въ первой генерации 1875 года, получило прежній характеръ. Но кромѣ того, выписанные бараны дали возможность окон-

чательно уничтожить чистокровныхъ рамбулье и увеличить количество рамбулье-негретти. Затѣмъ, до 1878 г. уже не было никакихъ выписокъ; улучшение стада шло, частью, подборомъ матокъ къ выписнымъ баранамъ, а частью, случкою матокъ съ своими баранами, полученными отъ полукровныхъ генераций 1870 и послѣдующихъ годовъ. Къ 1878 году, фермское стадо состояло почти изъ однихъ полукровныхъ овецъ. Но чтобы вполнѣ установить полукровную породу, съ ея выработавшимся характеромъ, въ 1878 году, съ разрѣшенія департамента земледѣлія и сельской промышленности, былъ выписанъ баранъ, породы рамбулье, съ которымъ полукровныя матки и были случены въ 1879 году, а въ 1880 году, благодаря любезности фермскаго бонитера, г. Баюра, были случены съ привезенными имъ изъ Rancia пятью баранами породы рамбулье.

Изъ сказаннаго видно, что фермское стадо получило съ 1869 года совершенно другое направленіе, а именно: старались получить овцу, которая при большомъ ростѣ, объемистомъ тѣлѣ, давала бы большое количество густой, тонкой, комвольной шерсти и притомъ, хорошо сносила бы плохое фермское пастбище. Это было достигнуто, благодаря заботливости бонитера г. Коха, — подборомъ производителей съ удовлетворяющими направленію качествами, не обращая вниманія на чистокровность. Выработался въ продолженіи 10-ти лѣтъ совершенно обособленный и однообразный типъ стада съ извѣстными характерными качествами, какъ въ формахъ тѣла, такъ и въ шерсти, качества эти установились, передаются въ наслѣдство и позволяютъ назвать стадо до извѣстной степени фермскою породою, такъ что одинъ овцеводъ выразился „покажите въ Америкѣ мнѣ это стадо и я скажу, что оно привезено съ фермы“.

Для овцеводства южныхъ губерній маленькое стадо фермы (400 головъ) имѣетъ то значеніе, что доставляетъ хорошихъ производителей, чему доказательствомъ служатъ лестные отзывы покупателей овцеводовъ и количество продаваемыхъ ежегодно на племя овецъ.

Шерсть отъ фермскихъ овецъ, по наружному виду, далеко не отличается тѣми хорошими качествами, какими отличается напримѣръ шерсть у овецъ, пасущихся на хорошихъ травянистыхъ степяхъ; она грязна, содержитъ много пыли, вслѣдствіе чего бываютъ въ ней и другіе пороки, обуславливающіеся болотнымъ и песчанымъ пастбищемъ.

Пастбище на фермѣ не представляетъ выгодныхъ условій для овцеводства; низменное положеніе луга, съ его болотами и трясины, совершенно не годно для выгона овецъ, что дознано многолѣтнимъ опытомъ; сѣно луговое съ своими кислыми злаками и другими болотными растеніями (хвощомъ, камы-

шомъ, осоками) не даетъ хорошаго зимняго корма; пески, окружающіе усадьбу и осушонное торфяное болото по причинѣ плохой растительности не даютъ достаточно подножнаго корма, и только поля изъ-подъ травъ, озимыхъ, и яровыхъ посѣвовъ, даютъ на короткое время болѣе порядочный кормъ, такъ какъ яровыя поля въ августѣ мѣсяцѣ уже начинаютъ пахать; тѣмъ не менѣе фермскія овцы хорошо выдержаны, гнилымъ, а также повальнымъ болѣзнями, воспаленію, чахоткѣ, анеміи, мокрецу и другимъ гнилостнымъ болѣзнями не подвергаются, а это ясное доказательство, что при разумномъ веденіи дѣла и съ знаніемъ можно безъ особеннаго труда бороться съ неблагоприятными естественными условіями для тонкоруннаго овцеводства. Въ зимнее время овцы содержатся въ тепломъ сараѣ, разбитомъ на нѣсколько отдѣленій — для барановъ племенныхъ, для барановъ вообще и матокъ съ ягнятами. Главнымъ кормомъ служитъ мелкое (отавное) луговое сѣно и сѣно посѣвныхъ травъ, которое дается по три раза въ день, добавочнымъ же кормомъ служитъ салата, даваемая въ загородяхъ. Овесъ и отруби даются преимущественно племеннымъ баранамъ и маткамъ предъ и послѣ окота; соль въ видѣ ледянки развѣшивается и потребляется *ad libitum*, — горкія травы даются иногда какъ гігіеническія средства. Водопой лѣтомъ въ рѣчкѣ Лопани, а зимою въ кошарѣ. Оспа не прививается. Бонитировка овецъ производилась до 1878 года извѣстнымъ бонитеромъ Кохомъ, который и далъ настоящее направленіе ферменному стаду; съ 1879 года бонитеромъ состоитъ г. Баіоръ ученикъ Зеттегаста.

Г. Баіоромъ принята бонитировка, выработанная уже германскими овцеводами на съѣздахъ и основанная на физическихъ свойствахъ шерсти и на формѣ тѣла. Стрижка овецъ начинается въ половинѣ мая. Шерсть сбывается на Троицкой ярмаркѣ въ городѣ Харьковѣ. Сортъ шерсти колеблется между электа и кварта. Экземпляры съ болѣе грубыми сортами шерсти бракуются.

Макшиновичъ.