

*Чрезмѣрное мочетеченіе*

(*Diabetes, polyuresis*).

*Син.* мочевоѣ поносъ, uorrhoea, diarrhoea urinosa, hydrops ad matulam, dipsacus, phthisuria.

§ 245.

Такъ называется чрезмѣрно умноженное и въ качествѣ измѣненное отдѣленіе и испражненіе мочи, сопряженное съ изнуреніемъ тѣла и многими другими припадками, состоящими въ причинномъ отношеніи съ означеннымъ отдѣленіемъ мочи.

§ 246.

*Явленія.* Мочетеченію сему *предшествоуютъ* обыкновенно признаки разстроеннаго пищеваренія: кислая отрыжка, напряженіе подъ ложечкою, иногда рвота кислою матеріею, сильнѣйшій позывъ на пищу и томительная жажда съ сухостію во рту, учащеннымъ понужденіемъ къ мочеиспражненію, нѣкоторымъ худѣніемъ тѣла, усталостію, разстройствомъ общаго чувствованія и болями, наипаче въ икрахъ.

Въ совершенно *развившейся болѣзни* главные припадки составляютъ: а) *качественно и количественно измѣненное отдѣленіе мочи*, которая, въ большей части случаевъ, имѣетъ запахъ меда, или фіалки, а вкусъ сладковатый (*diabetes mellitus*), рѣже бываетъ безвкусная (*diabetes insipidus*), а еще рѣже мутная, молочной сывороткѣ подобная (*chyluria*). Количество ея значительно



умножается, превосходя не рѣдко во многомъ количество принимаемаго питья, такъ что иногда при употребленіи 7 фунтовъ пищи и напитковъ, мочи испражняется въ сутки до 40 ф. и болѣе (*P. Frank*). Она вообще бываетъ очень блѣдная, прозрачная и, по недостатку щелочности, въ короткое время переходитъ въ кислое броженіе; однакожъ въ послѣднемъ періодѣ, при наступленіи изнуренія, воспринимаетъ мутный видъ и алкалическое свойство. б) *Ограниченное отдѣленіе прочихъ испражнений*, отъ чего произраждается запоръ на низъ, кожа бываетъ жесткая и сухая и часто слупливается отрубееобразными чешуями. в) *Состраданіе пищеварительнаго аппарата*, выражающееся преимущественно жаждою, возрастающею иногда до невѣроятной степени и голодомъ, простирающимся нерѣдко до болѣзненной прожорливости, причемъ оказывается также мучительное жженіе въ желудочной сторонѣ, частая, кислая отрыжка, выходженіе вязкой, кислой слюны, иногда подобное цыготному состояніе десенъ и зубовъ, различно обложенный, то чистый, то очень красный, то черный языкъ. d) *Состраданіе нервной системы*, куда относятся чувство усталости и ослабленія, ощущеніе холода въ нижнихъ конечностяхъ и поясницѣ, боли въ лямкахъ, икрахъ и крестцѣ, уменьшеніе или совершенное уничтоженіе дѣтороднаго побужденія, иногда измѣненіе голоса, параличныя припадки мочевого пузыря и другихъ частей, глазныя тускъ, угнетенное состояніе сердечно-душевной способности и пр. е) *Пороки плотоуподобленія*, обнаруживающіеся общимъ худосочнымъ состояніемъ и изнуреніемъ всего тѣла, иногда водянистыми



опухолями, накожными сыпями, наипаче лишаями и пр.

§ 247.

Что касается до *результатовъ*, получаемыхъ отъ *вскрытія труповъ*, то по онымъ доселѣ не найдено никакихъ постоянныхъ измѣненій въ мочевыхъ органахъ. Гораздо чаще у страдавшихъ сего болѣзнію открываемы были пороки въ печени, селезенкѣ, брыжейкѣ и преимущественно въ грудныхъ органахъ, кои однакожъ показываютъ болѣе случайныя послѣдствія и сопряженія, нежели существенныя причинныя отношенія къ чрезмѣрному мочеотдѣленію.

§ 248.

*Теченіе.* Мочевой поносъ образуется всегда постепенно и, возрастая мало по малу, оканчивается общимъ изнуреніемъ тѣла, либо водяною болѣзнію. Теченіе его рѣдко бываетъ острое, но вообще продолжительное, распространяющееся на нѣсколько лѣтъ. Нѣкоторыми авторами замѣчено было и періодическое наступленіе онаго.

§ 249.

*Причины* сей болѣзни еще мало извѣстны. Она случается какъ у полносочныхъ, такъ и худощавыхъ, какъ у крѣпкихъ, такъ и слабыхъ, какъ у богатыхъ, такъ и очень бѣдныхъ людей и нещадитъ, по видимому, ни



возраста, ни пола. Впрочемъ ослабляющій родъ жизни съ таковою же діѣтою весьма много располагають къ сему страданію. Къ случайнымъ причинамъ причисляются: простуда, чрезмѣрное употребленіе молодыхъ кислыхъ винъ и такового же пива, угнѣтающія душевные возмущенія, особливо заботы, печаль, сердечныя сокрушенія и пр., онанія и распутства въ физической любви, переносы на мочевые органы составоленной, венерической, золотушной матеріи и накожныхъ сыпей, укушеніе нѣкоторыхъ змѣевъ, какъ *coluber dipsas* (оттуда *dipsacus*).

§ 250.

*Сущность* мочевого поноса съ вѣроятностію можетъ быть полагаема въ трехъ болѣзненныхъ элементахъ:

1.) Въ первоначальномъ динамическомъ особеннаго рода разстройствѣ пищеварительныхъ органовъ, наипаче желудка.

2) Въ неправильномъ плотоподобленіи, происходящемъ отъ порочнаго пищеваренія, приготовленія питательнаго сока и кровотворенія и основывающемся на чрезмѣрной склонности къ окисанію и преимущественномъ образованіи растительнаго свойства соковъ.

3) Въ возвышенной дѣятельности почекъ при ограниченномъ антагонистически отпращиваніи кожного органа и нижней части кишечнаго канала, въ слѣдствіе чего почки содѣлываются въ семъ случаѣ какъ бы привычнымъ, замѣняющимъ ихъ отдѣлительнымъ органомъ и по причинѣ существующаго не правильнаго уподобленія



выводятъ изъ тѣла, вмѣсто алкалическимъ веществъ, избытокъ растительныхъ матерій и кислотъ.

§ 251.

*Предсказаніе* въ сей болѣзни весьма не благопріятно, ибо она, въ настоящемъ видѣ своемъ, хотя облегчается и отъ дѣятельнаго лѣченія перестаетъ на время, но радикально почти никогда не излѣчивается. Облегченія тѣмъ скорѣе можно ожидать, чѣмъ заблаговременнѣе и тщательнѣе будетъ предпринято лѣченіе. Въ застарѣлыхъ случаяхъ обыкновенно бываетъ не благополучный исходъ. *Diabetes insipidus* гораздо удобнѣе излѣчивается, нежели *mellitus*.

§ 252.

*Лѣченіе.* а) *По причиннымъ показаніямъ* требуется уклоненіе случайныхъ или возбуждающихъ причинъ, кои однакожъ, къ сожалѣнію, рѣдко могутъ быть открываемы, либо состоятъ въ проходящихъ моментахъ, а потому и не составляютъ собственно предмѣта, заслуживающаго особенное вниманіе врача. Въ большей части случаевъ должно дѣйствовать вмѣстѣ и на причины и на сущность болѣзни.

б) *По существеннымъ показаніямъ* лѣченіе можетъ быть основываемо на главныхъ трехъ моментахъ, составляющихъ собственно сущность болѣзни (§ 250). Посему здѣсь должно стараться:

1.) *Неправильное настроеніе отправления пищеварительныхъ органовъ, наипаче желудка, приво-*



*дитъ въ нормальное состояніе.* Въ семъ отношеніи весьма хорошо дѣйствуетъ часто повторяемое употребленіе рвотныхъ, тошнотворное лѣченіе посредствомъ ипекакуанника (N 53), либо сѣрнокислої амміачной мѣди (sulphas cupri et ammoniæ), измѣняющія и разрѣшающія лѣкарства, особливо sulphuretum antimonii, æthiops antimonialis et mercurialis, сладко-горькій пасленъ, ревень, свѣжая бычачья желчь, сабуръ, свѣже-выматые соки изъ разрѣшающихъ травъ, иногда всасывающія, противукислотныя (N 83, 84, 85.), наконецъ горькія укрѣпляющія лѣкарства на пр. симаруба, исландскій мохъ, горькій трилистникъ и пр.

2) *Дѣйствовать на репродуктивную способность такъ, чтобы преимущественная склонность ея къ избыточному образованію растительныхъ веществъ въ тѣлѣ уничтожалась и замѣнялась нормальнымъ, болѣе животнымъ образованіемъ.* На сей конецъ необходимо нужно предписывать т. н. животную діету, или исключительное употребленіе одной животной пищи, на пр. по утру давать пить коровье молоко, смѣшанное по поламъ съ известковою водою, либо настой чая съ мяснымъ бульономъ изъ говядины или баранины, яицы въ смятку, на завтракъ часть колбасы, приготовляемой изъ крови и жира (Blutwurst); за обѣдомъ крѣпкій мясной бульонъ, жареная говядина, или другое мясо, преимущественно жирное и даже промзглое, если желудокъ переносить; вечеромъ тоже что и по утру, также сыръ; для питья вообще животное молоко, либо настой перечной мяты съ раствореннымъ въ ономъ яичнымъ бѣлкомъ. Для возбужденія



желудка позволяется, буде жаляетъ больной, пить съ молокомъ нѣсколько араку, рому, хорошей водки. При таковой діетѣ дается сперва растворъ сѣрнокислаго поташа ежедневно отъ 1 до 2 драхмъ, а потомъ ammonium hydrogenatosulphuratum (liquor fumans Boylii), начиная отъ 3 или 4 и постепенно восходя до 12 капель четыре раза въ день вмѣстѣ съ опіемъ и сюрмяными средствами. Больной долженъ носить шерстяную рубашку и по утру натирать кожу каждый день жиромъ (*Rollo*). Въ упорныхъ случаяхъ можно испытывать голодное лѣченіе, или втираніе ртути до значительнаго слюнотеченія (*Гуфеландъ*), какъ средства, могущественно измѣняющія репродуктивную дѣятельность.

5.) *Понижать возвышенную дѣятельность почек и тѣмъ ограничивать усиленное до чрезмѣрности отдѣленіе ихъ.* Возвышенная дѣятельность можетъ зависать здѣсь либо отъ воспалительнаго страданія почекъ, либо отъ простаго раздраженнаго состоянія и умноженнаго чрезъ то нервнаго вліянія. Въ первомъ случаѣ доставляютъ большую пользу кровеиспращенія, утонченная діета, сладкая ртуть и нарывные пластыри (*Watt*), а въ послѣднемъ успокоивающія и наркотическія лѣкарства (N 1, 2, 3,) наипаче опій (N 7) съ слизистыми напитками, иногда маунъ (N 8), дурнопахучникъ, синильнокислый и сѣрнокислый цинкъ, селитроокислый висмутъ, сноружи пѣявки или кровососныя банки вдоль спиннаго хребта, обливаніе спины холодною водою, накожныя раздраженія, теплыя ванны, парныя бани, треніе тѣла сухими ароматными веществами и окуриваніе ими, масляныя втиранія и пр. Вообще



здѣсь очень полезно антагонистическое возбужденіе на-  
кожной дѣятельности сильными потогонительными, какъ  
опій, камфора (N 21.) и пр. и умноженное испражненіе  
низа слабительными изъ ревеня (N 24), сабура (N 45)  
и пр.

с.) *По принадлежнымъ показаніямъ* нужно болѣе  
всего противодействовать *произрожденію кислотъ* въ  
кишечномъ каналѣ посредствомъ всасывающихъ и желу-  
дочныхъ лѣкарствъ (N 83, 84, 85, 86), также *слабости*,  
оказывающейся въ послѣднемъ періодѣ болѣзни и сопря-  
женной съ сильнымъ изнуреніемъ тѣла и наклонностію  
къ водяной болѣзни. Для сего требуется непременно  
укрѣпленіе тѣла хиною (N 9), квасцовою сывороткою,  
сокомъ катеху (N 65), либо ратаніею (N 23), фос-  
форною и селитрянною кислотою, миррою (N 71), же-  
лѣзными составами (N 10) и т. п.

---

### *Недержаніе мочи. (Enuresis).*

*Син.* Невозможность удерживать мочу, не произволь-  
ное теченіе или испражненіе мочи; *incontinentia urinae*,  
*excretio urinae involuntaria*, *uracratia*.

### § 253.

*Недержаніемъ мочи* называется то болѣзненное со-  
стояніе, при которомъ моча либо испражняется гораздо  
чаще обыкновеннаго и притомъ съ столь сильнымъ и



скоро дѣлающимся напоромъ, что больной никакъ не въ состояніи удержать оную, либо вытекаетъ безпрестанно, такъ что всякая капля мочи, попадающая въ мочевой пузырь тотчасъ изливается къ наружи.

§ 254.

*Явленія.* Недержаніе мочи бываетъ двоякаго рода а) *эретическое* (enuresis erethistica), зависящее отъ чрезвычайной чувствительности мочевого пузыря, либо слишкомъ острой мочи. Здѣсь больной можетъ еще удерживать мочу, но когда сдѣлается побужденіе къ мочеиспусканію, то напоръ къ тому бываетъ столь сильный и столь скоро оказывающійся, что больной принужденъ противъ воли испускать мочу. Часто предъ испражненіемъ дѣлаются острые боли, а послѣ испражненія остаются на нѣкоторое время ощущенія судорожнаго сжатія въ мочевомъ пузырь. Въ большей части случаевъ оно встрѣчается вмѣстѣ съ мочепузырными камнями, съ зарожденіемъ песка, съ припадками геморoidalнаго страданія, хроническаго воспаленія въ мочевомъ пузырь и пр. и тогда сопровождается обыкновенно явленіями, свойственными симъ болѣзнями. б) *Параличное недержаніе мочи* (enuresis paralytica), произражающееся отъ расслабленія мышцъ, сжимающихъ устье мочевого пузыря, обнаруживается либо безпрестаннымъ выходеніемъ мочи по каплямъ, либо послѣ значительнаго накопленія оной въ мочевомъ пузырь (enuresis nocturna); но во всякомъ случаѣ безъ вліянія на то воли больного, безъ примѣтнаго напора и боли. Здѣсь, кромѣ непріятнаго запаха,



раждающагося отъ безпрестаннаго промоканія мочею бѣлья и платя, дѣлается не рѣдко пакожное воспаленіе въ тѣхъ частяхъ, къ коимъ проникаетъ острая моча, причиняющее боли и прѣлость (*intertrigo*) и переходящее легко въ изъязвленіе.

§ 255.

*Причины эретического* недержанія мочи суть: переносы ревматическихъ, геморроидальныхъ, или пакожныхъ страданій на мочевой пузырь, сочувственное состраданіе онаго при раздраженіяхъ кишечнаго канала глистами, нечистотами, завалами и пр. при раздраженіяхъ матки въ беременномъ и не беременномъ состояніи; вліяніе сильнаго испуга и другихъ душевныхъ возмущеній, также развитій тѣла въ извѣстныхъ періодахъ, напр. смѣненія зубовъ и возмужалости (*pubertas*), истерическіе припадки, употребленіе острыхъ мочегонительныхъ веществъ, болѣзненно измѣнившаяся, очень острая моча, зарожденіе камней или песку въ мочевомъ пузырь и пр.

*Параличное недержание мочи* приключается отъ всѣхъ вліяній, ослабляющихъ и уничтожающихъ дѣятельность мышцъ мочеваго пузыря. Сюда принадлежатъ: параличи, остающіеся послѣ апоплектического удара, наипаче *paraplegia*, поврежденія мозга и становой жилы, сильныя прижатія мочепузырной шейки при трудныхъ родахъ, раненія оной при операціяхъ каменной болѣзни, камни, механически растягивающіе мочевой пузырь, наросты, скирры, отвердѣнія, разширенія, на-



поепія, свищевыя язвы; трудныя болѣзни, наипаче горячки, глубокая старость, ослабленіе дѣтородныхъ органовъ предшествовавшимъ распутствомъ, привычка слишкомъ долго удерживать мочу, чрезмѣрное наполненіе пищеварительныхъ органовъ и слишкомъ обильное питье водянистыхъ напитковъ, особливо на ночь и пр.

§ 256.

*Сущность* сего болѣзненнаго состоянія заключается либо въ чрезмѣрной раздражительности мочевого пузыря (какъ въ эретической формѣ), либо въ большемъ или меньшемъ ослабленіи силы мышцъ, сжимающихъ мочевою пузырь (какъ въ параличной формѣ). Въ обоихъ случаяхъ испраженіе мочи, не завися собственно отъ воли больного, не можетъ быть удерживаемо до надлежащаго времени.

§ 257.

*Предсказаніе* опредѣляется здѣсь по роду причинъ, по степени болѣзни, по сопряженіямъ и индивидуальнымъ отношеніямъ больного. Эретическаго свойства недержаніе мочи гораздо вѣрнѣе и удобнѣе излѣчивается, нежели параличнаго. Сіе послѣднее, хотя и не опасно, однакожь часто составляетъ дурной припадокъ для тѣхъ болѣзней, отъ коихъ оно зависитъ. Тамъ, гдѣ оно бываетъ чисто-мѣстное, оказывается у молодыхъ людей и не происходитъ отъ важныхъ раненій, органическихъ разстройствъ, или параличныхъ состояній нервной системы,



излѣченіе его гораздо удобнѣе, нежели при противуположныхъ обстоятельствахъ.

§ 258.

*Лѣченіе.* а) *Въ эретической формѣ* сего страданія надобно стараться притупить возвышенную раздражительность, противудѣйствуя наиболѣе тѣмъ причинамъ, которыя возбудили оную. По сему здѣсь преимущественно надлежитъ обращать вниманіе на геморроидальныя скопления, раздраженіе отъ глисть, особенное болѣзненное смѣшеніе и остроту мочи, ревматическія и другія пораженія мочевого пузыря, предписывая сообразныя каждому изъ сихъ случаевъ средства. Особенную услугу доставляютъ здѣсь кровотовлечения, дѣлаемая посредствомъ пиявокъ или кровососныхъ банокъ, накожныя раздраженія и возбужденія, уточенная діета и пр. Острота мочи отъ употребленія тѣхъ, острыхъ веществъ притупляется лучше всего слизистыми и эмульсивными напитками, на пр. изъ конопляныхъ, маковыхъ сѣмянъ, а особливо изъ плауннаго сѣмени (*emuls. sem. lycopodii*). Привычная болѣзненная раздражительность мочевыхъ путей, случающаяся у дѣтей въ періодахъ развитія тѣла, а иногда и у беременныхъ, уничтожается весьма хорошо камфорною, даваемою однакожъ въ достаточныхъ пріемахъ въ соединеніи съ сухою фосфорною кислотою и экстрактомъ хины въ пилюляхъ вмѣстѣ съ наружнымъ употребленіемъ оной, въ видѣ жидкой мази для втиранія. При общей нервной раздражительности большую пользу доставляетъ бобровая струя, дур-



попахучникъ, маунъ (N 8), особливо когда притомъ существуетъ раздраженіе отъ глисть. Въ тѣхъ формахъ недержанія мочи, которыя сопровождаются сильными болями и зависятъ наипаче отъ ревматическаго расположенія, весьма хорошо дѣйствуетъ опій (N 7), кодеинъ (N 2), уксусокислый морфій (N 77) и пр. вмѣстѣ съ наружнымъ употребленіемъ болеутолительныхъ мазей (N 43), смягчающихъ наркотическихъ припарокъ (N 48) и противусудорожныхъ промывательныхъ.

б.) Въ *параличномъ недержаніи мочи* удаленіе случайныхъ причинъ требуетъ также особеннаго вниманія врача. Если недержание такое бываетъ только припадкомъ общаго какого либо страданія, напр. сильной нервной горячки, апоплектического удара, паралича становой жилы и пр. то не обходимо нужно дѣйствовать на устраненіе сихъ болѣзней, съ уничтоженіемъ коихъ проходитъ обыкновенно и самое недержание мочи.

Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ болѣзнь сія основывается на мѣстномъ ослабленіи, или параличномъ состояніи мочевого пузыря, приличны болѣе специфически дѣйствующія на мочевые пути средства, особливо настойка шпанскихъ мушекъ до 10, 20, 30 капель въ какой либо эмульсіи, *aetheroleum terebinthinae, tinct. bals. copaivae alcalina, balsamum toltutanum, oleum petrae, ammonium carbonicum ruco-*  
*oleosum cum infuso arnicae etc.* Если замѣчается при этомъ большая слабость мышечныхъ волоконъ, то весьма приличны стягивающія лѣкарства, к. т. *folia uvae ursi, rad. caincae, r. pareirae bravae, succus catechu (N 65), gummi kino, ratanhia (N 23), tinctura martis tartarisata (N 67), acidum phosphoricum siccum cum extracto chinae etc.*



Изъ наружныхъ средствъ одобряются: прикладываніе пластыря шпанскихъ мухъ на крестцѣ, втиранія каменнаго масла (ol. petr.), терпентина и настойки шпанскихъ мухъ въ проходной промежности и въ сторонѣ мочевого пузыря, употребленіе струистой и капельной ванны въ близи страждущаго органа; въ упорныхъ случаяхъ даже впрыскиваніе въ мочевой пузырь раздражающихъ жидкостей и проведеніе горячихъ паровъ посредствомъ машины *Дзонди*.

Тамъ, гдѣ недержаніе мочи противустоитъ всѣмъ средствамъ, или зависитъ отъ органическихъ разстройствъ, нужно стараться отвращать непріятныя дѣйствія сей болѣзни механическими пособіями, к. с. *compressoria urethrae* и различныя повязки, воспящающія промоканію платья мочею (см. *Еллинскаго Десмургія*).

---

*В ы к и д ы ш ь.*  
(*Abortus*).

*Син*: Недонашиваніе маточнаго плода, выкидываніе, преждевременные роды; *aborsus*, *aborsio*, *ambeloma*, *estiosis*, *amblosis*, *apophthora*.

§ 259.

*Выкидышемъ* въ общемъ значеніи называется то уклонное отпращиваніе матки, отъ коего зародышъ извергается прежде, нежели беременность достигнетъ нормальной своей цѣли.



§ 260.

*Явленія* сего болѣзненнаго состоянія въ каждомъ особномъ случаѣ бываютъ не одинаковы. Большею частію ему *предшествуютъ* нѣкоторыя *припадки* (signa prodroma): дрожь и холодъ въ рукахъ и ногахъ; повсемѣстная усталость и разбитость, наипаче въ конечностяхъ, сопровождаемая тягостію; частое головокруженіе, обмороки, бессонница, непріятныя сновидѣнія, блѣдность лица, мутные глаза, мгновенное исчезаніе тѣхъ припадковъ, кои прежде сопровождали беременность; недостатокъ позыва на пищу, обложенный языкъ, дурной запахъ изорта; умаленіе колотья, напряженія и опухоли груди, истеченіе водянистой жидкости изъ оныхъ, умаленіе и охладѣніе брюха, чувство растяженія въ поясницѣ и пахахъ; боли въ спинѣ, крестцѣ и тазѣ; значительное опусканіе въ низъ матки и маточнаго рукава; разширеніе внутренняго маточнаго устья при очень мучительныхъ потугахъ; выходненіе околоплодной воды и слизисто-серозной жидкости, а иногда и самое кровотеченіе изъ матки, усиливающееся во время потугъ.

§ 261.

*Признаки наступающаго выкидыша.* При нѣкоторыхъ вышеозначенныхъ явленіяхъ обнаруживаются сверхъ того: чувство тяжести въ дѣтородныхъ частяхъ, напоръ на мочевой пузырь, частое побужденіе къ мочеиспусканію, ощущеніе давленія на дѣтородные органы къ



низу и квинѣ, иногда примѣтное трещаніе въ брюхѣ, какъ слѣдствіе разрыва околоплодныхъ оболочекъ, наконецъ мгновенное умаленіе ощущенія движеній маточнаго плода; чувство въ маткѣ переваливающагося тѣла при измѣненіи положенія беременной; выходженіе дурнопахучей слизи, или околоплодной жидкости, иногда болѣе обыкновеннаго мучительные потуги, разширеніе внутренняго отверстія матки, въ которомъ можно ощутить разорванныя оболочки или части маточнаго плода, иногда кровотеченіе.

§ 262.

*Признаки дѣйствительно наступившаго уже выкидыша* вообще сходятся съ нормальными родами тѣмъ болѣе, чѣмъ позже оказывается выкидышъ. Если же онъ рождается въ первыхъ недѣляхъ по зачатіи, то припадки ограничиваются болѣе маточнымъ кровотеченіемъ (metrorrhagia). Въ такомъ случаѣ выкидышъ приключается вообще въ то время, когда должно было оканчиваться мѣсячному очищенію, которое присемъ бываетъ очень обильно и соединено съ сильными болями, испражняемая при томъ жидкость очень створоженная, смѣшанная съ плевистыми веществами, похожими на отпадающую оболочку (m. decidua). По выходженіи оныхъ прекращаются признаки беременности и больныя скоро поправляются въ здоровьи, если только кровотеченіе не было очень обильно, какъ случается наипаче у полнокровныхъ особъ.



§ 263.

*Продолженіе.* Во многихъ случаяхъ преждевременные роды оканчиваются уже черезъ два часа; большею частию однакожь продолжаются они два или три дня. Рѣдко предшествуютъ имъ предвѣстники въ продолженіи цѣлой недѣли, послѣ чего уже слѣдуетъ выходженіе самаго плода. При этомъ много зависитъ также отъ времени беременности, отъ свойства дѣйствующихъ причинъ, отъ расположенія беременной и т. п. Вообще въ послѣднихъ мѣсяцахъ выходженіе плода происходитъ наискорѣе.

§ 264.

*Исходы.* При скорой и приличной помощи часто предвѣстники исчезаютъ и выходженіе плода не оказывается; впрочемъ это можетъ случиться только тогда, когда причина болѣзни дѣйствуетъ медленно, если еще околоплодная вода не вытекла, если зародышъ или дѣтское мѣсто не отдѣлилось и маточный плодъ живъ еще. Въ первыхъ трехъ мѣсяцахъ зародышъ выходитъ почти всегда съ неповрежденными оболочками; когда же дѣтское мѣсто образуется уже, то оболочки обыкновенно разрываются и плодъ вытѣсняется большею частию безъ вспомошествованія искусства, но послѣ-родовое очищеніе слѣдуетъ тѣмъ позже, чѣмъ отдаленнѣе срокъ нормальной беременности.



§ 265.

*Теченіе.* Всякій выкидышъ состоитъ изъ двухъ главныхъ моментовъ: отдѣленія маточнаго плода и вытѣсненія его къ наружи. Первое происходитъ съ большею или меньшею потерею крови, а послѣднее сопряжено съ сильнѣйшими или слабѣйшими болями. Оба сіи періода слѣдуютъ либо въ скоромъ времени одинъ за другимъ, либо въ промежуткѣ нѣсколькихъ дней, даже 3-4-6 недѣль. Послѣродовое очищеніе во всѣхъ преждевременныхъ родахъ продолжается вообще долѣе, нежели при нормальныхъ разрѣшеніяхъ. Большая часть выкидышей случается вообще на третьемъ или четвертомъ мѣсяцѣ беременности,—разумѣется, если не содѣйствуютъ къ тому случайныя внѣшнія причины. Если маточный плодъ умираетъ очень скоро, не испражняясь вдругъ, то преждебывшіе признаки беременности исчезаютъ; женщины таковыя чувствуютъ себя разслабленными, имѣютъ значительный жаръ ночью; иногда оказывается у нихъ тошнота и рвота, истерическіе припадки; изъ грудныхъ соковъ вытекаетъ не рѣдко серозная, молоку подобная жидкость; потомъ слѣдуетъ выходженіе дурнопахучей, темной жидкости изъ маточнаго рукава и сіе продолжается дотолъ, пока удалены будутъ всѣ остатки зародыша, который можетъ также превращаться въ пузырьчатая (hydatides), или клубовидныя (mola) перерожденія организациі. Наконецъ въ позднее время беременности выкидышъ можетъ обнаружиться нѣсколько позже послѣ того, какъ утробный младенецъ уже умеръ.

*Признаки смерти утробнаго младенца во время*



*беременности* конечно весьма обивчивы, но они тѣмъ достовѣрнѣе, чѣмъ болѣе ихъ случается въ одно время. Сюда принадлежатъ: прекращеніе сочувственныхъ явлений беременности, опаденіе, слабость и дряблость грудей, отдѣленіе въ нихъ серозной, молоку подобной жидкости, ощущеніе холода на брюхѣ, прекращеніе движеній маточнаго плода; чувство тяжести въ нижней части брюха при сидѣніи или стояніи, либо опусканіе въ низъ тяжелаго тѣла при поворачиваніи въ какую либо сторону, частый ознобъ, который, при умираніи младенца, обыкновенно бываетъ потрясающій, наступленіе обмороковъ, блѣдное или синее лице, зловонное дыханіе и т. д.

§ 266.

*Послѣдствія.* Всякій выкидышъ дѣйствуетъ вредно на здоровье матери, наипаче въ первыхъ мѣсяцахъ беременности. Соединенное съ онымъ кровотеченіе, иногда очень сильное, бываетъ преимущественною причиною тому, тѣмъ болѣе, что одинъ выкидышъ рождаетъ часто непреодолимую склонность къ новому выкидышу, а отъ частаго обнаруживанія сей болѣзни рождаются упорныя страданія к. т. неправильность мѣсячнаго очищенія, ослабляющія кровотеченія изъ матки, истерика, мигрень, бѣли, мѣстныя разстройства матки, всеобщая слабость, нервная горячка, изнурительная лихорадка, чахотка и т. п.



*Причины а) предрасполагающія суть: 1.) Сила привычки.* Женщины, имѣвшія одинъ разъ выкидышъ, легко подвергаются оному, даже безъ побудительныхъ причинъ къ тому. Матка въ семь случаевъ, подобно другимъ органамъ, имѣетъ, повидимому, особенныя стремленія производить или повторять болѣзненные дѣйствія, обнаруживавшіяся въ оной нѣсколько разъ. 2) *Нервное сложеніе тѣла.* Чувствительныя женщины съ возвышенною раздражительностію нервовъ, большею частію во время беременности, имѣютъ чрезмѣрную чувствительность матки, отъ чего иногда самой малѣйшій поводъ оказываетъ большой вредъ. Сверхъ сего сюда принадлежатъ также: полнокровіе съ возвышенною раздражительностію нервовъ, общая слабость тѣла, беременность въ слишкомъ молодомъ, или очень пожиломъ уже возрастѣ, зачатіе, случившееся не задолго предъ мѣсячнымъ очищеніемъ или во время онаго, болѣзненно-возвышенная жизнедѣятельность женскихъ грудей во время беременности; зачатіе, случающееся во время кормленія грудью или при продолжающемся еще послѣродовомъ очищеніи, слишкомъ обильное, ослабляющее мѣсячное очищеніе; продолжительныя бѣли, болѣзни и не правильное положеніе матки и наконецъ несовершенство способности зачатія. Дѣйствительно есть женщины, кои всякій разъ подвергаются выкидышу, если возимъютъ зачатіе не въ извѣстное время. Иногда и атмосферическія вліянія оказываютъ такое дѣйствіе, что преждевременные роды или выкидыши господствуютъ эпидемически; сюда отно-



сятся наипаче: суровый зимній холодъ, продолжительная влажнохолодная погода, очень сильный солнечный зной, частая гроза и пр. 3.) *Мѣстные пороки*: неправильное образованіе таза, слишкомъ тѣсный, либо слишкомъ узкій тазъ, разныя уклонности положенія матки, болѣзненные наросты и полипы въ самой маткѣ и въ смежныхъ частяхъ.

§ 268.

б) *Случайныя причины*. 1.) *Психическія* или *моральныя*: всякаго рода возмущенія сердечнодушевной способности, вообще сильныя возбуждающія и угнѣтающія страсти; 2) *физическія*: огневицы въ первые мѣсяцы беременности, наипаче перемѣжающіяся, мѣстные воспаленія, геморрой и варикозныя растяженія въ маткѣ, многія хроническія болѣзни, особливо репродуктивной и раздражительной системы, также порочная діета и образъ жизни, разгоряченіе тѣла и простуда, злоупотребленіе горячительной пищи и напитковъ, кровопусканія, слабительныхъ, ножныхъ и общихъ ваннъ, наипаче въ первыхъ мѣсяцахъ, употребленіе лѣкарствъ, производящихъ выкидыши (*abortiva*); слишкомъ частое соитіе, вредныя вліянія на органы чувствъ чрезъ сильныя душистыя вещества, испорченный воздухъ и пр; 3.) *механическія*: наружныя насилія, дѣйствующія болѣе или менѣе на матку, паденія на брюхо, толчки и удары по оному, раздраженіе маточнаго устья пальцомъ, сильная рвота, чиханіе, кашель, корчи, подниманіе грузныхъ тяжестей, дѣйствіе электричества, слишкомъ сильное движеніе тѣла,



ночное бодрствованіе и танцы, крѣпкое шнурованіе и перетягиваніе тѣла.

Другой важнѣйшій источникъ произрожденія выкидышей заключается въ самомъ зародышѣ и окружающихъ его плотныхъ и жидкихъ частяхъ. Сюда относятся слишкомъ нѣжное образованіе зародыша, болѣзни и уклонности развитія его, обмираніе онаго, двойни и тройни, водянистыя накопленія въ головѣ, позвоночномъ каналѣ, груди и брюхѣ, недостатокъ около-плодной воды, исковерканіе пуповины, неправильности околоплодныхъ оболочекъ и дѣтскаго мѣста, отвердѣніе ихъ и пр.

§ 269.

*Предсказаніе.* Опасность отъ выкидыша бываетъ различная, смотря по состоянію здоровья беременной, по времени беременности и по свойству дѣйствующихъ причинъ. Вообще выкидышъ не должно почитать слишкомъ опасною болѣзнію: чѣмъ скорѣе онъ послѣдуетъ, тѣмъ безопаснѣе. Страждущія легко поправляются, если только кровотеченіе при этомъ бываетъ не слишкомъ сильное. Прямѣры смертельнаго исхода отъ кровотеченій, судоргъ и т. п. довольно рѣдки. Гдѣ болѣзнь сія зависить отъ полнокровія, тамъ гораздо легче можетъ быть предупреждаема, нежели отъ огневицъ, особливо перемежающихся. Выкидышъ, происходящій отъ механическихъ причинъ, тѣмъ не избѣжнѣе бываетъ, чѣмъ скорѣе и сильнѣе онъ дѣйствуютъ. Вообще тѣ причины, кои съ трудностію, или во все не могутъ быть уклоняемы, содѣлываютъ предсказаніе болѣе или менѣе не благоприят-



нымъ. Сюда принадлежать наипаче тѣ вліянія, кои происходятъ отъ матки или самаго зародыша.

§ 270.

*Льченіе* основывается на слѣдующихъ показаніяхъ:  
1) *Должно всячески предупредить наступленіе выкидыша у такихъ беременныхъ женщинъ, кои уже одинъ или нѣсколько разъ подвергались оному.* Для выполненія сего показанія не обходимо нужно соблюдать слѣдующія діететическія правила: а) воздерживаться отъ всякаго слишкомъ сильнаго движенія и напряженія, равно какъ отъ частаго совокупленія, наипаче въ тѣ дни или въ тотъ срокъ времени, когда, въѣ беременности, обыкновенно оказывалось у нихъ мѣсячное очищеніе или въ томъ мѣсяцѣ, въ коемъ обнаруживался уже одинъ или нѣсколько разъ выкидышъ; б) избѣгать всякаго случая къ возбужденію душевныхъ движеній и страстей, всякаго рода разгоряченій и простуды, особливо скорого смѣненія температуры воздуха; в) одѣваться просто, не слишкомъ тепло, не слишкомъ холодно и отнюдь не носить ничего стѣсняющаго и удручающаго брюхо; г) употреблять простую, легко варимую пищу, сообразную тѣлосложенію и е) вести спокойный родъ жизни, удаленный по возможности отъ шума и суеты мірской, но не слишкомъ уединенный.

Беременные женщины очень раздражительнаго, полнокровнаго тѣлосложенія должны употреблять малопитательную, болѣе растительную пищу и прохлаждающіе,



разжижающіе напитки. Если существуют признаки общаго полнокротія, к. т. полное, твердоватое жилобіеніе, красное, напряженное лице, блестящіе глаза, ощущение усиленной теплоты въ тѣлѣ и пр., то часто доставляютъ пользу умѣренныя кровопусканія изъ руки, производимыя наипаче въ томъ срокѣ времени, когда должно бы было обнаруживаться мѣсячное очищеніе. Въмѣстѣ съ симъ назначается продолжительное спокойствіе, избѣжаніе всѣхъ моментовъ, подающихъ поводъ къ возбужденію душевныхъ и тѣлесныхъ силъ, наипаче въ первые три мѣсяца. Если напротивъ того причину предшествовавшаго выкидыша была большая слабость и недостаточная репродуктивная дѣятельность и можно опасаться, что отъ таковой же причины и настоящая беременность окончится не благополучно, то предписывается болѣе питательная діета, умѣренное, ежедневное движеніе въ чистомъ свободномъ воздухѣ, пребываніе въ деревнѣ, душевное развлеченіе и забавы (впрочемъ не шумныя увеселенія), избѣжаніе всѣхъ печальныхъ, сердечныхъ сокрушеній, излишества въ физической любви, обильнаго употребленія кофе и чая. Смотра по обстоятельствамъ, можно давать и укрѣпляющія средства: *herba trifolii fibrini*, *folia aurantiorum*, *rad. gentianae rubrae*, *lign. quassiae*, *extracta amara*, *chininum sulphuricum*, *infusum vel extractum chinae frigide paratum*, а при большой нервной слабости и склонности къ судорогамъ *rad. valerianae*; каковыя средства, смотря по надобности, могутъ быть продолжаемы 3-4 мѣсяца. Для наружнаго употребленія рекомендуются въ такомъ случаѣ осторожно дѣлаемыя втиранія на брюхѣ подо-



грѣтой кельиской воды, spiritus matricalis, s. serpilli, balsami vitae Hoffmanni, essentiae balsamicae, ungv. de althea cum bals. nucistae, aetheroleo menthae crispae etc. съ прибавленіемъ иногда, при большой раздражительности, tinct. oprii.—Когда причина случающихся выкидышей состоитъ въ порочномъ положеніи матки, то надлежитъ осторожно исправить оное. При не совершенномъ выпадении, гдѣ беременныя жалуются на растягивающую боль въ крестцѣ и тѣсненіе на дѣтородныя части, нужно наблюдать болѣе горизонтальное положеніе съ возвышеннымъ крестцомъ, избѣгать всякаго давленія на брюхо, стараться о ежедневномъ удобномъ испражненіи низа, не задерживать мочу въ пузырьѣ, въ случаѣ нужды, употреблять для поддержанія матки нѣжную губку, но отнюдь не маточныя кольца (pessaria). Всѣ сіи предписанія еще болѣе не обходимы при совершенномъ выпадении. Гдѣ выкидышъ происходилъ въ слѣдствіе слишкомъ широкаго таза, тамъ, при наступившей беременности, должно рекомендовать большое спокойствіе, избѣжаніе всякаго сильнаго напряженія и движенія тѣла, также всякаго тѣснаго, жмущаго платья, попеченіе о надлежащемъ испражненіи низа и вкладываніе нѣжной губки для поддержанія легко выпадающей въ семъ случаѣ матки.

## § 271.

2) *Лѣченіе наступающаго выкидыша.* Если преждевременные роды угрожаютъ своимъ наступленіемъ, то надлежитъ стараться всегда о предупрежденіи дѣйствительнаго выходенія зародыша. Когда маточное от-



верстіе мало еще открылось, воды не вытекли, зародышъ не мертвый и дѣтское мѣсто отдѣлилось только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, то можно еще надѣяться привести беременность къ нормальной цѣли. Здѣсь также должно обращать вниманіе на причинные моменты и дѣйствовать по ихъ разности. Общимъ, не обходимо нужнымъ условіемъ при лѣченіи должно быть въ высшей степени совершенное спокойствіе тѣла и духа при горизонтальномъ положеніи въ постель. Если причиною наступающаго выкидыша слишкомъ сильная дѣятельность сосудистой системы, то предписывается *антифлогистическій способъ*; при общемъ поднокровіи, хотя бы и существовало въ тоже время умѣренное кровотеченіе изъ матки, назначаютъ общія кровопусканія изъ руки, а при слабѣйшемъ состояніи силъ мѣстныя кровоисpraжненія. Внутрь даются прохлаждающія среднія соли: селитра, сѣрноокислая сода и магнезія, вино-каменноокислый поташъ, прохладительныя эмульсіи и напитки. Гдѣ же на противъ того существуетъ настоящая слабость, тамъ употребляются *умпренно крѣпительныя средства*: наливка корицы, мелиссы, перечной мяты и пр. при наступленіи обмороковъ въ соединеніи съ сѣрнымъ или другими эфиромъ, съ аміячноянтарною жидкостію. Иногда предписываются минеральныя кислоты, напр. Галлеровъ кислый элексиръ въ приличномъ вегикулѣ. Брюхо покрывается умѣренно теплыми суконками; при очень сильномъ кровотеченіи дѣлаются холодныя примочки на брюшъ изъ воды съ уксусомъ или виннымъ спиртомъ, а въ крайности вкладывается осторожно, въ рукавъ до маточнаго отверстія тампонъ, обмакиваемый уксусомъ,



разведеннымъ водою. *Противусудорожный способъ* избирается въ то время, когда оказываются корчи и судорги, часто очень сильныя. Въ такомъ случаѣ у полнокровныхъ особъ доставляютъ нерѣдко большую пользу мѣстныя кровоиспращенія, или сухія насосныя банки на грудяхъ, а у слабыхъ, очень чувствительныхъ женщинъ собственно противусудорожныя лѣкарства: внутрь ромашковые цвѣты, корень мауна, ипекакуанникъ въ малыхъ приѣмахъ, бобровая струя, опій и пр. снаружы тепловатыя примочки изъ настоя ромашки, втиранія летучихъ мазей съ камфорою и опіемъ, алтейной мази и шоколаднаго масла съ опіемъ, противусудорожныя промывательныя изъ настоя ромашки и опія.

Если выкидышъ угрожаетъ наступленіемъ своимъ послѣ вѣшняго насилія или поврежденія, причинившаго воспалительное страданіе матки или смежныхъ частей, то показуется противувоспалительный способъ. Неправильныя положенія матки должны быть въ скорѣйшемъ времени устранены; впрочемъ при таковыхъ неправильностяхъ, долго продолжавшихся уже, выкидышъ едва ли можетъ быть предупрежденъ. Гдѣ причина болѣзни состоитъ въ самомъ зародышѣ и его органахъ развитія, тамъ вообще возможно только припадочное лѣченіе.

§ 272.

3) *Когда выкидышъ не можетъ быть предупрежденъ, то требуется по возможности уменьшить опасность онаго. По сему здѣсь должно стараться умалять дѣйствіе отдѣленія маточнаго плода и*



способствовать сокращенію матки. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ присемъ кровотеченіе; впрочемъ, если оно не слишкомъ сильное, то чрезъ появленіе его не должно вдругъ склоняться на искусственное окончаніе родовъ. Вообще совершеніе этого процесса прилично предоставлять натурѣ, которая въ первыхъ мѣсяцахъ изгоняетъ плодъ съ неповрежденными оболочками, да и въ позднѣйшей беременности, только при очень сильномъ кровотеченіи и при порочныхъ образованіяхъ таза и зародыша, потребно искусственное вспомошествованіе. Если напр. воды еще не вышли и матка имѣетъ достаточную дѣятельность, то можно предоставить роды одной натурѣ; буде же дѣятельность оной весьма скудная, или паступаетъ кровотеченіе, неуступающее врачебнымъ средствамъ, то хотя и есть показаніе ускорить разрѣшеніе, однакожь прежде выполненія его, наипаче въ первыхъ мѣсяцахъ беременности, должно рѣшить, не сопряжено ли ускореніе разрѣшенія или искусственное отдѣленіе плода съ большею опасностію, нежели самое кровотеченіе, ибо опытность научаетъ, что женщины при выкидышѣ, въ первыхъ мѣсяцахъ, могутъ терять значительное количество крови безъ особенной опасности и вредныхъ послѣдствій. Когда при вытекшихъ уже водахъ головка лежитъ впередъ, то не нужно никакого искусственнаго вспомошествованія, если только не обнаружится кровотеченіе, или другія опасныя явленія, коихъ ничемъ другимъ устранить не возможно. Въ послѣднемъ случаѣ вводится осторожно, вдоль крестцовой кости, два перста до головки и спинки зародыша и оный потихоньку извлекается. При выстоящихъ впередъ ножкахъ и недо-



статкъ силъ натуры притягивается къ переди задница, а при выдавшейся впередъ ручкъ, или при поперечномъ положеніи плода, надлежитъ тянуть осторожно за ножки. Послѣродовое дѣйствіе требуетъ также большой осторожности и, безъ побудительныхъ показаній, никогда не должно ускорять его искусственными приѣмами. Послѣдъ часто остается здѣсь на нѣсколько дней безъ вреда и не правильныя сокращенія матки, даже при наступившихъ кровотеченіяхъ, могутъ быть уничтожаемы приличными лѣкарствами. Въ особенности надлежитъ остерегаться отрывать очень тонкую и нѣжную пуповину. При выкидышѣ въ позднихъ мѣсяцахъ, если воды вытекутъ, потребны бывають обороты, кои часто очень затрудняются неправильными сокращеніями матки, требующими противусудорожныхъ впрыскиваній и таковыхъ же внутреннихъ лѣкарствъ.

По воспослѣдовавшемъ выкидышѣ тѣмъ болѣе надлежитъ соблюдать всѣ правила, предписываемыя роженницамъ, чѣмъ болѣе онѣ сопряженъ былъ съ опасными припадками и чѣмъ болѣе пострадала при томъ роженница. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ должно обращать также вниманіе на тѣ сумнительные припадки, кои наступаютъ въ формѣ продолжительныхъ кровотеченій, большого ослабленія, судорожнаго переболя (*dolores p. p. spasmodici*), воспаления матки и т. п. и уклонять ихъ по правиламъ частной терапіи, соображаясь притомъ всегда съ причинами ихъ. Преимущественнаго вниманія заслуживають здѣсь кровотечения, дѣлающіяся въ слѣдствіе задержанныхъ оболочекъ зародыша. Въ семъ случаѣ нужно остерегаться всѣхъ насильственныхъ приѣмовъ. Если обо-



лочки сіи въ большей части не отрѣшились еще и безъ труда удалить ихъ не возможно, то надлежитъ стараться укрощать кровотеченіе впрыскиваніями ромашки и виннаго спирта и способствовать отдѣленію ихъ. При наступившей гнилости въ задержанныхъ остаткахъ одобрѣется настойка бобровой струи для внутренняго употребленія и введеніе губки въ маточное отверстіе, овлаждаемой отваромъ алтейнаго корня, либо овсяныхъ крупъ; удобнѣе всего вводить ее посредствомъ палочки чрезъ маточный рукавъ въ самое отверстіе матки. Послѣ выхожденія таковыхъ остатковъ дѣлаются впрыскиванія изъ настоя шалфея, ивовой, хинной корки, настойки смирны и т. п. а внутрь даются подобныя крѣпительныя средства. При существующемъ ослабленіи силъ не должно штурмовать крѣпительными лѣкарствами. Въ первые дни предписываются только питательныя похлебки, нѣсколько вина, Галлеровъ кислый элексиръ съ водою и притомъ спокойствіе тѣла, а въ послѣдствіи времени можно давать и постоянно уже крѣпительныя средства.

## § 273.

Если слѣдствія выкидыша благополучно устранены, то не должно забывать:

4) *Четвертаго показанія: удалить, до наступленія новой беременности, все, что можетъ подать поводъ къ новому выкидышу.* Вѣрнѣйшее средство составляетъ въ семъ случаѣ супружеская воздержанность, наблюдаемая строго до тѣхъ поръ, пока устранены будутъ причинные моменты, подававшіе поводъ къ пре-



жнимъ преждевременнымъ родамъ и пока организмъ укрѣпится до того, что можно будетъ надѣяться на благополучнѣйшее окончаніе будущей беременности. Если женщина и поправить свое здоровье до таковой степени, то при всемъ томъ, она должна предаваться супружескому сожитію только съ большою ограниченностію и умѣренностію, избѣгая его всячески нѣсколько времени предъ наступленіемъ мѣсячнаго очищенія, во время теченія и послѣ окончанія онаго, по крайней мѣрѣ восемь дней. Если послѣдуетъ зачатіе, то беременная должна воздерживаться отъ соитія, по крайней мѣрѣ дотолѣ, пока пройдетъ время, въ которое обыкновенно прежде оказывался выкидышъ, а если можно, то и въ продолженіи всей беременности. Вообще, во все время оной, беременная должна вести умѣренный образъ жизни, совершенно сообразный обстоятельствамъ и избѣгать всего, что можетъ подать поводъ къ выкидышу.

И такъ здѣсь должно изслѣдовать тѣ причины, кои прежде производили выкидышъ, и потому сюда принадлежатъ многія изъ тѣхъ правилъ лѣченія, какія упомянуты при первомъ показаніи. Въ особенности здѣсь нужно, прежде наступленія беременности, избирать приличный образъ лѣченія *соотвѣтственно разности сложенія*. Сперва надлежитъ въ точности изслѣдовать, какую степень жизнѣдѣтельности имѣетъ матка и несутъ ли въ ней мѣстные пороки и болѣзни. Относительно перваго момента должно смотрѣть преимущественно на то, не находится ли при семъ такого расположенія къ выкидышу, которое содѣлалось уже привычнымъ (*abortus habitualis*), и при которомъ женщины подвергаются сей



болѣзни всегда въ одно и тоже время. Здѣсь состояніе жизнедѣятельности матки можетъ быть двойное: либо слишкомъ большая раздражительность маточной системы съ преимущественною продуктивностію и полнокровнымъ состояніемъ, въ какомъ случаѣ показуются всѣ діететическія и врачебныя предписанія, рекомендуемыя вообще для женщинъ весьма раздражительнаго, полнокровнаго сложенія, склонныхъ къ выкидышамъ и уже беременныхъ; либо особенная слабость маточной системы, отъ коей питаніе плода и поддержаніе его жизни ограничивается только извѣстнымъ временемъ. Здѣсь доставляетъ пользу означенный въ первомъ показаніи кровепитательный способъ лѣченія съ обращеніемъ вниманія на степень чувствительности; преимущественно же одобряется употребленіе сѣрноокислаго хинина и желѣза, желѣзныхъ настоекъ въ небольшихъ приѣмахъ, желѣзо содержащихъ минеральныхъ водъ: Пирмонтской, Дрибургской и Кавказскихъ желѣзныхъ, особливо источника на правомъ берегу Березовой рѣчки и въ Кисловодской долині (Нарзана). Пирмонтскую и Дрибургскую воду преимущественно одобряетъ *Гуфеландъ* при расположеніи къ выкидышу и, даже въ самой беременности, для таковыхъ очень ослабленныхъ женщинъ, рекомендуетъ продолжительное употребленіе какого либо нѣжнаго желѣзнаго средства, напр. *tincturae aethereae martialis* въ небольшихъ приѣмахъ, совѣтуя впрочемъ всячески смотрѣть на то, не производитъ ли желѣзо кровянаго скопленія въ маткѣ и при первыхъ явленіяхъ тотчасъ прекращать употребленіе его. Существующія не правильныя положенія матки к. т. наклоненіе впередъ, или назадъ,



выпаденіе и пр. должно стараться въ возможно скоромъ времени уклонить.

Изъ врачебныхъ средствъ преимущественное мѣсто занимають *ванны*. При большой чувствительности, въ началѣ дѣлаются тепловатыя ванны *sim bolo alba*, въ недѣлю нѣсколько разъ, а послѣ сѣрныя ванны Ландекскія, Эмскія, Гастейнскія, Кавказскія, особливо источниковъ горы Мапука, т. н. солдатская и Калмыцкая ванны; присемъ внутрь даются *antihysterica*, *antispasmodica*. При пасто-ящей слабости похваляются, кромѣ внутреннихъ крѣпительныхъ средствъ, нѣжныя желѣзныя ванны изъ полу-нца *liquoris ferri mariatici oxydulati*, послѣ употребленныхъ нѣсколько соляныхъ или морскихъ ваннъ. Таковымъ жен-щинамъ полезно также для укрѣпленія пить Пирмонт-скую, Швальбахскую, Боклетскую и пр. воды и ку-паться въ морѣ. При начинающихся отвердѣніяхъ, за-валахъ, геморроѣ и варикозномъ растяженіи сосудовъ матки, кои оказываются наипаче вмѣстѣ съ возвышенною жизнедѣятельностію венъ и застоями въ брюхѣ, отлично дѣйствуютъ Киссингенскія минеральныя воды, что въ Баварскомъ Королевствѣ, уничтожая, не только распо-ложеніе къ выкидышу, но и болѣзненные состоянія матки и яичниковъ (*Ed. v. Siebold*).

