

Средства кабинета служили пособіемъ при практическихъ занятіяхъ по фармакологіи студентовъ медицинскаго факультета.

24. Кабинетъ гігіены.

Въ теченіе отчетнаго года въ кабинетѣ производились обязательныя практическія занятія студентовъ по гігіенѣ и кромѣ того разныя не-обязательныя изслѣдованія по предмету гігіены завѣдующимъ кабинетомъ и другими лицами.

На 1-е января 1892 г. въ кабинетѣ состояло разнаго рода препаратовъ и инструментовъ 482 нумера на сумму 5617 р. 87 к.; въ теченіе отчетнаго года приобрѣтено 61 номеръ на сумму 558 р. 39 к. Къ 1 января 1893 г. въ кабинетѣ состоятъ 543 нумера на сумму 6176 р. 25 к.

25. Лабораторія медицинской химіи.

Въ отчетномъ году студенты 3 и 4 семестровъ были раздѣлены на 6 группъ и занимались въ лабораторіи практическими упражненіями по фізіологической и патологической химіи по 2 часа еженедѣльно. Кромѣ того практически занимались нѣкоторые изъ студентовъ высшихъ семестровъ по химической діагностикѣ для потребностей своихъ клиническихъ занятій.

Спеціальными научными работами въ лабораторіи занимались слѣдующія лица:

Студентъ Ильинъ—о продуктахъ разложенія бѣлковъ;

Врачъ Зеленскій—о составѣ крови;

Врачъ Гутниковъ—по химіи мозга;

Лаборантъ Давыдовъ—о содержаніи азота и фосфора въ экстрактахъ и тканяхъ органовъ.

На 1-е января 1892 г. лабораторія имѣла препаратовъ, инструментовъ, мебели, книгъ и проч. 690 нумеровъ на сумму 6543 р. 77 к.; въ теченіе отчетнаго года приобрѣтено 24 нумера на сумму 271 р. 35 к.; убыло 108 нумеровъ. Къ 1 января 1893 года въ лабораторіи состоятъ 606 нумеровъ на сумму 6169 р. 9 к.

26. Факультетская терапевтическая клиника.

Всѣхъ стаціонарныхъ больныхъ въ 1892 году было 80. Изъ нихъ: оставался къ 1-му января 1892 г.—1, прибыло—79, выписалось—59, умерло—6 и осталось къ 1-му января 1893 года—15; амбулаторныхъ больныхъ было—1200.

По роду заболѣваній больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Стационарные.	Амбулаторные.
Острыя инфекціонныя болѣзни	6	61
Болѣзни сердца и сосудовъ	7	50
„ легкихъ	13	165
„ плевры	5	36
„ гортани	—	133
„ глотки	—	141
„ головного мозга	3	10
„ спинного мозга	7	10
„ нервныя	7	93
„ желудка	5	103
„ кишечника	1	37
„ селезенки	—	17
„ печени	8	29
„ почекъ	10	24
„ мочевого пузыря	—	3
„ обмѣна веществъ	3	4
„ крови	1	21
„ глазъ	—	4
„ уха	—	114
„ кожи	—	13
Сифилисъ	1	35
Мышечный и суставный ревматизмъ	2	45
Воспаленіе большихъ суставовъ	—	3
Золотуха	—	4
Венерическая болѣзнь	—	7
Грыжи пупочныя	—	4
„ паховыя	—	8
Ушибы	—	13
Отравленіе	1	2
Женскія болѣзни	—	11

Въ истекшемъ году стационарные, а также и амбулаторные больные представили богатый матеріалъ для наблюденій, какъ клиническихъ явленій, такъ и результатовъ терапіи. Нѣкоторые изъ наблюденій послужили матеріаломъ специальныхъ работъ и сообщеній. Такъ, наблюденія надъ чрезвычайно интереснымъ случаемъ нейроза *nervi Splanchnici*, выражавшагося періодическою болью въ области лѣвой почки и polyurіей, описаны въ статьѣ „Сифилитическія невралгіи“, заключающей

кромѣ того наблюденія прошлаго года надъ другими невралгіями и сообщенныя въ прошломъ же году въ Медицинской Секціи Общества Опытныхъ Наукъ; случай почти полного излѣченія morbi Basedowi послѣ гальванокаутеризаціи гипертрофированныхъ нижнихъ раковинъ описать ординаторомъ г. Сурукчи и сообщенъ въ той же Медиц. Секціи; наблюдавшійся весьма интересный случай нейроза гортани въ скоромъ времени будетъ опубликованъ тѣмъ-же ординаторомъ г. Сурукчи. Специальныя наблюденія надъ Базедовскими формами и одинъ случай этой формы, осложненный табетическими явленіями, будутъ въ скоромъ времени опубликованы ординаторомъ Ножниковымъ. Примѣненіе къ лѣченію эксудативныхъ плевритовъ способа Левашева и прекрасные результаты этой терапіи послужили матеріаломъ къ сообщенію въ той-же секціи, сдѣланному ординаторомъ Яловымъ. Продолжавшіяся съ 1891 года наблюденія докторанта М. Свѣтухина надъ дѣйствіемъ копайскаго бальзама окончены въ отчетномъ году и представлены въ Медицинскій Факультетъ Харьковскаго Университета въ видѣ диссертациі на степень доктора медицины, послѣ защиты которой онъ и былъ удостоенъ этой степени. Ординаторы Вартапетовъ и Теръ-Аветисовъ сдѣлали сообщенія тамъ-же объ эпидеміи холеры, первый въ Волчанскомъ уѣздѣ, а 2-й въ Эривани и Ново-Баязетѣ. Кромѣ того въ клиникѣ производились наблюденія надъ дѣйствіемъ *Strontii lactici* при нефритахъ, воды „Боржомъ“ при *Diabetes Mellitus*, начаты и продолжаются наблюденія врача Михайлова надъ дѣйствіемъ *T-ra et extr. fluid. casti grandiflora* при страданіяхъ сердца. Студентомъ Краинскимъ производились спеціальныя изслѣдованія чувствительности при различныхъ заболѣваніяхъ нервной системы. Наконецъ въ истекшемъ году, какъ и въ предшествовавшіе два года, обширно примѣнялись способы изслѣдованія желудочнаго сока, какъ при страданіяхъ желудка, такъ и при многихъ другихъ заболѣваніяхъ. Специальное изслѣдованіе содержанія соляной кислоты въ желудочномъ сокѣ при различныхъ заболѣваніяхъ было предложено факультетомъ на соисканіе золотой медали. Эти изслѣдованія были произведены въ клиникѣ нѣкоторыми изъ гг. студентовъ, которые и представили уже въ факультетъ свои сочиненія (Финкельштейнъ и Ющенко).

Кромѣ вышеизложеннаго, въ отчетномъ 1892 году ежедневно, отъ 2—3 часовъ, ординаторъ клиники, С. Г. Сурукчи, велъ амбулаторный пріемъ по горловымъ, носовымъ и ушнымъ болѣзнямъ. Въ пріемѣ принимали участіе многіе изъ студентовъ 4-го курса, которые на этихъ пріемахъ изучали и упражнялись въ ларингоскопіи, риноскопіи и ото-скопіи, а также, по мѣрѣ накопленія матеріала, знакомились съ пато-

логией и терапией гортани, носа и уха. Студенты, кроме распознавания, упражнялись въ технических приемахъ, необходимыхъ для применения мѣстнаго лѣченія гортани, носа и уха; такъ, напр., нѣкоторые изъ посѣщавшихъ приемъ въ достаточной степени изучали технику смазыванія гортани, вдуванія въ гортань порошковидныхъ веществъ, интритортанныхъ инъекцій, а также усвоили себѣ методы катетеризацій Евстафиевой трубы, продуваніе уха по способу Politzer'a и т. д.

На этихъ приемахъ, въ присутствіи студентовъ, производились многія другія операціи, какъ-то: интритортанное удаленіе полиповъ, гальванокаустическія прижиганія при заболѣваніяхъ носа и уха, тонзилотомія, вскрытіе абсцессовъ миндалинъ, удаленіе инородныхъ тѣлъ изъ гортани и уха, удаленіе полиповъ носа и уха.

Всѣхъ больныхъ за истекшій годъ было 392 человѣка.

По роду заболѣванія число это распредѣлялось слѣдующимъ образомъ:

1) Пораженій гортани—90.

Изъ нихъ

а) катарральныхъ заболѣваній—39 (13 хроническихъ и 26 острыхъ.)

б) Туберкулеза гортани—19, изъ этихъ въ 8 случаяхъ было поражение обоихъ черпаловидныхъ хрящей (*perichondritis laryngea*), въ 2 случаяхъ перихондритъ черпаловидныхъ хрящей и язвы на нихъ, въ одномъ случаѣ—язва и грануляціонныя разраженія въ межчерпаловидномъ пространствѣ, въ остальныхъ—инфильтраты и язвы на истинныхъ голосовыхъ связкахъ и надгортанникѣ и наконецъ въ одномъ случаѣ, у 45 лѣтнаго фельдшера, съ полной афоніей и съ припадками асфиксіи найдена была на правой ложной голосовой связкѣ опухоль величиною въ голубиное яйцо, сидящая на широкомъ инфильтрированномъ основаніи; опухоль эта мѣстами изъязвлена, покрыта грануляціями, свободно вдается въ гортанную щель и при фонаціи встрѣчается съ другою равномерно утолщеною ложною голосовою связкой. Истинныхъ голосовыхъ связокъ видѣть не удается. Хотя изслѣдованіе мокроты бациллъ и не обнаружило, но, судя по рѣзкому исхуданію и по физическимъ измѣненіямъ въ легкихъ (притушеніе сверху спереди и сзади и бронхиальное дыханіе), найденныя измѣненія были, вѣроятно же всего, туберкулезнаго характера.

с) Ново-образованій гортани—4 (3 полипа гортани и 1 саркома). У больной Петровой изъ Ростова 50 лѣтъ, крѣпкаго тѣлосложенія и цвѣтущаго здоровья, уже два года страдавшей полной афоніей, найденная въ Sinus Morgagni слѣва, нѣсколько впереди отъ *proces. Vocalis*,

опухоль величиною въ лѣсной орѣхъ, сидящая на тонкой, но короткой ножкѣ, была удалена помощью Schrötter'овскаго пинцета, послѣ предварительнаго смазыванія гортани, въ два приѣма, 20% растворомъ *sosain. muriat. Merk'a*. При ларингоскопическомъ изслѣдованіи послѣ операціи трудно было замѣтить мѣсто опухоли. Кровотеченія не было совсѣмъ и больная два года страдавшая афоніей, заговорила совершенно чисто послѣ операціи. Полпизъ на лѣвой истинной голосовой связкѣ величиной въ горошину, сидящій на широкой ножкѣ, у 48 лѣтняго мужчины былъ удаленъ въ нѣсколько сеансовъ по частямъ.

d) Параличей гортанныхъ мышцъ—6 (изъ нихъ: одинъ случай паралича *m. cricoarytenoid. posticorum* у 47-лѣтняго мужчины—послѣ тифа, 1 случай паралича лѣваго возвратнаго нерва у молодой туберк. особы (пораженіе обоихъ легкихъ), 1 случай паралича праваго возвратнаго нерва у молодой, здоровой на видъ, особы, у которой тщательное изслѣдованіе обнаружило явленіи уплотненія правой верхушки, 1 случай пареза истин. голосов. связокъ у больной съ *Morbus Basedowi*, в 2 случая паралича *m. cricothyreoid. intern.*

e) Неврозъ гортани—нервный кашель—1.

Случай этотъ представляетъ большой интересъ по своей особенноти, въ виду чего считаю не лишнимъ привести вкратцѣ исторію болѣзни.

Больная Сахнина, 16 лѣтъ, изъ туберкул. семьи (отецъ и мать) поступила въ клинику съ жалобой на своеобразный кашель, боль въ горлѣ, общую слабость.

Средняго роста и тѣлосложенія, анемичная, съ плохоразвитою мускулатурою особа. На кожѣ и склерѣ ничего ненормальнаго. Со стороны сердца, легкихъ, печени и другихъ внутреннихъ органовъ, а также при ларинго-риноскопическомъ изслѣдованіи—ничего ненормальнаго. Ритмически, черезъ каждыя 4—5 минутъ, появляется приступъ кашля своеобразный по звуку (въ видѣ слова „пахъ“); въ каждомъ приступѣ по 4—5 выдыхательныхъ спазматическихъ толчка (пахъ, пахъ, пахъ и т. д.). При этомъ она дѣлаетъ сначала глубокое вдыханіе, за которымъ слѣдуетъ кашлевой толчекъ, затѣмъ опять глубокое вдыханіе, опять кашлевой толчекъ и т. д. 4—5 разъ.

Особенность этого случая состояла въ томъ, что всякій разъ при надавливаніи на шеѣ слѣва между ножками *m. Sternocleido-mastoid.* можно было вызвать приступъ кашля такого же характера. Приступъ кашля длился до тѣхъ поръ, пока не прекращалось давленіе; приступъ можно было по произволу удлинить на какое угодно время и вызвать въ какое угодно время (стоило только надавить на упомянутое мѣсто).

Всякое раздраженіе различныхъ мѣстъ тѣла (какъ-то уколъ, щипокъ, прикосновеніе горячимъ или холоднымъ, надавливаніе и т. д.) не оказывало никакого вліянія на продолжительность приступа. Очевидно мы здѣсь имѣли дѣло съ мѣстнымъ раздраженіемъ п. *recurrentis sinistri*, раздраженіе котораго усиливалось при давленіи. Подробное описаніе и обсужденіе случая будетъ предметомъ отдѣльнаго сообщенія.

f) Сифилисъ гортани—14 случаевъ.

Изъ нихъ: 2 случая гуммозныхъ опухолей ложныхъ голосовыхъ связокъ, случаевъ гуммъ (2 величиной въ горошину) въ межчерпаловидномъ пространствѣ, случай сифилитической язвы *epiglottidis*; случай сифилитического ларингита, случай язвы въ межчерпал. складкѣ, въ остальныхъ случаяхъ (8)—язвы истинныхъ и ложныхъ голосовыхъ связокъ.

g) Инородныхъ тѣлъ гортани—1 случай.

Изъ *Sinus Pyriformis* правой стороны удалена была, помощью *Schrötter*'овскаго пинцета, гречневая каша въ количествѣ $\frac{1}{4}$ ложки (чайной), которой больной священникъ „подавился“ за 4 дня до появленія въ клинику.

2. Заболѣваній носа—52.

Изъ нихъ:

a) Rhinitis chronica hypertrophica	17.
b) ” ” atrophica	13.
c) ” acuta.....	4.
d) Ulcera nasi luetica	1.
e) Perforatio septi narium (lues)	2.
f) Polypus nasi.....	5.
g) Ozaena	6.
h) Eczema nasi.....	3.

При лѣченіи гипертрофическаго ринита прекрасные результаты получались отъ гальвано-каутеризаціи слизистой оболочки раковинъ, примѣнявшейся въ широкихъ размѣрахъ. Операція производилась послѣ предварительнаго смазыванія слизистой оболочки 20% растворомъ *Cocain'a Muriat. Merk'a*, въ три приема, что давало полную анестезію. Отравленіе получалось только въ 2 случаяхъ,—въ одномъ случаѣ—легкое, а въ другомъ—тяжелое (сильное сердцебіеніе, расширеніе зрачковъ, головокруженіе, сухость во рту, судороги въ мышцахъ рукъ, сильная боязнь чего то и т. д.). Всѣ полипы удалялись помощью холодной петли, послѣ предварительнаго смазыванія носа 20% раствор. *Cocain'a*.

3. Заболѣваній уха—93 случая.

Изъ нихъ:

а) Гнойныхъ воспаленій уха съ прободеніемъ барабанной перепонки	36.
б) Воспаленіе наружнаго уха	6.
с) Хронич. катар. воспал. средняго уха	13.
д) Остраго воспаленія средняго уха	2.
е) Гнойное воспаленіе средняго уха съ нагноеніемъ сосцевиднаго отростка	3.
ф) Полипъ уха	3.
г) Инородныхъ тѣлъ уха	25.
h) Пораженій лабиринта	2.
і) Интерстиціальное воспаленіе средняго уха	2.

Случай глухоты послѣ недѣльнаго употребленія хинина, продолжавшейся 11 дней, окончившейся выздоровленіемъ.

4. Пораженіе задней стѣнки зѣва	23.
Изъ нихъ хроническій катаръ	4.
Острый	3.
Сосочковый катаръ зѣва	11.
Сухой хроническій катаръ	4.
Сосочковый грануляц. катаръ зѣва, осложненный хронич. воспал. гортани	1.
5. Жаба вообще	58.
Изъ нихъ простыхъ катаральныхъ	20.
Флегмонозныхъ ангинъ	11.
Фоликулярныхъ	24.
Дифтеритныхъ	3.
(одинъ случай у 66-лѣтней дамы).	

6. Случаевъ гипертрофіи миндалинъ	9.
-----------------------------------------	----

Во всѣхъ случаяхъ миндалины удалялись помощью тонзиллотомы Mathieu.

Всѣ случаи тонзиллотоміи давали незначительное кровотеченіе, останавливавшееся обыкновенно сейчасъ же послѣ полосканія зѣва, нѣсколько разъ, 1⁰/₀ растворомъ танинна.

Въ одномъ только случаѣ случилось угрожавшее жизни кровотеченіе. Больная г-жа М., 52 лѣтъ, явилась на амбулаторный приемъ XI/16 настоящаго года съ жалобой на астматическіе припадки, появляющіеся преимущественно ночью, во время сна, а также на невоз-

можность дышать носомъ. Припадки эти бываютъ съ больною по нѣсколько разъ въ ночь.

При изслѣдованіи носа спереди (риноскопіи задней произвести нельзя было) и полости рта, найдена была сильная гипертрофія нижнихъ раковинъ (вслѣдствіе чего носовые ходы сильно стѣснены) и сильно увеличенныя миндалины. Такъ какъ, по заявленію сопровождавшаго больную студента К., бывшими на консультаціи врачами, не найдено было никакихъ измѣненій, могущихъ объяснить эти припадки, то явленія эти были объяснены найденными измѣненіями со стороны носа и миндалинныхъ железъ. Предложено было гальванокаустическое прижиганіе носовыхъ раковинъ и удаленіе миндалинъ. Въ $\frac{1}{4}$ 3-го часа того же дня сдѣлана была тонзиллотомія лѣвой стороны, при чемъ удаленъ кусокъ величиною въ миндальный орѣхъ, что соотвѣтствовало, приблизительно, $\frac{1}{3}$ всей железы tonsillotom'омъ Mathieu.

Послѣ 5 минутнаго полосканія растворомъ Kal. Hypermang. кровотеченіе остановилось и больная была отпущена домой. Около 3 часовъ пополудни (черезъ $\frac{3}{4}$ ч. послѣ опер.) больная замѣтила появленіе крови въ мокротѣ, и къ 5 часамъ кровотеченіе стало чрезвычайно обильнымъ и ничѣмъ неудержимымъ. Въ половинѣ 6-го вечера больная доставлена въ клинику. При осмотрѣ мѣста операціи оказалось, что изъ раны сочится кровь какъ изъ губки. Полосканья ледяной водой, водой съ fer. sesquichlorat., смазываніе кровоточащей поверхности цѣльнымъ ol. martis, liq. alumen. acetic. не остановили кровотеченія, а также не оказало никакого дѣйствія впрыскиваніе Ergotin'a подъ кожу. Около 8 часовъ появились припадки острой анеміи: тошнота, рвота, похолодненіе конечностей; обморокъ и судороги въ нижнихъ и верхнихъ конечностяхъ; такихъ припадковъ было 6. Сдѣланное гальванокаустическое прижиганіе, а затѣмъ прижиганіе Пакеленомъ, нѣсколько уменьшили кровотеченіе, которое остановилось совершенно только въ половинѣ 12-го часа ночи. Ровно черезъ недѣлю, послѣ отпаденія струпа, появилось ночью кровотеченіе, продолжавшееся $4\frac{1}{2}$ часа, остановленное также послѣ прижиганія Пакеленомъ. Причина кровотеченія выяснилась вскорѣ: больная страдаетъ интерстиціальнымъ нефритомъ. Бѣлокъ въ мочѣ, вѣсъ—1010 и уремическіе припадки, во время которыхъ и найдены измѣненія со стороны мочи, повторное изслѣдованіе которой внѣ припадковъ, кромѣ малаго удѣльнаго вѣса, ничего ненормальнаго не давало.

7. Ulcus uvulae—1—8) Carcinoma linguae—1.

Въ остальныхъ случаяхъ діагнозъ не отмѣченъ.

На амбулаторномъ приѣмѣ обращалось большое вниманіе на дезинфекцію. Инструменты металлическіе дезинфицировались погруженіемъ въ кипятокъ, а каучуковые—крѣпкимъ растворомъ *Kal. Hypermang.* и 5% раств. *Acid. Carbol.*

Въ кабинетѣ факультетской терапевтической клиники на 1 января 1892 г. состояло аппаратовъ, инструментовъ, книгъ и атласовъ 278 нумеровъ на сумму 6,359 р. 67 к.; въ теченіе отчетнаго года приобретено 12 нумеровъ на сумму 222 р. 61 к. Къ 1 января 1893 г. въ кабинетѣ состоитъ 290 нумеровъ на сумму 6,582 р. 28 к.

27. Факультетская хирургическая клиника.

За истекшій годъ въ хирургической клиникѣ были произведены слѣдующія работы:

I. Профессоромъ клиники В. Ф. Грубе редактированіе объемистаго и полного руководства по зубнымъ болѣзнямъ *Scheff'a*.

II. Штатнымъ ординаторомъ клиники М. М. Кузнецовымъ: 1. „Матеріалы къ ученію объ асептикѣ и сухомъ асептическомъ способѣ производства операций и лѣченія ранъ“. Хирургическій Вѣстникъ, февраль 1892 г. 2. Къ вопросу о способахъ лѣченія кишечныхъ фистулъ“ будетъ напечатана въ Хирургическомъ Вѣстникѣ, январь 1893 г.

III. Студентомъ Маленюкомъ закончена и отослана для напечатанія его работа: „О замѣщеніи дефектовъ въ костяхъ при помощи имплантаціи костныхъ стружекъ по способу *Senn'a*“.

Общее число стаціонарныхъ больныхъ было 109, изъ нихъ умерло 11 (10,09%).

Такой нѣсколько высокій процентъ смертности объясняется тѣмъ, что въ клинику принимались больные, которые представляли научно-діагностическій интересъ, хотя въ прогностическомъ отношеніи уже заранее можно было ожидать неудовлетворительныхъ результатовъ.