

причины, которая заключается въ по-
годѣ, или въ такъ называемыхъ атмо-
сферическо-шельорическихъ отноше-
ніяхъ, имѣющихъ силу производить по-
вальная болѣзни не только у людей, но
и у домашнихъ животныхъ. Причина
такого рода еще усиливается спече-
ніемъ нѣкоторыхъ случайныхъ обсто-
ятельствъ. Въ настоящемъ случаѣ, дожд-
ливое минувшее лѣто, довольно теплая
и грязная осень, внезапно прерванная
сильными морозами и суровою зимою;
содержаніе рогатаго скота на гряз-
ныхъ загонахъ, подъ открытымъ небомъ,
гдѣ оставался онъ и во время моро-
зовъ; сверхъ-шаго дурной кормъ въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ, безъ всякаго сомнѣ-
нія дали поводъ въ появленію описы-
ваемой повальной болѣзни, которая
сначала бывъ ограничена, усилилась не
вниманіемъ, въ больше незнаніемъ хо-
зяевъ, ибо обѣ болѣзни первоначаль-
но незаразительныя, послѣ продолжи-
тельнаго своего шеченія, принимающъ,
какъ и другія эпизоотическія, за-
разительный характеръ, и тогда уже
чрезъ сообщеніе больныхъ съ здо-
ровыми болѣе распространяются. Надоб-
но еще пришомъ замѣтишь, что бо-
лѣзнь эта обыкновенно случается шоль-
ко лѣтомъ во время засухи, осенью же
и зимой весьма рѣдко, но за то, въ по-
слѣднемъ случаѣ, она гораздо зла-
чественнѣе.

4) О повальной болѣзни рогатаго скота въ окрестностяхъ города Харькова.

Въ концѣ прошлой осени, при на-
чалѣ морозовъ, въ окрестностяхъ Харь-
кова появилась у рогатаго скота по-
вальная (эпизоотическая) болѣзнь, до-
сихъ-поръ еще продолжающаяся. Эта
эпизоотія состояла изъ двухъ болѣз-
ней, иногда отдельно, а иногда свирѣп-
ствующихъ вмѣстѣ; одна названа ящи-
ромъ, прыщи во рту (Iues oris, Maulseuche),
другая копытною болѣзнию (Iues pedum,
Klauenseuche). Обѣ эти болѣзни, во всѣхъ
мѣстахъ окрестности, начали поражать
въ одно почти время значительное ко-
личество рогатаго скота, а кое-гдѣ и
свиней. Это единовременное пораженіе
доказываетъ, что произоходженіе сихъ
болѣзней зависитъ отъ вліянія какой-
то общей, единовременно дѣйствующей

Вотъ описаніе, и практическіи из-
ложеніе лѣченіе этой болѣзни.

Тамъ, гдѣ болѣзнь не такъ сильна, еще до полнаго развитія оной, урога-
шаго скопа позывъ на кормъ умень-
шается и жвачка совершающа медлен-
ѣ. Вскорѣ животная переспающа
ѣсь, жвачка останавливается совер-
шенно; за-шо рождающа сильная жаж-
да, и они во время водопоя охотно
держатъ морду въ водѣ. Черезъ нѣ-
сколько дней не берушъ корму вовсе,
или взявиши держатъ во рту не пере-
жевывая; припомъ изъ рта шиенется
клей въ видѣ нипонъ, который по уг-
ламъ рта скапливается пѣной. Въ то
время, осматривая полость рта, кромѣ
исѣтвенной красноты и опухоли слизи-
стой перепонки рта, замѣчаешь шамже
прыщи или маленькие пузырьки, напол-
ненные жидкостью, изъ которыхъ одна
часть обращается въ спрунья, другая
переходитъ въ поверхносныя изъязв-
ленія, преимущественно на языкѣ и де-
снахъ. Ежели же болѣзнь усиливается,
то эти припадки увеличиваются; въ то
время сильная краснота примѣчающа
не только во рту, но и въ зѣваѣ, прыщи
бывающа величиною въ горохъ и больше,
похожи на молошницы или афты у дѣ-
шней, изъ которыхъ въ скромъ времени
образующа лявинки и трещинки на
языкѣ, и прочихъ частяхъ слизистой
перепонки рта; беззубный же край пе-
редней челюсти принимаетъ видъ сы-
раго мяса. Вследствіе этого живот-
ная отъ сильной боли скрежещущъ зу-
бами, и избѣгающа всякихъ соприкосно-
веній съ спраждущимъ ртомъ; ишомъ,

отъ совершенной невозможности при-
нимать кормъ, слѣдующа худоба и из-
нурѣніе даже съ признаками гнилой го-
рячи. Въ то время, или даже и прежде,
животная болѣшею часщю лежатъ или
спояшь, и вовсе не прохаживающа, а
если бываютъ понужлены въ эпому, то
начинающа хромать одной ногой, иногда
двумя, рѣдко въ одно время всѣми че-
тырьмя. Осматривая болѣшую ногу, на
вѣничкѣ и между раздвоеніемъ копытъ,
примѣчаешь сильный жаръ, красноту и
опухоль, переходящія иногда въ нарывы;
послѣ чего появляюща многочисленные
прыщики или пузырьки, обращающіеся
въ спрунья, или производящіе язвы, съ
опѣленіемъ, зловонной и разъѣдающей
влаги; отчего рождаются въ копытѣ
сищи, а иногда роговое копыто от-
валивается отъ мясныхъ частей онаго.
Кромѣ рта и копытъ, поражающа
этой сыпью и отъ ней происходящими
язвичками у коровъ шишами.

Изъ описанія видно, что эта эпизо-
отія есть лихорадочная болѣзнь, со-
провождаемая сыпью и язвичками слизи-
стой перепонки полости рта, языка,
и зѣва, и шановою же сыпью и язвами
на вѣничкѣ и между раздвоеніемъ ко-
пытъ, и пошому обѣ эти болѣзни одинаково
свойствы, и только разнятся по мѣсту. Всравненіи съ человѣческими
болѣзнями, эта эпизоотія похожа на
эпидемію молошницу или афты у дѣ-
шней, и на такъ называемую крапивную
лихорадку (febris bullosa). Свойственна

рогатому скоту, овцамъ лучшей породы и свиньямъ; поражаешь ихъ иѣсколько разъ въ жизни, и въ продолжительномъ своемъ теченіи переходишь въ зарашельную.

Леченіе.

Ежели во рту замѣтна одна только красношата и опухоль, то всѣмъ апимъ животнымъ давашь для пищи соленую воду, съ мукой, а если можно, то и расщворенную въ водѣ, такъ называемую, конопляныхъ смѣянъ макуху. Но ежели появились уже во рту прыщи и язвинки, то надобно намазывать ихъ сѣдующими средствами:

а) Возьми чистой тепловой воды 2 фунта, соляной кислоты (*acidi triacetic*) 2 ложки, меду $\frac{1}{4}$ фунта, муки сполько же, и смѣшивъ, намазывай рошъ 3—4 раза въ теченіи дня.

б) За неимѣніемъ соляной кислоты, сѣдлай слѣдующій составъ, который одинакожъ менѣе действителенъ: въ 1-мъ фунтѣ чистой тепловой воды, раствори 6 ложекъ поваренной соли, и къ эшому прибавь полъ-стакана хорошаго уксусу и сполько же меду.

Ежели же при употребленіи этихъ средствъ, язвинки не поправляються, то въ вышеприведенномъ составѣ увеличиваешь количество соляной кислоты, или нужно намазывать язвинки смѣсью

изъ 3 частей яичнаго бѣлка и 1 части квасцовъ въ порошкѣ, или отваромъ дубовой корки съ добавленіемъ малаго количества камфорного спирта; или на конецъ, въ упорнѣйшихъ случаяхъ, т. е. когда язвы сдѣлаются поглубже, известковою водою, (которая приготавливается изъ 1 фунта отварной воды, и 2 ложекъ негашеной извести). При этомъ давашь воду, прибавляя къ ней купороснаго масла до вкуса умѣренной кислоты.—Самое же намазываніе рта сказанными средствами, производится слѣдующимъ образомъ: берешся деревянная палочка съ привязаннымъ въ концу вускомъ холста; эшой мазилкой вышираешь до-чиста рошъ каждого животнаго. При чемъ наблюдаешься, чтобъ всякий разъ, при переходѣ отъ одного животнаго въ другому, мазилка была тщательно вымытая водой, туже въ какой-нибудь посудѣ находящейся. Когда такимъ образомъ очищаешь рты животныхъ, ихъ намазываешь помошю эшой мазилки, которую всякий разъ нужно вмакивать въ одинъ изъ вышепомянутыхъ сосудовъ, наблюдая туже чистоту при переходѣ отъ одного въ другому животному.

Употребляемое же иногда нашіраніе рта солью, горчицею, чеснокомъ и т. п., скобленіе ножомъ, и проч., какъ средства сильно-раздражающія и усиливающія болѣзнь, не должны быть употребляемы.

Отъ болѣзни вонъшъ прикладываетъ ся въ нимъ чистая глина съ уксусомъ, или онѣ обмываются часто холодной водой съ уксусомъ, или примочкой со спавленной изъ 1 фунта рѣчной воды и 1 лопа свинцоваго уксусу. Образовавшійся на вѣнчикѣ нарывъ разрѣзается, и рана вымывается ежедневно теплымъ ошваромъ изъ сѣнной шрухи. Образовавшія же отъ сыпти язвинки намазываются мазью изъ бѣлила, а въ упорныхъ случаяхъ съ добавленіемъ къ ней камфоры, скпицдарного масла и желтка. Если же подъ рогомъ склоняется машерія, то выкроишь ножемъ вусокъ онаго для свободнаго исщеченія гноя; иначе отъ возникшихъ свищей сойдешь цѣлый рогъ вонъшъ, и оставишь злокачественную или весьма медленную болѣзнь. Ненада и здѣсь употребляешь раздражающихъ средствъ, какъ напр.: заливанія горячимъ саломъ, и проч.

Случающаяся у коровъ опухоль и сыпь на пышкахъ, обмываются теплой водою, въ случаѣ же язвинокъ, ошваромъ дубовой корви съ водкой.

Кромѣ этихъ средствъ, діешепическаго содержанія, и предохранительныхъ мѣръ, внутреннія средства не нужны.

Предъ начашіемъ леченія, надобно удалишь причину, произведшую эти болѣзни, и въ особенности поддержи-

вающую оныя. Животныхъ не содержать на дворѣ, а въ чистыхъ и сколько возможно теплыхъ хлѣвахъ съ хорошей подстилкой, и въ безусловномъ покое. Дѣлашь часто шренія всей кони сухой соломой для поддержанія испарини. Для корму давашь удобоваримую мягкую пищу, напр.: муку съ водой, а не сухое сѣно. Гдѣ же только начинаешь оказываться болѣзнь, то ошѣлишь сей частъ здоровыхъ отъ больныхъ, прекрашишь между имми сообщеніе, и сильнымъ животнымъ иногда нужно пускать кровь; всѣмъ же давашь лизашь соль или поиши ихъ соленою водою, содержа пришомъ въ удобныхъ хлѣвахъ и на хорошемъ кормѣ.

Э. Профес. Докторъ Медиц.
К. Вишневскій.
