

ВЪ ПАМЯТЬ

50-ти лѣтъ ученой дѣятельности

Николая Николаевича

БЕКЕТОВА

(1853—1903).

1. О нѣкоторыхъ новыхъ случаяхъ химиче-
скаго сочетанія и общія замѣчанія объ
этихъ явленіяхъ. (1853).
2. Изслѣдованія надъ явленіями вытѣсненія
однихъ элементовъ другими. (1865).
3. О взаимномъ обмѣнѣ галоидныхъ солей
въ расплавленномъ состояніи. (1903).
4. Списокъ научныхъ работъ.

Издание Общества Физико-химическихъ Наукъ при
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Харьковскомъ Университетѣ.

ХАРЬКОВЪ.

Типографія Адольфа Дарре, Московская, 19.
1904.

Печатаніе и выходъ въ свѣтъ разрѣшается на основаніи § 19 уст. Общества
Физико-Химическихъ Наукъ при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ.

15 Января 1904 года. Предсѣдатель Общества проф. *П. Осиновъ*.

Возникновение и жизнь того ученаго Общества, которое предприняло изданіе нѣкоторыхъ трудовъ Николая Николаевича Іекетова, неразрывно и тѣсно связано съ его именемъ. Въ 1870 г., вмѣстѣ съ другими своими товарищами, Николай Николаевичъ, тогда еще профессоръ Харьковскаго Университета, возбудилъ ходатайство объ учрежденіи Общества Опытныхъ Наукъ съ двумя секціями—Физико-химическою и Медицинскою. Нѣсколько замедлившееся утвержденіе устава этого новаго ученаго Общества состоялось осенью 1872 г.

19 Декабря этого года Физико-химическая Секція имѣла первое свое засѣданіе. Съ тѣхъ поръ и вплоть до перехода въ Академію наукъ, Николай Николаевичъ безсмѣнно состоялъ предсѣдателемъ Секціи и былъ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ ея.

Въ 1893 г. исполнилось 40 лѣтъ ученой дѣятельности Николая Николаевича; Секція пожелала увѣковѣчить это событие учрежденіемъ преміи имени академика Н. Н. Іекетова, что ей и удалось вполнѣ.

Съ того же 1893 г. Секція преобразовалась въ Общество Физико-Химическихъ Наукъ. Желая нынѣ озnamеновать полу-вѣковой юбилей своего почетнаго члена, Общество Физико-Химическихъ Наукъ предприняло предлагаемое изданіе. Общество при этомъ имѣло въ виду также, что изданіе, сопоставляющее взгляды крупнаго ученаго на разстояніи 50 лѣтъ, кромѣ специального должно представить и общий интересъ.

о нѣкоторыхъ новыхъ случаяхъ
ХИМИЧЕСКАГО СОЧЕТАНИЯ
и
общія замѣчанія объ этихъ явленіяхъ.

Н. Бекетова.




Представлено во 2-е отдѣленіе физико - математического
факультета С.-Петербургскаго університета

для получения

СТЕПЕНИ МАГИСТРА ХИМИИ.



Перепечатана съ изданія 1853 года.





Тип. А. Дарро.

Н. Н. Бекетовъ — проф. Харьковскаго Университета. 1856 г.

Явленія сочетанія, Substitutions par résidus (Gerhardt), Pararung, представляютъ самыя ясныя реаціи и, обнимая большую часть дѣйствій органическихъ веществъ другъ на друга, даютъ возможность усложнять эти соединенія; потому онѣ болѣе другихъ изслѣдованы учеными.

Желая ближе познакомиться съ этими явленіями и, если можно, содѣйствовать развитію этого ученія, я предпринялъ рядъ изслѣдованій, какъ практическихъ, такъ и теоретическихъ, въ этомъ направленіи.

Дѣйствіе нѣкоторыхъ соединеній съ этой точки зренія не было еще изучено, какъ напр., фосфористаго водорода, RH_3 ; аналогія его съ амміакомъ, который такъ легко входитъ въ сочетанія, даетъ право думать, что и онъ можетъ представлять подобные явленія; и потому я счелъ не безполезнымъ рѣшить это опытомъ. Дѣйствіе альдегида и ацетона было также предметомъ моихъ изслѣдованій, которыя, однако, еще не привели меня къ рѣшительнымъ результатамъ.

Наконецъ, я производилъ нѣкоторыя ужѣ известныя сочетанія при другихъ химическихъ условіяхъ.

Въ общей части моихъ изслѣдованій я имѣлъ цѣлью дойти до болѣе опредѣленного понятія объ этихъ явленіяхъ и показать ихъ настоящую analogію съ другими химическими явленіями.


Нѣкоторыя общія замѣчанія о явленіяхъ сочетанія.

Многія соединенія, образованіе которыхъ относятъ къ явленіямъ этого рода, какъ-то: сложные эфиры, амиды и т. п.—были давно извѣстны химикамъ (уксусный эфиръ былъ извѣстенъ Шеле, а первый амидъ—щавелевой кислоты—былъ открытъ Дюма въ 1829 году), но они не были соединены въ общую группу по аналогіи ихъ химическаго происхожденія, которое объяснялось различно для различныхъ соединеній. Особенность и общность этихъ явленій первый подмѣтилъ Жераръ при образованіи двойныхъ кислотъ, которымъ онъ тогда (1849 г.) предложилъ¹⁾ название *acides copulés*, сочетанныхъ кислотъ, принятое тотчасъ Берцеліусомъ; но понятіе сочетанія (*accouplement*) относили только къ образованію этихъ кислотъ. Наконецъ, Жераръ, основываясь на болѣе точныхъ аналогіяхъ, соединилъ образованіе сложныхъ эфировъ, амидовъ, сочетанныхъ кислотъ и т. п. въ одинъ общий классъ явленій, связавъ ихъ двумя законами—*основности* (*loi de basicité*) и *остатковъ* (*loi des résidus*),—и такимъ образомъ положилъ основаніе учению о явленіяхъ сочетанія, которое изложилъ въ своемъ классическомъ сочиненіи *Précis de chemie organique* 1844—45, где онъ эти явленія называетъ также замѣщеніемъ остатками (*substitution par résidus*). Онъ и послѣ развивалъ это учение въ разныхъ мемуарахъ, такъ наприм., въ общей съ Лораномъ статьѣ—*Sur les anilides et les acides amidés*²⁾; также въ издавае-

¹⁾ Ann. ch. Ph., t. LXXII.

²⁾ Ann. ch. Ph. 3. 1848, t. XXI.

момъ ими отчетъ о химическихъ работахъ онъ еще въ 1851 году¹⁾ помѣстилъ общую съ Шанселемъ статью—*Sur la basicit  des acides.* Жераръ опредѣляетъ эти явленія слѣдующимъ образомъ: два соединенія, дѣйствуя другъ на друга, выдѣляютъ элементы воды (въ нѣкоторыхъ случаяхъ соляную кислоту и др.), а остатки соединяются или сочетаются; если же, при другихъ обстоятельствахъ, къ продукту сочетанія присоединяется выдѣлившіеся элементы, то возстановляются опять первоначальныя соединенія. Это опредѣленіе, какъ очень хорошо замѣчаетъ Штрекеръ²⁾, слишкомъ общее, такъ что подъ него подходитъ всякое двойное разложеніе, и въ такомъ случаѣ всѣ соли нужно также называть сочетанными соединеніями; далѣе, впрочемъ, мы увидимъ, какая дѣйствительно аналогія существуетъ между этими явленіями. Наконецъ, это опредѣленіе не отдѣляетъ сочетанія отъ металептическаго замѣщенія; впрочемъ, и самъ Жераръ не отдѣляетъ ихъ совершенно, что уже видно по его названию *substitution par résidus*. Какъ видно, онъ въ этомъ случаѣ основывается только на симметрії реакціи, въ чёмъ, какъ мы далѣе увидимъ, только и заключается сходство между ними; но замѣтимъ, что большая часть химическихъ явленій, даже многіе случаи прямого соединенія разсматриваются учеными какъ двойные разложения или замѣщенія, такъ напр., соединеніе хлора съ водородомъ выражають, и весьма основательно³⁾, такъ:




¹⁾ Comptes Rendus des tr. dech. par Laurent, Gerhardt et Chancel. 1851.

²⁾ Ann. ch. Phr. 1848, B. 48, S. 47.


³⁾ Это мнѣніе приобрѣтаетъ большую вѣроятность вслѣдствіе опытовъ Гр. Фавра и Зильберманна (Inst 1848), которые показали, что при соединеніи освѣтленного хлора съ водородомъ отдѣляется болѣе теплорода, нежели при соединеніи хлора, не подвергшагося дѣйствію солнечныхъ лучей; это они объясняютъ тѣмъ, что соединенію Cl_2 съ H_2 предшествуетъ какъ бы разложеніе хлора, которое именно производится свѣтомъ.

II, вообще, всѣ реакціи, при которыхъ не измѣняются объёмы, суть двойныя разложенія, что, какъ мы впослѣдствіи увидимъ, имѣетъ мѣсто и при сочетаніяхъ даже для жидкаго состоянія. Указавъ на аналогію всѣхъ этихъ химическихъ явлений, какъ двойныхъ разложеній съ точки зрѣнія симметріи реакцій, пост到达емся дать болѣе точное понятіе о явленіяхъ сочетанія.

Чтобы опредѣлить ихъ химической характеръ, обратимъ прежде всего вниманіе на дѣйствующіе, т. е. перемѣщающіеся во время сочетанія элементы; для этого разсмотримъ подробно, какія могутъ происходить реакціи въ разныхъ случаяхъ сочетанія. Для примѣра возьмемъ образованіе бензойнаго эфира, которое можетъ происходить четырьмя различными способами: самый простой— непосредственнымъ дѣйствиемъ бензойной кислоты на спиртъ:




Жераръ выражаетъ это слѣдующимъ уравненіемъ:




означающимъ, что бензойная кислота дѣйствуетъ (*est actif*) электро-огрицательнымъ элементомъ, выдѣляя кислородъ, а спиртъ отдаетъ положительный элементъ $2H$; онъ вообще рассматриваетъ такимъ образомъ всѣ сочетанія съ выдѣленіемъ воды, выражая это общимъ уравненіемъ: $a - O - H_2 = H_2O + y$. Здѣсь опытъ не можетъ показать, дѣйствительно ли реакція такъ происходитъ, но другіе случаи образования эфировъ могутъ дать намъ возможность решить этотъ вопросъ. Разберемъ взаимное дѣйствіе сѣрновинной и бензойной солей калія:

¹⁾ Мы употребляемъ правильное обозначеніе Жерара (въ 2 об.), основанное по преимуществу на законахъ сочетаній, составляющихъ предметъ этого разсужденія и безъ помоши котораго ихъ невозможно выразить; это одно могло заставить насъ изображать реакціи формулами, не принятыми еще большинствомъ ученыхъ.




Тутъ самая реакція показываетъ, откуда выдѣляются $2H$, замѣщенные здѣсь $2K$, и въ то же время опредѣляется химическое значеніе этого водорода, заключающеся, именно, въ его замѣстительности металломъ и въ томъ, что онъ выдѣляется при дѣйствіи соляной кислоты въ реакціи, которая чрезвычайно сближаетъ образованіе галоидныхъ эфировъ съ явленіями сочетанія:




Въ разбираемомъ нами случаѣ не видно только, откуда берется четвертый эквивалентъ кислорода сѣрнокислой соли; вѣроятнѣе, что изъ сѣрновинной соли, какъ соединенія болѣе электроотрицательного характера, тогда какъ въ первомъ случаѣ, по той же причинѣ, онъ, вѣроятно, выдѣлялся изъ бензойной группы. Но замѣтимъ, что органическіе остатки C_7H_5O и C_2H_5 въ обоихъ случаяхъ постоянны, только 1 экв. кислорода присоединяется то съ однимъ, то съ другимъ. Впрочемъ, это не измѣняетъ химического значенія его, потому что O спирта равнозначущъ съ однимъ изъ 1 экв. 'кислорода бензойной' кислоты: оба они встрѣчаются при дѣйствіи пятихлористаго фосфора, который не трогаетъ другого экв. O бензойной кислоты. Какъ видимъ, они играютъ ту же роль и при сочетаніи, потому-то мы выразили эту аналогію въ нашихъ формулахъ, отдѣливъ одинъ экв. O въ обоихъ соединеніяхъ; они же показываютъ аналогію типа этихъ соединеній съ типомъ воды—анalogію, которую Жераръ такъ хорошо провелъ черезъ цѣлые ряды спиртовъ и кислотъ.


Наконецъ, разберемъ еще два случая образованія сложныхъ эфировъ, которые еще лучше разъяснятъ намъ эту реакцію. Самый обыкновенный изъ нихъ встрѣчается при дѣйствіи хлористаго бензоила на спиртъ:



Тутъ реакція имѣеть только одно выраженіе, остатки C_7H_5O и C_2H_5 все тѣ же; второй эквив. кислорода берется отъ спирта. Но я уже замѣтилъ, что все равно, отъ какой бы группы онъ не брался, химическое значеніе его въ обоихъ случаяхъ должно быть одно и то же. Чтобы вполнѣ въ этомъ убѣдиться, я сдѣлалъ слѣдующіе опыты: нагреваю въ закрытыхъ трубкахъ смѣсь бензойно-кислого калия съ юдистыемъ этиломъ, а въ другой смѣсь того же эфира просто съ бензойной кислотой; при этомъ должна была произойти реакція, подобная 3-му случаю, но хѣста выдѣляющихся элементовъ и, следовательно, относительная роль органическихъ соединеній, здѣсь должны быть обратныя, а продуктъ тотъ же. И, дѣйствительно, результатъ опыта съ бензойной солью оправдалъ мои предположенія: образовался бензойный эфиръ съ выдѣленіемъ юдистаго калія. Но другой опытъ былъ нерѣшителенъ—реакція слѣд.:



или по аналогіи



Во второмъ опытѣ дѣйствующія сродства слабѣе, и потому его труднѣе было вызвать, чтобы произвести реакцію; это наскѣ убѣждаетъ, между прочимъ, въ томъ, что сочетанія происходятъ преимущественно на счетъ сродства выдѣляющихся элементовъ, тогда какъ сродство органическихъ остатковъ играетъ второстепенную роль. Эту послѣднюю мысль уже высказалъ Митчерлихъ въ своей статьѣ о сродствѣ химическихъ соединеній¹⁾, гдѣ онъ

¹⁾ An. ch. Ph. t. 3. 1840. Berz. Résumé des travaux de ch. et de phys. pour l'ann. 1841.

говоритъ, что образованіе сложныхъ эфировъ не происходитъ отъ взаимнаго сродства спирта и кислоты, какъ при дѣйствіи основанія на кислоту; но, къ несчастію, онъ замѣняетъ его катализитическимъ дѣйствіемъ электро-отрицательнаго тѣла. Берцеліусъ вполнѣ раздѣлялъ его мнѣніе. Мы видѣли, что эту силу можно просто замѣнить взаимнымъ сродствомъ выдѣляющихся элементовъ.

Опредѣливъ химическое значеніе этихъ элементовъ, намъ легко будетъ предвидѣть всѣ случаи сочетанія и самый характеръ этого явленія. Разобранныя нами реакціи уже позволили отчасти определить это значеніе, которое мы выразили въ формулахъ, но мнѣніе наше можетъ еще показаться произвольнымъ; теперь же мы увидимъ, что оно оправдывается и отношеніемъ химическихъ свойствъ дѣйствующихъ соединеній и продукта, вполнѣ соотвѣтствуя настоящему выражению закона *основности*, предложеннаго лѣтъ 12 тому назадъ Жераромъ, но требующимъ при настоящемъ состояніи науки нѣкоторыхъ измѣненій.

Извѣстно, что онъ изображаетъ этотъ законъ слѣдующимъ уравненіемъ: $a+b-1=Z$, т. е. основность (Z) продукта сочетанія равна суммѣ основностей ($a+b$) сочетающихся соединеній — 1. Но этотъ законъ примѣнимъ только къ нѣкоторымъ частнымъ случаямъ, преимущественно къ сочетанію нейтральныхъ или основныхъ тѣлъ съ кислотами. Въ нашемъ примѣрѣ (1 сл.) это уравненіе имѣеть слѣдующее значеніе по Жерару: $0+1-1=0$, т. е. сочетаніе спирта, основность котораго = 0, съ одноосновной кислотой даетъ нейтральный продуктъ. Штреккеръ замѣчаетъ въ своей статьѣ о сочетанныхъ соединеніяхъ, на которую мы уже ссылались, что этотъ законъ непримѣнимъ къ нѣкоторымъ случаяхъ сочетанія кислотъ, и потому предлагаетъ его измѣнить въ слѣдующей: $a+b-\frac{n^1}{2}=Z$, гдѣ n есть число эквив. выдѣляющейся воды;

¹⁾ Въ примѣненіи къ формуламъ Жерара этотъ законъ слѣдуетъ писать просто: $a+b-n=Z$, потому что, гдѣ выдѣляется по обыкновеннымъ формуламъ 2 экв. воды, тамъ обозначеніе Жерара показываетъ 1 экв.

эта формула, действительно, общіе и определеніе, потому что третій членъ $\frac{n}{2}$ имѣть не случайное или эмпирическое значеніе, какъ у Жерара, а определенное и притомъ въ прямой зависимости отъ реаціи, но въ этомъ только и состоить ея преимущество, существенной же разницы въ примѣненіи, какъ полагаетъ Штреккеръ, нѣтъ никакой: во-первыхъ, въ большей части случаевъ выдѣляется 1 экв. воды по обозначенію Жерара, а по обыкновен-
ной 2, следовательно, $\frac{n}{2}$ въ этихъ случаяхъ = 1. Тамъ же, гдѣ выдѣляется, по Жерару, 2 экв. воды, т. е. гдѣ 3-й членъ = 2, что всегда бываетъ при сочетаніи двуосновныхъ кислотъ, то по этимъ же формуламъ постепенно сочетаются 2 экв. нейтрального тѣла, напримѣръ, спирта, и потому нужно 2 раза вычитать 3-й членъ, следовательно, и въ этихъ случаяхъ, къ которымъ законъ Жерара, по мнѣнию Штреккера, будто бы, не примѣнимъ, они имѣютъ то же значеніе, какъ это и объяснилъ знаменитый фран-
цузскій химикъ въ своемъ журналь¹⁾ въ отвѣтѣ на статью герман-
скаго ученаго.

Но мы сейчасъ увидимъ, что есть много случаевъ, къ которымъ ни то, ни другое выраженіе закона основности непримѣнимо.

Въ прошломъ году Жераръ открылъ общій способъ образованія безводныхъ кислотъ (ангидридовъ) посредствомъ сочетанія двухъ экв. одноосновныхъ кислотъ, одинакихъ или различныхъ, такимъ обра-
зомъ онъ произвелъ бензойную, уксусобензойную и т. п. Кіоцца въ томъ же году увеличилъ число этихъ соединеній; примѣняя къ этому случаю законъ основности Жерара, получимъ: $1 + 1 - \frac{n}{2} = 1$,
уксусно-бензойный ангидридъ. Формула Штреккера $a + b - \frac{n}{2} = Z$,

гдѣ $\frac{n}{2} = 1$ даетъ то же самое. Слѣдовательно, по обоимъ выраженіямъ, въ продуктѣ должна получиться одноосновная кислота, тогда какъ на самомъ дѣлѣ получается тѣло, совершенно нейтральное, которое


¹⁾ Comptes rendus, 1850.

только, принявъ опять элементы воды, распадается на 2 экв. кислоты; этого результата ожидалъ, разумѣется, и самъ Жераръ, по своимъ понятіямъ о кислотахъ, но законъ-то его выражалъ другое. Приведемъ еще случай: Вилліамсонъ и Шансель открыли оба въ 1850 году общій случай сочетанія 2-хъ спиртовъ, частное примѣненіе котораго, когда оба экв. спирта одинаковы, есть образованіе такъ называемыхъ простыхъ эфировъ; къ этому сочетанію законы г.г. Жерара и Штреккера опять не примѣнимы, потому что сумма основности = нулю, слѣдовательно, должна получиться ничего не выражающая отрицательная величина. Итакъ, вотъ три случая сочетанія равно общихъ: сочетаніе одноосновныхъ кислотъ со спиртами, этихъ же кислотъ между собою, и наконецъ, сочетанія 2-хъ спиртовъ; и изо всѣхъ этихъ 3-хъ случаевъ, изъ которыхъ каждый можетъ произвести столько же сочетанныхъ соединеній, только къ первому, т. е. къ сочетанію кислотъ со спиртами, законы Жерара и Штреккера примѣнимы. Итакъ, мы имѣли полное право сказать вначалѣ, что этотъ законъ есть выраженіе только частнаго и именно этого случая сочетанія.

Но отчего же могло произойти такое противорѣчіе въ правилѣ, высказаннымъ пригомъ Жераромъ, проницательная логика котораго дала столь рациональное направленіе химическимъ изслѣдованіямъ, которое уже привело его изслѣдователей къ блестательнымъ результатамъ? Замѣтимъ, однако, въ пользу закона Жерара, что, въ то время какъ онъ его предложилъ (12 лѣтъ тому назадъ), известныя явленія сочетанія ограничивались сложными эфирами, винными кислотами, амидами, къ которымъ онъ совершенно примѣнимъ, — слѣдовательно, онъ удовлетворялъ настоящимъ требованиямъ науки; но теперь, особенно въ послѣдніе годы, столько прибавилось въ науку новыхъ и самыхъ разнообразныхъ случаевъ сочетанія, что явились потребность выразить ихъ болѣе общимъ и точнымъ закономъ.

Необщность закона Жерара зависитъ, по нашему мнѣнію, отъ того, что онъ не основанъ на химической причинѣ явленій сочетаній и основности: французскій ученый не обратилъ при-

этомъ вниманія на химическое значеніе дѣйствующихъ элементовъ. Въ разобранномъ нами примѣрѣ мы имѣли въ виду указать на это значеніе, выразивъ его формулами, смыслъ которыхъ тогда же отчасти объяснили; примѣннимъ ихъ теперь къ сравненію реакцій упомянутыхъ трехъ случаевъ сочетанія, т. е. сочетанія кислотъ между собою, кислотъ со спиртами и спиртовъ между собою:



Мы здѣсь выразили, что реакція во всѣхъ трехъ случаяхъ одна и та же; это, кажется, самое вѣроятное предположеніе: видѣ же этой реакціи мы уже опредѣлили при разборкѣ первого случая.

Замѣтимъ, что продукты всѣхъ трехъ реакцій, соединенія нейтральныя и при томъ такія, которыя уже не могутъ безъ разложенія вступить въ дальнѣйшія сочетанія. Это послѣднее обстоятельство для насъ самое важное: химическую причину его мы видимъ въ томъ, что дѣйствующія соединенія выдѣлили при сочетаніи весь тотъ водородъ, химическое значеніе котораго обусловливается эти явленія. Мы это выразили въ формулахъ, написавъ этотъ водородъ отдельно, хотя лучше было бы, по нашему мнѣнію, выразить это просто какимъ-нибудь знакомъ, какъ наприм., для спирта $C_2H_{(5^m+1^n)}$, потому что тогда эта формула нисколько бы

не напоминала такъ называемыхъ рациональныхъ формулъ, которыми многие химики выражаютъ расположение элементовъ, чего мы не имѣли претензіи представить. Мы хотѣли только сказать этимъ, что изъ 6-ти экв. водорода 5 экв. имѣютъ другое химическое значеніе (*m*) (мы далѣе будемъ имѣть случай говорить и обѣ этомъ значеніяхъ), нежели шестой (*n*); но, не желая теперь же вводить новое химическое означеніе, мы это выразили обыкновенными

формулами. Впрочемъ, мы совсѣмъ непроизвольно распредѣлили такимъ образомъ различное значеніе водорода въ этихъ соединеніяхъ; большинство химиковъ, основываясь на разныхъ реакціяхъ, отдѣляютъ въ нихъ і экв. водорода отъ другихъ. Берцеліусъ, Либихъ и ихъ школы давно уже отдѣляютъ въ нихъ элементы воды, что, какъ намъ кажется, приблизительно выражаетъ химическое значеніе этихъ двухъ элементовъ, и наши взгляды отличаются главное тѣмъ, что мы не идемъ далѣе этого значенія, не входя въ предположеніе о прелсуществованіи воды въ упомянутыхъ соединеніяхъ. Жераръ недавно, для выраженія аналогіи этихъ соединеній съ типомъ воды, представилъ ихъ именно тѣми формулами, которыя мы у него заимствовали для изображенія реакцій сочетанія; далѣе мы увидимъ, въ чёмъ, однако, иногда наши взгляды различны. Чтобы опредѣлить химическое значеніе этого водорода, напомнимъ, что во всѣхъ этихъ соединеніяхъ онъ болѣе или менѣе легко замѣщается металломъ; такъ напримѣръ, въ поташномъ спиртѣ $C_2H_5O_K$, который послужилъ Вилліамсону и Шанселю доказать настоящую теорію эфиризациіи и открыть такимъ образомъ цѣлый рядъ двуспиртныхъ эфировъ; этотъ же водородъ, вмѣстѣ съ однимъ эквив. кислорода, вступаетъ въ двойное разложеніе съ соляной кислотой при образованіи галоидныхъ эфировъ, какъ мы обѣ этомъ уже упоминали; такъ, вообще можно сказать, что этотъ водородъ съ соотвѣтствующимъ ему амфиднымъ элементомъ сохранили отчасти въ этихъ соединеніяхъ то химическое значеніе, которое они имѣли въ минеральныхъ, какъ напримѣръ: въ водѣ кислотахъ, соляхъ и т. д.

Явленія сочетанія, какъ мы видѣли, суть также двойныя разложенія и происходятъ именно на счетъ этихъ, такъ сказать, минеральныхъ элементовъ¹⁾, присутствіе которыхъ въ органическихъ

¹⁾ Остальные, находящіеся подъ непосредственнымъ химическимъ вліяніемъ углерода, можно назвать органическими. Намъ кажется, что углеродъ, соединяясь съ водородомъ, даетъ ему совсѣмъ другое химическое значеніе (по преимуществу металептическое), нежели то, которое онъ имѣеть въ соединеніи съ амфидными и галоидными тѣлами, гдѣ онъ играетъ роль металла.

соединенияхъ только и даетъ имъ возможность сочетаться: безъ нихъ это явленіе не можетъ происходить. При сочлененіяхъ въ большей части случаевъ выдѣляется вода (выдѣленіе соляной кислоты и т. д. есть только частный случай, который при томъ можно всегда свести, какъ мы далѣе увидимъ, на нормальный или болѣе общій, съ выдѣленіемъ воды) и водородъ ея $2H$ берется изъ обоихъ соединеній, электро-отрицательный же элементъ (O или сѣра)—то изъ одной, то изъ другой. Поэтому, изо всѣхъ элементовъ, химическое значеніе которыхъ обусловливаетъ эти явленія, на него слѣдуетъ обратить главное вниманіе для точнаго выраженія этихъ явленій; его, по справедливости, можно назвать *водородомъ сочетанія*, такъ какъ здѣсь только это значеніе его намъ и нужно выразить.

Такимъ образомъ, мы логически пришли къ тому, что этотъ-то водородъ и слѣдуетъ ввести въ *общее уравненіе сочетанія*, котораго *законъ основности*, какъ мы далѣе увидимъ, есть только частное значеніе. Перемѣнивъ такимъ образомъ въ уравненіи Жерара (алгебраическая форма котораго, выражающая число участвующихъ соединеній, останется та же) значеніе членовъ, получимъ: $aH + bH - cH = zH$ или болѣе простое и общепримѣнимое уравненіе: $a + b - c = z$, гдѣ коэффиціенты или члены a и b выражаютъ число экв. водорода сочетанія или замѣщающаго его металла въ двухъ сочленяющихся соединеніяхъ, c экв., выдѣляющагося въ видѣ воды, соляной кислоты или соли, водорода или металла, а Z —число оставшихся элементовъ сочетанія въ копулированномъ соединеніи. Для одно-водородныхъ тѣлъ, какъ въ нашихъ примѣрахъ, a и b равны 1-уѣ, $c = 2$ (выражая выдѣленіе одного экв. воды), а $Z = 0$, и значитъ, что копулированное соединеніе не можетъ болѣе сочетаться. Если бы одно изъ тѣлъ было двухъ или трехъ-водородное, какъ наприм., анилинъ и амміакъ и сочеталось съ однимъ $b = 1$, то Z будетъ равно въ первомъ случаѣ 1, а во второмъ 2, что значитъ, что продуктъ этихъ сочетаній, наприм., хоть этиланилинъ, можетъ вступать еще въ одно сочетаніе, или для амміака получившійся, наприм., этиламінъ можетъ еще вступить въ два сочетанія; следовательно, наше уравненіе выражаетъ число возможныхъ

сочетаній или, какъ мы это назовемъ,—*степень сочетанія*; по-моему, спирты и однососновныя кислоты имѣютъ только одну степень сочетанія, анилинъ, этиламинъ и т. п. и всѣ двухосновныя кислоты (также сахаръ, что, кажется, видно изъ новыхъ изслѣдований Штреккера, обсужденныхъ Лораномъ, о распаденіи дубильной кислоты на сахаръ и орѣшковую кислоту) имѣютъ двѣ, амміакъ и трехосновныя кислоты, какъ наприм. камфорная, имѣютъ три степени сочетанія и т. д.

Вотъ самое главное и общее значение нашего уравненія: выражать степени сочетанія. Для тѣхъ же соединеній, гдѣ водородъ сочетанія играетъ роль настоящаго металлическаго элемента, т. е. вступаетъ въ двойныя соляные разложенія, какъ это бываетъ для всѣхъ кислотъ, *степень сочетанія* совпадаетъ съ основностью, и тогда наше уравненіе выражаетъ въ одно время оба эти свойства. Такъ напр., въ примѣненіи къ сочетанію двухъ кислотъ (третій случай) члены уравненія $a+b-c=Z$ выражаютъ основность соединеній; но для большей точности въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ сочетаются кислоты съ нейтральными или основными тѣлами, надѣ соотвѣтствующими кислотѣ можно поставить знакъ, хоть—и такъ, какъ при выдѣленіи воды, водородъ берется поровну изъ обоихъ соединеній, то отрицательный членъ C долженъ выражать сумму водорода двухъ нѣсколько разніхъ значеній, почему его нужно замѣнить $\frac{C+C}{2}$; впрочемъ, это необходимо только въ тѣхъ случаяхъ, когда a или b , или оба вмѣстѣ содержатъ болѣе 1 экв. водорода, чтобы членъ Z выразилъ основность продукта, въ такомъ случаѣ и его нужно замѣнить суммой $Z+Z$. Такъ напр., уравненіе сочетанія амміака съ щавелевой кислотой будеть:

$$\bar{a}+\bar{b}-\left(\frac{\bar{c}+\bar{c}}{2}\right)=Z+\bar{Z} \text{ или } \overset{\text{щ. к. ам.}}{2+3-(1+1)}=\bar{1}+2,$$

оксаминовая кислота. Оно означаетъ, что продуктъ есть однососновная кислота, которая можетъ сочетаться еще съ однимъ экв. амміака или другого соединенія, а остатокъ амміака въ ней

сохраниль еще 2 степени сочетанія, что и дѣйствительно справедливо, потому что оксаминовой кислотѣ соотвѣтствуетъ такая же кислота биэтиламина (полученная Гофманомъ), которая имѣть одну степень сочетанія, а сама кислота поэтому = только 1; наконецъ на счетъ этого водорода (1) оксаминовая кислота образуетъ съ другимъ экв. амміака оксамидъ, котораго образованіе выразится:

$$a+2 b - \left(\frac{c+c}{2} \right) = \bar{Z} + Z \text{ или } \bar{2} + 2 \cdot 3 - (2+2) = 4,$$


или лучше 2.2.

Въ случаѣ же одноводородныхъ соединеній эти знаки можно выпустить, потому что весь водородъ сочетанія и, слѣдов., основности выдѣляются; такъ, уравненіе образованія эфировъ одноосновныхъ кислотъ будетъ просто:

$$\bar{a} = b - c = Z, \text{ гдѣ } a \text{ и } b \text{ равны единицѣ, } c = 2, \text{ а } Z = 0.$$

Посмотримъ примѣненіе нашего уравненія къ нѣкоторымъ частнымъ случаямъ. Мы уже убѣдились въ его справедливости относительно сочетанія одноосновн. кислотъ между собою, со спиртами и этихъ соед. между собою, погому начнемъ теперь съ двуосновныхъ кислотъ:

А) сочетаніе сѣрной кислоты съ метиловыми спиртами; $\bar{a} = \bar{2}$; $b = 1$. Первая степень; образованіе сѣрнометиловой кислоты ($c = \bar{2}$), слѣдовательно,




Вторая степень; образованіе сѣрнометилового эфира

$$\bar{2} + 2 \cdot 1 - 4 = 0.$$

Для щавелевой кислоты и подобныхъ ей (т. е. гомологовъ) двуосновныхъ кислотъ, каковы, напр., янтарная и пробковая, урав-


¹⁾ Такъ какъ уже извѣстно, что при выдѣленіи воды H берется поровну изъ обоихъ соединеній, то вместо $\frac{c+c}{2}$ можно просто писать c для краткости.

неніе это то же, какъ и для сѣрной. Примѣнимъ его теперь къ образованію эфировъ по 3-му способу (стр. 8), когда вмѣсто кислотъ дѣйствуютъ ихъ хлорангидриды. Извѣстно, что въ обоихъ случаяхъ получаются тѣ же сочетанныя соединенія, и разница только въ выдѣляющихся элементахъ, потому что эти галоидныя соединенія только и отличаются отъ соответствующихъ имъ нормальныхъ типовъ одними минеральными элементами и въ прикосненіи съ водой могутъ болѣе или менѣе легко перейти въ нихъ; однимъ словомъ,—однѣ принадлежатъ къ типу воды, а другія къ типу соляной кислоты, что можно выразить такимъ образомъ:




Слѣдовательно, уравненіе ихъ сочетанія должно давать то же значеніе для Z , какъ и въ нормальныхъ случаяхъ, что и оказывается изъ слѣдующаго.

Образованіе бензойнаго эфира: $\bar{a}=0$, потому что хлорангидриды не содержатъ болѣе водорода сочетанія, $c=1$, такъ какъ вмѣсто H_2O выдѣляется HCl , слѣдов.,



То же самое уравненіе выражаетъ сочетаніе хлорангидрида съ одноосновной кислотой, напр., образованіе уксуснобензойнаго ангидрида.



Этимъ-то способомъ они и были получены Жераромъ и Кюцца, но мы для сравненія представили нормальный случай образованія двойныхъ ангидридовъ, т. е. когда вмѣсто хлорангидрида дѣйствуетъ соответствующая ему кислота. Изъ уравненія (B) видно, что мы имѣли на это полное право: во-первыхъ, потому, что относительно продукта оба эти случая равнозначащи, и его

формулу Жераръ и др. разсматриваютъ, какъ сумму двухъ кислотъ безъ элементовъ одного экв. воды; а во-вторыхъ, наше уравненіе равно справедливо въ обоихъ случаяхъ; но законъ Жерара показываетъ, противъ факта, разницу или совсѣмъ непримѣнимъ, потому что во второмъ случаѣ (стр. 12) онъ: $1+1-1=1$ (неправедливо), а въ случаѣ $B:0+1-1=0$.

Впрочемъ, настоящаго выраженія для хлорангидридовъ у Жерара нѣтъ, такъ что въ сущности его законъ основности и непримѣнимъ къ этому, хотя весьма обыкновенному, случаю.

Мы уже упоминали, что въ нашемъ уравненіи должно выражаться сочетаніе амміака и алкалоидовъ, а именно: амміакъ и сходные съ нимъ RH_3 и AsH_3 означаются тремя, такъ какъ они имѣютъ 3 экв. водорода сочетанія и, слѣдов., 3 степени сочетанія; алкалоиды общаго типа NH_2a , каковы анилинъ, этиламинъ и т. п., какъ амміаки первой степени сочетанія, имѣютъ еще 2, алкалоиды NHa_2 имѣютъ одну и т. д.; вотъ между прочимъ, одно изъ важныхъ преимуществъ нашего уравненія предъ уравненіемъ Жерара, у которого и спирть, и амміакъ, и всѣ алкалоиды безразлично означались 0, и выраженіе продукта, одинаковое во всѣхъ этихъ существенно различныхъ случаяхъ, ничего не говорило о его химическихъ свойствахъ. Наше же уравненіе отчасти предсказываетъ химическую исторію этихъ соединеній и даетъ возможность предвидѣть и объяснить нѣкоторыя весьма интересныя явленія, такъ напр., урав. образования бензамида, $C_7H_5OCl + NH_3 = HCl + C_7H_5O.NH_2$; $0+3-1=2$ показываетъ, что амміакъ, сохранивъ 2 степени сочетанія, можетъ еще вступить въ реакцію хоть сть 2 экв. того же хлористаго бензоила и образовать *трибензамидъ*, что уже, впрочемъ, можно было предвидѣть по аналогіи его сочетанія съ 3 экв. спирта (или бромистаго этила); дающе, въ описаніи нашей работы съ RH_3 мы увидимъ еще новую аналогію этой реакціи.

Но самое интересное наведеніе нашего уравненія относится къ солямъ амміака, въ которыхъ онъ, очевидно, сохраняетъ всѣ свои три степени сочетанія. Принявъ это во вниманіе, означеніе

этихъ солей въ нашемъ уравненіи должно быть: $a=1+3$ (въ одноосн. соляхъ), если NH_4 принимать за одинъ выдѣляемый элементъ, то $a=1$, какъ для всѣхъ солей, и сочетаніе происходитъ, какъ съ самой кислотой, только вмѣсто воды или соляной кислоты выдѣляется вода и амміакъ (I не можетъ выдѣлиться безъ амміака) или нашатырь.

Такое сочетаніе не представляетъ ничего особеннаго: это та же реакція, какъ напр., при образованіи бензойнаго эфира изъ бенз. к. кали и іодистаго этила съ выдѣленіемъ іодистаго калія; но сочетаніе можетъ происходить и на счетъ водорода амміака, не касаясь H кислоты, какъ показываетъ первое обозначеніе соли въ уравненіи. Образованіе бромистыхъ солей би- и триэтиламина изъ соли этиламина (когда всѣ онѣ одновременно образуются въ смѣси бромист. этила съ амміакомъ), замѣченное Гофманомъ¹⁾, есть уже извѣстный примѣръ такого сочетанія.


Если теперь взять какую-нибудь органическую соль амміака, напр., уксусную и дѣйствовать на нее хоть щавелевымъ эфиромъ, то можетъ произойти сочетанное соединеніе, соотвѣтствующее оксамиду или оксаминовой кислотѣ безъ выдѣленія уксусной; и тогда, выдѣляя остатки элементовъ амміака по способу Пиріи, посредствомъ N_2O_3 (азотноватой кислоты), произвести косвенное сочетаніе двухъ упомянутыхъ кислотъ, т. е. на счетъ постороннихъ (по крайней мѣрѣ,—для одной изъ нихъ) элементовъ, почему ихъ основность отчасти сохранится.

Въ этомъ случаѣ можетъ образоваться одна изъ тѣхъ кислотъ, которыя въ нѣкоторыхъ обстоятельствахъ распадаются на щавелевую и уксусную, каковы: виннокам., лимонная и т. п., которыхъ Дюма поэтому называлъ *acides conjugués*; онѣ, какъ замѣчаетъ Жераръ, представили бы ту особенность между сочетанными соединеніями, что сохранили всѣ элементы обѣихъ первоначальныхъ кислотъ безъ выдѣленія воды; но, судя по тому, какъ мы выводимъ ихъ происхожденіе, т. е. косвеннымъ сочетаніемъ, это


¹⁾ Ann. ch. Ph. t. XXX, III. 1851.

именно такъ и должно быть. Замѣтимъ, что общераспространенность щавелевой и уксусной кислотъ и въ то же время аммоніакальныхъ солей въ растительныхъ сокахъ невольно наводить на мысль о возможности такого косвенного сочетанія этихъ двухъ кислотъ и, следовательно, о происхожденіи высшихъ, богатыхъ кислородомъ, кислотъ въ растеніяхъ.


Мы, именно, обратили вниманіе на аммоніакальные соли, а не на амиды первой степени, которые также могутъ сочетаться съ другими органическими соединеніями; но врядъ ли, при дѣйствіи на нихъ азотноватой кислоты органич. группы останутся въ соединеніи, тогда какъ амиды первой степени уже дали въ этомъ случаѣ положительные результаты. Такого рода косвенное сочетанія были уже производимы, такъ напр., Шгреккеръ получилъ молочную кислоту, которую онъ вслѣдствіе ея образованія называетъ: альдегидо-муравейною:



Мы видимъ, что она представляетъ ту же особенность, какъ напр., виннокаменная:



что она содержитъ всѣ элементы первоначальныхъ соединеній; это и есть признакъ косвенного сочетанія, и, чтобы представить ихъ происхожденіе уравненіемъ сочетанія, нужно прибавить то соединеніе, на счетъ которого оно происходило: такъ, образованіе молочной кислоты выражается слѣдующей полной реакцией:




$$b=1; \quad a=1+3; \quad c=2; \quad +1-2(1+3)=1+2$$

который при дѣйствіи азотноватой кислоты теряетъ элементъ *NH* и, присоединяя 1 экв. *O*, превращается въ молочную, односовную кислоту.


Такимъ образомъ, мы видимъ, что продукты косвенного сочетанія поддаются подъ общее правило, изъ котораго они по

виду своихъ формулъ, казалось, дѣлали исключеніе. Къ такого рода косвенно-сочетаннымъ соединеніямъ (combinaisons copulées indirectes—во французскомъ переводѣ), которыя всѣ до сихъ поръ называли просто сочетанными соединеніями, не отдаляя ихъ отъ случаевъ прямого сочетанія, относятся муравейно-бензоимовая, молочная, бензогликоловая (полученная Штреккеромъ изъ гиппуровой кислоты) и т. п. кислоты.

Этотъ взглядъ на химическое происхожденіе подобныхъ соединеній кажется намъ тѣмъ болѣе правдоподобнымъ, что такимъ образомъ объясняется, почему основность ихъ не есть сумма основностей первоначальныхъ двухъ соединеній, что, напр., по формулы виннокаменной кислоты должно было бы быть, потому что вода изъ нихъ какъ бы не выдѣлялась; но выше приведенное уравненіе показываетъ причину этого. Штреккеръ, который такъ успѣшно изслѣдовалъ многія подобныя соединенія, рассматриваетъ ихъ происхожденіе почти такъ же, вводя амміакъ для сочетанія двухъ соединеній; такъ напр., гиппуровую кислоту онъ представляетъ какъ амидированную кислоту 2-хъ одноосновныхъ кислотъ¹⁾:



Въ этомъ случаѣ уравненіе г-на Штреккера совершенно примѣнительно; но, представивши такимъ же образомъ образованіе молочной кислоты и миндальной, оно показываетъ нейтральный продуктъ, тогда какъ во всѣхъ этихъ случаяхъ получаются одноосновные кислоты; наше же уравненіе равно объясняетъ всѣ три случая




¹⁾ Streck. I. c.


²⁾ По нашему взгляду, гиппуровую кислоту нужно рассматривать какъ продуктъ второй степени сочетанія амміака съ бензойной и гликоловой (предсказаний Лораномъ и описанной потомъ Штреккеромъ): бензамидъ, имѣя еще 2 степени сочетанія, или гликоламинъ (клеевой сахаръ), сочетаясь 1-й съ гликоловой кислотой, а второй съ бензойной, даютъ гиппуровую кислоту, которая при обработкѣ N_2O_3 дала Штреккеру бензогликоловую, какъ продуктъ косвенного сочетанія двухъ упомянутыхъ кислотъ.

амидъ, который при обработкѣ N_2O_3 долженъ дать одноосновную кислоту, соответствующую бензогликоловой.


Обратимся къ другимъ случаямъ сочетанія. Иногда оно можетъ быть замѣнено прямымъ соединеніемъ, когда, напр., выдѣленіе воды предшествуетъ самому сочетанію; но это, намъ кажется, несколько не противорѣчитъ общему понятію объ этихъ явленіяхъ,— такъ же, какъ двойное разложеніе солей, какъ самая полная или, лучше, симметрическая реакція ихъ образованія не исключаетъ случаевъ прямыхъ соединеній безводныхъ кислотъ съ окисями или галоидовъ съ металлами; нужно только, чтобы подобныя соединенія, т. е. въ смыслѣ сочетанія остатки могли существовать отдельно, какъ это часто бываетъ для двухосновныхъ кислотъ, сочетающихся съ двумя экв. одноводородныхъ тѣлъ, какъ напр., спиртовъ, которые, предварительно сочетаясь, выдѣляютъ воду и потомъ прямо соединяются съ безводной кислотой. Такимъ образомъ, какъ известно, образуется нейтральный эфиръ сѣрной кислоты:




въ уравненіи такого сочетанія нужно выпустить отрицательный членъ и оно будетъ: $a+b=z$. Тутъ каждый членъ, соответствующий соединенію, не заключающему болѣе выдѣлимаго водорода, равенъ нулю; но химическое происхожденіе этого эфира можно, по аналогіи, представить и полной реакціей:



Такимъ образомъ, въ случаѣ косвенного сочетанія одно тѣло можетъ прямо соединиться съ амидомъ другого, какъ напр., при образованіи молочной кислоты чрезъ аланинъ, альдегидъ, кажется прямо соединяется съ формамиломъ въ моментъ его образованія:



Теперь скажемъ нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ соединеніяхъ, не подходящихъ подъ общій законъ сочетанія, хотя образованіе ихъ всѣ химики относятъ къ этимъ явленіямъ. Такова, напр., сѣроуксусная кислота Мельсена $C_2H_2H_2SO_3$ двуосновная; какъ извѣстно, она образуется прямымъ соединеніемъ уксусной съ безводной сѣрной: $C_2H_4O_2 + SO_3$, но никогда не образуется и не можетъ образоваться по своимъ свойствамъ двуосновной кислоты сочетаніемъ SO_4H_2 съ $C_2H_4O_2$, потому что въ такомъ случаѣ, какъ слѣдуетъ изъ нашего уравненія, должна получиться одноосновная кислота, соотвѣтствующая сѣрновинной, хотя эквивалентная формула быта бы та же самая, а именно:



$$= \bar{a} + \bar{b} - \bar{c} = Z, = \bar{2} + \bar{1} - \bar{2} = \bar{1}; \text{ а для сѣрновинной} =$$

$= \bar{2} + \bar{1} - (\bar{1} + \bar{1}) = \bar{1}$, но и другія ея химическія свойства показываютъ, что она не представляетъ сочетанное соединеніе двухъ этихъ кислотъ. И въ самомъ дѣлѣ, при разложеніи (кислотами или щелочами) она никогда не распадается на сѣрную и уксусную, какъ всякое сочетанное соединеніе, какъ напр., въ тѣхъ же обстоятельствахъ сѣрновинная распадается опять на спиртъ и на сѣрную кислоту, а отдѣляется сѣрнистую кислоту, углекислоту и др. продукты ¹⁾). Это даетъ намъ право объяснить ея образованіе, соотвѣтственно дѣйствительнымъ обстоятельствамъ его, тѣмъ, что SO_3 раскисляется, образуя на счетъ уксусной кислоты воду ²⁾),

¹⁾ Сѣроуксусная кислота скорѣй всего соотвѣтствуетъ изэтіоновой кислотѣ, которая, хотя изомерна съ сѣрновинной, но не распадается, какъ она, на спиртъ и сѣрную кислоту и образуется она такъ же, какъ сѣроуксусная, при дѣйствіи безводной сѣрной кислоты на безводный спиртъ. Очевидно, что ее нельзя разсматривать какъ продуктъ сочетанія SO_4H_2 со спиртомъ.

²⁾ Оставаясь вѣрными нашему взгляду, мы должны были бы сказать, что $2H$ укс. к. и O изъ SO_3 вслѣдствіе этой реакціи перемѣняютъ свое прежнее химическое значеніе на то, которое они имѣютъ въ водѣ, не выдѣляясь

которая остается въ соединеніи со вновь образовавшимся продуктомъ замѣщенія и придаєтъ ему свойства двуосновной кислоты.

Такимъ образомъ, понятно, почему при разложеніи ея не могутъ возстановиться уксусная и сѣрная кислоты, разрушенныя во время реакціи. То же самое разсужденіе можетъ относиться и къ сѣрнобензойной кислотѣ Мигчериха, образованіе и разложение которой такія же, какъ и сѣрноуксусной; поэтому намъ кажется, что эти названія къ нимъ совсѣмъ не идутъ.

Замѣтиимъ, что къ эгимъ-то двумъ соединеніямъ законы Жерара и Штреккера и примѣнны. Но это то самое, какъ намъ кажется, и говоритъ въ пользу нашего уравненія, которое прямо показываетъ, что эти соединенія совсѣмъ другого рода, какъ это и очевидно изъ всѣхъ ихъ химическихъ свойствъ. Законы эти, не будучи основаны на химической причинѣ основности и сочетанія, представляютъ произвольное уменьшеніе основности вслѣдствіе сочетанія, и потому болѣе или менѣе случайное согласіе или несогласіе (какъ мы видѣли при сочетаніи двухъ одноосновныхъ кислотъ) съ фактами и примѣнны, собственно говоря, только къ тѣмъ случаямъ, изъ которыхъ они эмпирически были выведенны.

Теперь разсмотримъ отношеніе явлений сочетанія къ явленіямъ замѣщенія, или металенсіи, для болѣе полнаго ихъ охарактеризованія.

Извѣстно, что эти замѣщенія происходятъ при непосредственномъ дѣйствіи хлора и другихъ галоиновъ органическия соединенія, простираясь на большую или меньшую часть водорода, иногда на весь (какъ въ нѣкоторыхъ углеводородахъ), но во многихъ случаяхъ оно оставляетъ извѣстную и постоянную часть водорода нетронутую; такъ, въ уксусной оно прямо доходитъ до этого предѣла: $C_2Cl_3O_2H$; въ фенолѣ или въ феновой кислотѣ получаются разныя степени, двухъ трехъ и наконецъ предѣльное пяти-хлороднако въ видѣ этого соединенія. Мы такъ, дѣйствительно, понимаемъ всѣ химическія превращенія въ предѣлахъ соединеній и только для краткости позволили себѣ такъ выразиться, какъ въ текстѣ.

ристое замѣщеніе, $\frac{C_6H_5O}{H}$ даетъ $\frac{C_6Cl_5O}{H}$. Всѣ летучія кислоты, подобно уксусной, даютъ легко разныя степени замѣщенія, но во всѣхъ этихъ случаяхъ онѣ сохраняютъ свое химическое отправление одноосновныхъ кислотъ и ту же степень сочетанія, вступая со всѣмъ своимъ хлоромъ въ сложные эфиры и амиды; это уже прямо указываетъ на разницу между этими двумя явленіями съ точки зрењія дѣйствующихъ элементовъ. Въ сочетаніяхъ участвуетъ металлическій водородъ, котораго въ упомянутыхъ соединеніяхъ 1 экв., не замѣщаемый галоидомъ, тогда какъ весь остальной---металептическій. Поэтому-то эти два явленія взаимно независимы и могутъ происходить въ томъ же соединеніи, не мѣшая другъ другу: несмотря на то, что уксусная кислота теряетъ при замѣщеніи 3 экв. водорода, она все таки сочетается, по-прежнему, на счетъ 4-го экв., но, выдѣливши этотъ только при одномъ сочетаніи со спиртомъ, она дальше не можетъ сочетаться, хотя въ ней еще остались 3 экв. водорода. Итакъ, степени сочетанія и замѣщенія для одного и того же соединенія совершенно различны, потому что происходятъ на счетъ различныхъ элементовъ, напр.: въ уксусной и во всѣхъ ей подобныхъ одна ст. сочетанія, а степени замѣщ. въ нихъ различны и зависятъ отъ эквивалента: въ укс. 3, бутир. 7, валер. 9 и т. д., тогда какъ та зависитъ только отъ химического отправления (*fonction chimique*) соединеній. Это послѣднее обстоятельство особенно подтверждается высказанную нами мыслью, что явленія сочетанія происходятъ на счетъ минеральныхъ элементовъ, которые и придаютъ органическимъ группамъ извѣстныя химическая отправления неорганическихъ соединеній¹⁾, которыхъ они сами по себѣ, кажется, не имѣютъ; но зато представляютъ другого рода явленія, неизвѣстныя и, вероятно, не свойственные минеральнымъ соединеніямъ,—я хочу именно сказать о металептическихъ замѣщеніяхъ.

¹⁾ Какъ напр., отпр. одноосн. къ двухосновной и т. д. средней соли, кислой и т. д.

Итакъ, *существенное различие* между рассматриваемыми нами теперь двумя явлениями мы видимъ въ *разнице химического значения участвующихъ въ нихъ элементовъ*; кромъ водорода, эту разницу можно замѣтить и для галоидныхъ элементовъ, которые также могутъ быть двухъ химическихъ значений: хлороганической группы или металептической не участвуетъ въ сочетаніяхъ, никогда не выдѣляясь при этомъ въ видѣ соляной кислоты, а, какъ мы уже замѣтили, весь входитъ въ сочетанное соединеніе, тогда какъ галоидный хлоръ (болѣе или менѣе легко выдѣляющійся въ видѣ *HCl* или галоидной соли), который вводится въ органическія соединенія пятихлористымъ фосфоромъ (хлор. бензоиль, хлор. анизиль и т. п.) или соляной кислотой (галоидн. эфиры), производить эти сочетанія, выдѣляясь при этомъ въ видѣ соляной кислоты или галоидной соли (4-ый случай, стр. 8).

Жераръ же почти не отдаляетъ эти два явленія, причисляя ихъ обоихъ къ замѣщеніямъ¹⁾, и различие между ними видить только въ томъ, что металепсія есть замѣщеніе простыми тѣлами, а явленія сочетанія—замѣщеніе сложными группами, почему и называется это послѣднее *substitution par résidu*; въ этомъ случаѣ мы съ нимъ совершенно несогласны и далѣе, въ примѣненіи этихъ понятій, мы ясноѣ увидимъ, въ чемъ заключается разница нашихъ взглядовъ.

Дѣйствительно, Жераръ вслѣдствіе такихъ понятій причисляетъ образованіе тѣль азотныхъ (*corps nitrés*, напр.: нитробензолъ, нитранисовая к. и т. п.) къ явленіямъ сочетанія, какъ онъ это ясно говоритъ въ своемъ сочиненіи, томъ II, страница 498, въ статьѣ «*Loi des résidus*» и далѣе на 522 стр. описываетъ ихъ подъ именемъ: «*Nitrides copulés*» и примѣняетъ даже къ нимъ свой законъ основности. По нашему же мнѣнію, съ точки зрѣнія дѣйствующихъ элементовъ образованіе азотныхъ тѣль происходитъ настоящимъ металептическимъ замѣщеніемъ, что, какъ мы поста-


¹⁾ Мы уже замѣтили, что это выражаетъ только симметрию реакціи (въ этомъ смыслѣ явленія сочетанія только и могутъ называться замѣщеніями), но никакъ не опредѣляетъ химического ея характера.

раемся показать, оправдывается степенями азотного замѣщенія и химическими свойствами этихъ тѣлъ.

При дѣйствіи азотной кислоты на нѣкоторыя одноосновныя кислоты, каковы бензойная, анисовая и т. п., какъ извѣстно, получаются нитробензойная и бинитробензойная тоже для анисовой и многихъ другихъ; есть примѣръ 3-хъ азотныхъ кислотъ, какова пикриновая или тринитрофеновая. Какъ же, спросимъ мы теперь Жерара, одноосновныя кислоты, которыхъ характеръ, по его логическому и точному опредѣленію, въ томъ и состоитъ чтобы имѣть только одну степень сочетанія (т. е. образовать одинъ только нейтральный эфиръ, одинъ амидъ, анилидъ и т. п.), въ этомъ случаѣ вдругъ сочетаются съ однімъ, потомъ съ двумя и даже съ тремя экв. азотной кислоты; отчего же въ одномъ случаѣ онъ самъ показываетъ дѣйствительно существующее отношеніе между степенями сочетанія и основностью тѣлъ, а тутъ онъ этого не признаетъ—и для тѣхъ же самыхъ соединеній? А, между прочимъ, не смотря на это, примѣняетъ, какъ мы уже замѣтили, свой законъ основности къ этимъ явленіямъ; и даже недавно¹⁾, въ отвѣтъ на возраженіе г. Штреккера, который впалъ въ ту же ошибку, подводя подъ законъ основности, имъ предложенный, образованіе азотныхъ тѣлъ, Жераръ объясняетъ, почему кислоты двуазотныя, какъ напр., бинитробензойная, по его закону, съ помощью принципа постепенного сочетанія одно-, а не двухосновныя. Но и такое примѣненіе закона основности не вѣрно: мы уже показали, что при сочетаніи одноосновныхъ кислотъ между собою, основность должна уменьшиться не на 1, а на 2 (напр., для уксусно-бензойной и т. п.), следовательно, въ этомъ случаѣ всѣ эти азотныя тѣла должны бы были быть нейтральными, еслибы тутъ дѣйствительно происходило сочетаніе. Но этотъ самый фактъ, т. е., что они сохраняютъ свою прежнюю основность при всѣхъ степеняхъ азотнаго замѣщенія, и показываетъ, что это скорѣй металентическая явленія, не имѣющія, какъ мы уже видѣли, никакого отношенія

¹⁾ Comp. Rend, L. et G. 1850.

къ основности органическихъ соединеній такъ же, какъ и къ степенямъ сочетанія, которыя въ этомъ случаѣ (т. е. въ кислотахъ) совпадають. Только не обращая вниманія на химическое значение действующихъ элементовъ, Жераръ могъ тутъ отде́лить эти два свойства, которыя, какъ мы, кажется, достаточно доказали, происходятъ отъ одной и той же химической причины,—отъ присутствія въ тѣлахъ минерального или металлическаго водорода, кого́рого значение въ кислотахъ яснѣе выражается; но во всѣхъ соединеніяхъ онъ играетъ роль *водорода сочетанія*. Другія химическія свойства азотныхъ тѣлъ еще болѣе подтверждаютъ наше мнѣніе. Извѣстно, что азотныя тѣла такъ же, какъ охлоренныя, могутъ входить въ такія же сочетанія, какъ и первоначальные ихъ типы, такъ напр.: существуютъ нитро-бензойный эфиръ, нитро-бензамидъ и множество тому подобныхъ соединеній, тогда какъ, напр., бензойный эфиръ уже не можетъ прямо дать амидъ, не разлагаясь, не выдѣливъ спирга. По нашему взгляду, это такъ и должно быть, потому что азотное замѣщеніе происходитъ на счетъ другихъ элементовъ, нежели сочетаніе, именно надъ металептическими и, слѣдовательно, не мѣшаетъ сочетанію. Это можно объяснить слѣд. формулами:



Азотныя тѣла отличаются отъ сочетанныхъ соединеній еще тѣмъ, что ни въ какихъ обстоятельствахъ не распадаются опять на первоначальныя соединенія, т. е. азотную кислоту и нормальный органическій типъ, принимая элементы воды, которая выдѣлилась при ихъ образованіи, тогда какъ такой способъ распаденія составляетъ, именно, существенный характеръ всѣхъ продуктовъ сочетанія.

1) Мне кажется болѣе правдоподобнымъ мнѣніе Жерара, что не NH_2 замѣщаетъ H , а NH_2 замѣщаетъ $2H$, что согласно съ нашимъ взглядомъ, потому что при сочетаніи этотъ H долженъ бы выдѣлиться изъ NO_2H (азотная кислота).

нія по замѣчанію самого же Жерара, который обобщаетъ это явленіе подъ именемъ закона остатковъ (*loi des résidus*). Это противорѣчіе въ учениі французскаго химика произошло, какъ намъ кажется, только отъ того, что онъ въ немъ обращалъ вниманіе на одну симметрію реакцій, придавая ей слишкомъ большое значеніе, а химической ихъ смыслъ, зависящій отъ значенія участвующихъ элементовъ, былъ имъ не принятъ въ разсужденіе.

Изъ всего сказанного, кажется, можно убѣдиться, что азотные тѣла происходятъ замѣщеніемъ металептическаго водорода органическихъ соединеній, почему не имѣютъ никакого вліянія на основность ихъ, но зато и степени ихъ отъ нея независимы и совсѣмъ другія, нежели степени сочетанія; поэтому къ нимъ и никакъ нельзя примѣнять законъ основности, какъ это сдѣлали Жераръ и Штреккеръ, и случайная его примѣнимость въ этомъ случаѣ есть только новое доказательство его нерациональности. Наше уравненіе сочетанія и основности, какъ мы уже замѣтили, и тутъ указываетъ на настоящій химической характеръ этихъ явлений.

Итакъ, мы видимъ, что, обративши вниманіе на химическое значение действующихъ при сочетаніяхъ элементовъ, мы могли сдѣлать болѣе или менѣе рациональный анализъ этихъ явлений и дойти до болѣе точного опредѣленія ихъ относительного химического характера.

Теперь мы позволимъ себѣ вывести слѣдующія заключенія:

1) Явленіе сочетанія, въ смыслѣ симметріи реакціи, есть двойное разложеніе, или замѣщеніе, которое въ этомъ случаѣ производитъ перемѣщеніе минеральныхъ элементовъ (т. е. металлическаго и галоиднаго или амфиднаго значеній) въ одно-двойное неорг. соединеніе (какъ-то: вода, соляная кислота, галоидная или амфидная соль), а органическихъ группъ въ другое—сочетанное, находящееся подъ вліяніемъ только одного минер. элемента (именно *O* или *N* въ б. ч. случаевъ), который удерживаетъ ихъ въ извѣстномъ неорганическомъ типѣ (вода или амміакъ).

2) Съ точки зрѣнія химического значенія участвующихъ элементовъ, сочетаніе происходитъ преимущественно на счетъ

сродства минеральныхъ элементовъ, присутствіе которыхъ въ органическомъ соединеніи только и обуславливаетъ эти явленія; органические (относительно водорода металептическія) элементы не участвуютъ, а перемѣщаются цѣльными группами, сродство которыхъ, во всякомъ случаѣ, должно быть самое слабое¹⁾.

3) Вообще, слѣдствіемъ сочетанія 2-хъ органическихъ соединеній бываєтъ вытѣсненіе изъ нихъ элементовъ минерального химического значенія, которое достигаетъ предѣла въ полной или послѣдней степени сочетанія, почему сочетанное соединеніе не имѣть всѣхъ неорган.-химическихъ отправленій (напримѣръ: отправление кислоты, одноосн., двуосн. и т. д., спирта, альдегида и т. п.) первоначальныхъ соединеній, и, наконецъ, въ послѣднемъ случаѣ не имѣть уже болѣе ни одного изъ нихъ.

4) Отъ двойныхъ соляныхъ разложеній (которые суть настоящія двойные замѣщенія) явленія сочетанія отличаются именно темъ, что въ нихъ не сохраняются химическія отправленія двѣйствующихъ соединеній, тогда какъ въ тѣхъ они остаются безъ всякаго измѣненія, такъ какъ перемѣщеніе или замѣщеніе производится между элементами или группами одинаковыхъ химическихъ значеній; такъ напр., при сочетаніи 2-хъ одноосновныхъ тѣлъ получаются, съ одной стороны, двуосновное тѣло (вода), а съ другой—(нейтральное) безосновное; а при соляномъ разложеніи такихъ тѣлъ получаются 2 одноосновныхъ соединенія.

Сходны же они, кромѣ общей симметріи реакціи, еще темъ, что выдѣляющееся соединеніе есть двойное неорганическое (соль, вода и т. п.) и при томъ такого же химического происхожденія²⁾, какъ въ соляномъ разложеніи. Но главное сходство этихъ 2-хъ

¹⁾ Напримѣръ, въ двойныхъ и смѣшанныхъ эфирахъ, 2 эт. группы, или 2 мет. или эт. и мет. и т. д., также для сложныхъ безводн. кислотъ, да и въ сложныхъ эфирахъ, судя по элементарному сходству 2-хъ орган. группъ, сродство ихъ должно быть слабое.

²⁾ Хотя и въ металептич. замѣщеніи выдѣляется двойное соед. *CН* и т. п., но оно другого химич. происхожденія; въ этомъ случаѣ отъ прямого соединенія хлора съ водородомъ.

явлений заключается въ томъ, что, хотя химическое отравление при сочетании иначе распредѣляется, нежели при соляномъ разложеніи, но химическое значеніе перемѣщающихся элементовъ и группъ въ обоихъ случаяхъ не измѣняется, что и составляетъ главный характеръ настоящихъ двойныхъ разложений.

5) Отъ металептическаго замѣщенія явлений сочетанія отличаются гораздо болѣе, потому что происходятъ на счетъ элементовъ другого химического значенія, отъ чего зависитъ разница степеней этихъ двухъ явлений. Дѣйствующія сродства—совсѣмъ другія: тутъ дѣйствуетъ первоначальное сродство, которое измѣняетъ химическое значеніе дѣйствующихъ элементовъ¹⁾; тамъ же, какъ мы видѣли, эти значенія не измѣняются.

¹⁾ Металептическій водородъ дѣлается металлическимъ, выдѣляясь въ видѣ соляной кислоты изъ органической группы.

О взаимномъ отношеніи нѣкоторыхъ физическихъ свойствъ соединеній, участвующихъ въ сочетаніи.

Изслѣдованія Коппа еще въ 1845 году¹⁾, дополненные потомъ имъ самимъ и другими физиками, показали, что разница между температурами кипѣнія двухъ органическихъ соединеній остается постоянной и для всѣхъ ихъ сочетаній, и при томъ для подобныхъ соединеній (гомологовъ) эта разница между двумя соединеніями членами ряда (соответствуя $=CH_2$ въ разницѣ элементовъ) одна и та же для всѣхъ остальныхъ, взятыхъ рядомъ; такъ, для подобныхъ кислотъ общей формулы $nCH_2 + O_2$ и для спиртовъ эта разница $= 18,5^{\circ} - 19^{\circ}C$. Поэтому и сочетанія этихъ двухъ рядовъ соединеній, т. е. сложные эфиры, если отличаются только спиртомъ или кислотой, будутъ отличаться между собой въ температурѣ кипѣнія на $n19^{\circ}$ (n , означая разницу эквив. углерода) или, если отличаются и тѣмъ и другимъ, то на сумму разницъ, $n19^{\circ} + m19^{\circ}$. Теперь замѣтимъ, что температура кипѣнія сочетанныхъ соединеній всегда меньше суммы температуры кипѣнія первоначальныхъ соединеній, что и понятно, потому что они не содержать всѣхъ элементовъ этихъ послѣднихъ; но, такъ какъ разница между температурами ихъ кипѣнія должна остаться безъ измѣненія, то это уменьшеніе, которое назовемъ φ , должно иметь постоянную величину для всѣхъ сочетаній подобныхъ кислотъ со спиртами, т. е. для всѣхъ сложныхъ эфировъ (наше разсужденіе преимущественно относится къ явленіямъ этого рода, а другія въ этомъ отношеніи еще мало изслѣдованы). Это совершенно согласно и съ тѣмъ, что φ выра-

¹⁾ Ann. ch. Ph. 3. 1842, p. 46.

жаетъ уменьшеніе отъ выдѣленія тѣхъ же элементовъ во всѣхъ случаяхъ, т. е. воды.

Поэтому отношеніе между температурами кипѣнія первона-
чальныхъ соединеній и продукта ихъ сочетанія можно выразить
такимъ же простымъ уравненіемъ, какъ и самое химическое явле-
ніе: $a+b-\varphi=z$, гдѣ a и b суть температуры кипѣнія первона-
чальныхъ соединеній, φ постоянное уменьшеніе, соотвѣтствующее выдѣ-
ленію воды, а z темп. кипѣнія продукта сочетанія. Такъ какъ φ
должна быть постоянною для всѣхъ случаевъ, то, опредѣливъ ее разъ
эмпирически изъ одного, она должна быть примѣнима ко всѣмъ
остальнымъ: выведемъ ее, напр., изъ сочетанія муравейной кислоты

мур. к. спирть мур. эф.
съ виннымъ спиртомъ, гдѣ наше уравненіе $=100^{\circ}+78^{\circ}-\varphi=58^{\circ}$,
откуда $\varphi=120^{\circ}$. Слѣдовательно, 120° есть то уменьшеніе темпе-
ратуры кипѣнія, которое соотвѣтствуетъ выдѣленію воды при соче-
таніи подобныхъ кислотъ nCH_2+O_2 со спиртами; замѣтимъ же
теперь, что это величина φ почти одинакова и для сочетаній дру-
гого рода съ выдѣленіемъ воды, такъ напр., при взаимномъ сочета-
ніи двухъ экв. спирта, образующихъ такимъ образомъ обыкновен-
ный эфиръ: $78^{\circ}+78^{\circ}-\varphi=35^{\circ}$, откуда $\varphi=121^{\circ}$.

Уравненіе это, члены котораго имѣютъ, такъ сказать, хими-
ческое значеніе, кажется намъ, наглядно выражаетъ простое отно-
шеніе, существующее между темп. кип. первоначальныхъ соеди-
неній и продукта ихъ сочетанія; оно притомъ позволить намъ
сдѣлать нѣсколько интересныхъ замѣчаній на счетъ этихъ темпе-
ратуръ. Такъ напр., съ первого взгляда на него видно, что, когда
 $\varphi >$ одного изъ членовъ a или b , то сочетаніе произведетъ пони-
женіе темп. кип. относительно его, а если $>$ каждого изъ нихъ,
то—относительно обоихъ. Коппъ это уже замѣтилъ для сочетанія
метилового и обыкнов. спиртовъ; это видно и изъ нашего уравн.,
потому что температуры ихъ кипѣнія 60° и 78° ; это вообще отно-
сится къ спиртамъ первыхъ четырехъ семействъ; слѣдов., къ про-
піоновому (еще неизв.) и бутироновому (недавно открытъ), потому
что темп. кип. для всѣхъ ихъ менѣе 120° . Такимъ образомъ

отчасти объясняется, почему въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ въ приведенныхъ нами примѣрахъ, органическія соединенія, усложняясь, т. е. присоединяя нѣсколько углеводородныхъ элементовъ (при чемъ относительный вѣсъ паровъ дѣлается иногда вдвое больше), понижаютъ свою температуру кипѣнія, тогда какъ это совершенно непонятно, если сравнивать температуры кипѣнія только по элементарному составу. Это также указываетъ на причину разницы температуры кипѣнія нѣкоторыхъ изомерныхъ соединеній: сочетанное соединеніе всегда кипитъ ниже своего изомера первоначального соединенія (для изомеровъ сочетанныхъ нѣть разницы); такъ напр., извѣстно, что всякому сложному эфиру подобного ряда (nCH_2+O_2) соотвѣтствуетъ изомерная кислота въ другомъ подобномъ рядѣ той же формулы, которая всегда кипитъ $85^{\circ}-81^{\circ}$ выше своего изомера—эфира, такъ напр.: уксусный эфиръ= 74° , изомеренъ бутирин. кисл.= 160° , разница 82° ; уксусно-мет.= 58° изомеренъ пропіоновой 140° , разн. 82° и т. п.

Слѣдовательно, вообще, встрѣчая соединеніе, котораго низкая температура кипѣнія не совсѣмъ соотвѣтствуетъ его элементарному составу, можно довольно вѣроятно заключить, что оно сочетанное: напр., обыкновенный эфиръ $C_4H_{10}O$, котораго температура кипѣнія 35° , ниже 80° его изомера—бутирин. спирта (115° Вюрцъ) и 33° ниже вин. спирта (78°), хотя экв. его почти вдвое тяжеле, уже поэтому позволяетъ думать, что онъ есть сочетанное соединеніе, какъ это и доказали недавно Вилліамсонъ и Шансель. Мы видѣли при томъ, что температура кипѣнія эфира подходитъ подъ наше уравненіе, выражающее эти отношенія.

Для эквивалентъ-объемовъ Коппъ нашелъ то же постоянство разницы между двумя первоначальными соединеніями и ихъ сочетаніями (онъ это преимущественно замѣтилъ метил. и этиловыхъ соединеній). Слѣдовательно, такъ какъ и здѣсь экв. обоихъ сочетанныхъ соединеній менѣе суммы экв. обоихъ первоначальныхъ соединеній, то уменьшеніе и здѣсь должно быть постоянною величи-

ною φ для всѣхъ сочетаній, иначе не сохранилось бы постоянство разницы между двумя первоначальными соединеніями и ихъ сочетаніями. Поэтому и отношеніе экв. объемовъ соединеній сочетанія можно выразить такимъ же уравненіемъ, какъ для температуръ кипѣнія, т. е. $a+b-\varphi=z$, гдѣ a и b суть экв. объемы сочетающихся соединеній, φ —постоянное уменьшеніе, соответствующее выдѣленію воды, а z —экв. объемъ продукта (по преимуществу сложного эфира). Въ этомъ случаѣ даже можно было думать, что постоянная величина φ , а вслѣдствіе этого и все уравненіе, имѣетъ не эмпирическое (какъ въ уравненіи температурнаго кипѣнія), а дѣйствительное, физическое значеніе; выражая уменьшеніе объемовъ вслѣдствіе выдѣленія воды, она можетъ быть именно равна эквивал. объему этого соединенія. Вслѣдствіе такого предположенія, я пробовалъ вычислять экв. объемы сложныхъ эфировъ, взявъ сумму экв. объемовъ спирта и кислоты и вычитая изъ нея объемъ одного экв. воды, т. е. 9 (для вычисленія я бралъ экв. относительно $H_2=1$), и, дѣйствительно, получиль такимъ образомъ экв. объемы почти тождественные съ выведенными изъ наблюденій ихъ удѣльного вѣса; такъ напр., экв. объемъ уксусного эфира (экв. его=44), вычисленное по его уд. в. при 14° , 0,89
экв. об. спирта при 16° ук. к. 18°
 есть 49, а выденный изъ нашего уравненія: $28,8+28,3-9=48,1$; уксусно-метиловый эфиръ: $20+28,3-9=39,3$, а изъ наблюденій (уд. вѣсъ мет. спирта=0,798) 40 и т. д., разницы не большія между объемами, выведенными изъ наблюденія и вычисленными по нашему уравненію въ одномъ случаѣ 0,9, а въ другомъ 0,7; вычисляя изъ нашихъ объемовъ уд. вѣсъ эфировъ, разницы съ наблюдаемыми будутъ еще менѣе замѣтны, напр.: уд. вѣсъ укс. мет. эфира по наблюд.=0,92, а изъ нашего объема—0,94.

Итакъ, въ уравненіе объемовъ вмѣсто φ можно прямо поставить 9 (или n_9 для другихъ случаевъ, когда выдѣляется болѣе 1 экв. воды), и оно будетъ $a+b-n_9=z$.

Изъ этого простого отношенія между экв. об. соединеній сочетанія вытекаетъ то важное слѣдствіе, что объемъ дѣйствую-

щихъ соединеній не измѣняется во время реакціи и для жидкаго состоянія (какъ это уже было известно для газообразныхъ объемовъ), потому что въ объемѣ сочетанного соединенія не достаетъ именно объема выдѣлившагося соединенія; это ясно видно изъ самаго уравненія, если оба продукта перенести во вторую часть уравненія, а первоначальныхъ соединеній оставить въ другой: $a+b=z+9$, т. е. сумма объемовъ двухъ дѣйствующихъ соединеній равна суммѣ объемовъ двухъ продуктовъ этого дѣйствія.

Замѣтимъ, что то же самое бываетъ и при соляномъ разложеніи, когда основанія даютъ изоморфныя соли, какъ напр., при взаимномъ дѣйствіи солей натрія и серебра; при этомъ, кромѣ того, и кристаллическія формы не измѣняются.

Итакъ, мы видимъ, что одно и то же уравненіе (которое есть вообще уравненіе всякаго двойного разложенія) выражаетъ троекое отношеніе между соединеніями, участвующими въ явленіи сочетанія: 1) степеней сочетанія и основности, 2) температуръ кипѣнія и 3) экв. объемовъ (и, слѣдов., уд. вѣса).

Присоединяемъ сюда примѣрную таблицу нѣкоторыхъ сочленений съ указаніемъ ихъ уравненія и отношений температуръ кипѣнія и эквивалентъ-объемовъ:

Первоначаль- ные типы		Ихъ сочетанія по уравненію $1+1=2=0$			Temperaturы кипѣнія и эквива- лентъ-объемы	
Неор- ганич.	Орга- нич.	Общія выраженія	ПРИМѢРЫ	Вычислен- ные по уравн. $a+b-x=z$	Наблю- денные	
	Спир- ты	Двуспиртные эфиры	Обыкно- венный C_2H_5O { $2.78-121=$ эфиръ C_2H_5O { $2.29-9=$	34° 49 об.	35° $48,5$	
	a H	a O , двойн. эф. a a' O , смѣш. эф. a^2	Метило- этил. эф. CH_3O (<i>Williamson</i>) C_2H_5O			
		Сложные эфиры				
Вода		a' a b^2O	Уксусо- метиловый эфиръ { $120+60-121=$ $28,2+20-9=$	59° $39,2$	58° 40	
	H O H	b O a^2 $b' O$	Муравей- ный эфиръ { $100+78-121=$ $19,6+29-9=$	57° $39,6$	55° 40	
	Одно- основ. ки- лоты	a^2 b^2O	Уксусный эфиръ { $120+78-121=$ $28,2+29-9=$	77° $48,2$	74° 49	
		a^2 b^5O	Валеріано- вый эфиръ { $17,5+78-121=$ $54,2+29-9=$	132° $74,2$	133° 75	
	b H	a^2 b^6O	Капропо- вый эфиръ { $204+78-121=$ $62+29-9=$	161° 82	162° 82	
		Ангидриды b_2 двойные и b_2 смѣшанные b	Уксусный ангидридъ (<i>Gerhardt</i>)			
		b O b^2 b^5O	Уксусно-валеріановый ангидр. (<i>Chiozza</i>)			

Неорганический типъ	Сочетание 1-й степени $3+1-2=2$ степени соч.	Сочетание 2-й степени $2+1-2=1$ степени соч.	Сочетание 3-й предельной степ. $1+1-2=0$, не могутъ больше сочетаться безъ разложения
	<i>H</i> односпиртные <i>NH</i> алкалоиды <i>a</i>	<i>H</i> <i>N a²</i> биэтиламинъ <i>a²</i>	<i>a</i> напр., биметилэт. <i>Na</i> <i>a²</i> <i>a</i> <i>N a'</i> <i>a'</i>
<i>H</i>	<i>NH</i> амиды 1-й степ.	<i>a²</i>	<i>a²</i>
<i>N H</i>	<i>b</i>	<i>N b</i> амидъ этилам.	<i>N a²</i> амидъ биэтилам.
<i>H</i>		<i>H</i>	<i>b</i>
<i>H</i>			<i>Bz</i>
<i>P H</i>			<i>P Bz</i> трибензофосф.
<i>H</i>	<i>Bz</i> $= C_7H_8O.$

Изложивъ общий взглядъ на явленія сочетанія, мы приступимъ теперь къ описанію тѣхъ частныхъ случаевъ, которые были предметомъ нашихъ практическихъ изслѣдованій. Мы предпочли изложить ихъ подробнѣ, потому что, съ одной стороны, они находятъ лучшее для себя объясненіе въ развитомъ нами въ первой части взглядѣ степеней сочетанія и отчасти служатъ подтверждениемъ ему; но, съ другой стороны, касаясь только весьма частныхъ случаевъ сочетанія, они не могутъ служить основными или исходными фактами для общей теоріи этихъ столь разнообразныхъ явленій.

Во второй части читатель увидитъ, оправдали ли мои собственные опыты эту теорію и правильно ли было сдѣлано ея примѣненіе. Въ общей части мы имѣли уже случай говорить объ одномъ опыте, казавшемся намъ нeliшнимъ для разрѣшенія вопроса объ органическихъ остаткахъ и дѣйствующихъ во время сочетанія минеральныхъ элементовъ.

Къ сожалѣнію, мы не можемъ теперь представить всѣхъ нашихъ практическихъ изслѣдованій относительно явленій сочетанія, потому что нѣкоторые изъ нихъ еще не приведены въ ясность (каковы, напр., дѣйствие альдегида, обыкн. эфира и ацетона на

хлор. бензоилъ). Начинаемъ съ изслѣдованій, болѣе другихъ оконченнѣхъ.

Всѣ работы мои были произведены въ лабораторіи Н. Н. Зинина при Медико-Хирургической Академіи, и я считаю пріятнѣйшую обязанность изъявить ему публично мою искреннюю признательность и благодарить отъ лица многихъ за то, можно сказать, отеческое вниманіе, которое онъ постоянно оказываетъ всѣмъ молодымъ людямъ, посвятившимъ себя наукѣ.

О дѣйствіи фосфористаго водорода (PH_3) на хлористый бензоилъ.

Аналогія фосфористаго водорода PH_3 съ амміакомъ, вытекающая изъ его химического состава, подтверждается многими фактами и совершенно признана въ наукѣ; стоитъ, напр., только припомнить его соединенія съ юдисто-и бромистоводородными кислотами, которыхъ даже кристаллическая форма, если не совсѣмъ изоморфна съ тѣми же соединеніями амміака, есть однако ромбоэдръ, чрезвычайно приближающійся къ кубу, форму котораго имъ долго и приписывали; съ хлористыми оловомъ и титаномъ онъ образуетъ также подобныя, хотя не совсѣмъ изомерныя, соединенія. Можно было думать, что дѣйствіе фосф. водорода и на органическія вещества будетъ подобно амміаку и что такимъ путемъ, именно, можно будетъ получить соединенія, соотвѣтствующія амидамъ.

Такого рода соединенія, хотя другимъ путемъ, а именно—дѣйствиемъ фосфорной извести (заключающей соединеніе P_2Ca) на юдистые этиль и метиль, были уже получены Павломъ Тенаромъ въ 1846 г.; впрочемъ, большая часть изъ нихъ относится къ соединеніямъ или, лучше,—сочетаніямъ P_2H и PH_2 , а не PH_3 .

Гофманнъ, по случаю своихъ изслѣдований о спиртныхъ алкалоидахъ (или амміакахъ), говоритъ, что, вѣроятно, дѣйствіе PH_3 на галоидные эфиры дастъ подобные имъ соединенія.

Руководимый такими аналогіями и имѣя въ виду, какъ я уже говорилъ, получить соединенія, соотвѣтствующія амидамъ, я предпринялъ нѣкоторыя опытныя изслѣдованія, результаты которыхъ, хотя весьма еще не совершенныя, сообщаю здѣсь химиче-

ской публикѣ, полагая, что они и теперь могутъ имѣть нѣкоторый интересъ.

До этого времени, сколько мнѣ известно, одинъ только Клоэцъ въ 1846 году пробовалъ такимъ образомъ дѣйствовать фосфористымъ водородомъ¹⁾, но, къ несчастію, я очень поздно узналъ о его работѣ и при томъ не имѣлъ случая прочесть его оригинального мемуара. Поэтому въ своихъ практическихъ занятіяхъ я долженъ былъ довольствоваться только своими соображеніями и для успѣшнаго хода ихъ долженъ былъ предварительно пріобрѣсти нѣкоторую опытность въ работѣ этого рода, тѣмъ болѣе, что, какъ всѣмъ известно, трудно обращаться съ фосфористоводороднымъ газомъ.

Полагая, что фосфористый водородъ, какъ амміакъ, станетъ дѣйствовать на сложные эфиры, образуя фосфиды съ кислотами ихъ, первые мои опыты были сдѣланы надъ щавелевымъ и бензойнымъ эфирами. Первый остался безъ всякаго измѣненія послѣ продолжительного прохожденія струи RH_3 газа; на бенз. эфиръ онъ, кажется, дѣйствовалъ, хотя весьма медленно, однако подъ конецъ опыта эфиръ нѣсколько сгустился, и, при осторожномъ выпариваніи избытка эфира, оставалась аморфная и прозрачная масса непріятнаго запаха. Не совсѣмъ еще убѣжденный въ дѣйствіи фосфористаго водорода, я рѣшился сдѣлать опытъ надъ хлористымъ бензоиломъ. Продукты должны были быть одинакія съ тѣми, которые могли образоваться при дѣйствіи его на эфиръ, но въ такомъ случаѣ легче было вызвать сродство, такъ какъ известно, какъ легко хлористый бензоиль отдаетъ свой хлоръ въ прикосновеніи съ водой, спиртомъ и амміакомъ, который

¹⁾ Онъ дѣйствовалъ RH_3 -домъ на охлоренные уксусный и муравьевинный эфиры (*éth. acet. et formique perchlorés Malgutii*) и въ обоихъ случаяхъ получилъ одно и то же соединеніе, содержащее хлоръ и фосфоръ, которое онъ назвалъ хлорасетифидъ (*Chloracétyphide*) и которое онъ рассматриваетъ, и, кажется, весьма основательно, какъ амидъ хлоруксусной кислоты, въ которомъ N замѣщенъ P., т. е. $RH_3C_2Cl_3O$; Gmelin. Org. ch. t. I, S. 915, и Bertz, t. V S. 791.

гораздо легче въ этомъ случаѣ даетъ амидъ, нежели съ бензойнымъ эфиromъ.

Хлористый бензоиль для этого опыта былъ приготовленъ по способу Кагура, т. е. дѣйствіемъ пятихлористаго фосфора на бензойную кислоту¹⁾; впрочемъ, я нѣсколько сократилъ его, дѣйствуя хлоромъ прямо на смѣсь фосфора съ бензойной кислотой въ пропорціи эквивалентовъ. Реторта, въ которой производилась эта реаکція, нагрѣвалась сначала въ масляной банѣ до температуры плавленія бензойной кислоты (120°); но вскорѣ такое сильное нагрѣваніе сдѣгалось безполезнымъ, потому что смѣсь могла оставаться жидкую до 60° вслѣдствіе образованія жидкаго 3-хъ хлористаго фосфора и хлористаго бензоила, которые растворяли еще не разложившуюся бензойную кислоту; наконецъ, все превратилось въ жидкость, не застывшую при обыкновенной температурѣ отъ образовавшагося въ большемъ количествѣ хлористаго бензоила, однако я продолжалъ еще нагрѣвать, чтобы способствовать реаکціи и отдѣленію хлорокиси фосфора (PCl_5O) и соляной кислоты. Наконецъ, когда хлоръ проходилъ почти безъ всякаго измѣненія, эта работа была прекращена; жидкость перевели въ другую реторту, чтобы отдѣлить ее отъ краснаго фосфора и окиси, которые неминуемо образуются при такихъ обстоятельствахъ, и перегнали сначала при 110° , чтобы отдѣлить всю хлорокись фосфора; когда жидкость перестала кипѣть при этой температурѣ и нѣсколько выше, перемѣнили приемникъ и перегнали ее при температурѣ кипѣнія хлористаго бензоила (196°). Потомъ совершенно прозрачная жидкость была еще разъ подвержена дѣйствію хлора для превращенія послѣднихъ слѣдовъ фосфора, раствореннаго въ ней, въ хлористыя соединенія, которыя были отдѣлены перегонкой. Такимъ образомъ приготовленный и очищенный хлористый бензоиль, нѣсколько капель котораго для пробы были разложены водой, не давалъ съ магнезіей и нашагы-

¹⁾ Ann. Ch. Ph. t. XXIII—1848, p. 327. Recherches relatives a l'action du perrchlorure de phosphore sur les subst. organiques.

ремъ замѣтной реакціи на фосфоръ. Впрочемъ, въ другой разъ я употреблялъ для опыта хлористый бензоилъ, приготовленный прямо изъ масла горькихъ миндалей, но въ обоихъ случаяхъ явленія были одни и тѣ же.

Наконецъ, я пробовалъ еще новый способъ образованія хлористаго бензоила, о которомъ сообщу далѣе, въ особенной статьѣ.

Фосфористый водородъ я приготавлялъ обыкновеннымъ способомъ, нагрѣвая фосфоръ съ щадкой известью¹⁾. Отдѣляющійся газъ проходилъ сначала черезъ крѣпкую соляную кислоту, которая отымала у него свойства самовозгораемости, разлагая жидкий фосфористый водородъ RH_2 , сообщающій ему это свойство, на твердое и газообразное соединенія ($5RH_2 = P_2H + 3RH_3$), какъ это извѣстно изъ наблюдений Тенара; потомъ газъ проходилъ для осушенія черезъ трубку съ жженой известью, гдѣ, кромѣ того, осѣдали пары фосфора въ видѣ желтоватаго налета, что показываетъ необыкновенную летучесть фосфора въ RH_3 газѣ или, лучше, сказать, растворимость, его паровъ въ немъ; послѣ всего этого, наконецъ, газъ проходитъ черезъ хлористый бензоилъ сначала при обыкновенной температурѣ, потомъ при легкомъ нагрѣваніи. Дѣйствіе немедленно оказалось, и начала отдѣляться соляная кислота. Въ этомъ я совершенно убѣдился, пропуская выходящій изъ хлористаго бензоила газъ черезъ растворъ азотнокислого серебра, въ которомъ онъ производилъ свѣтло-сѣрый осадокъ — смѣсь хлористаго серебра съ возстановившимся и, вѣроятно, также фосфористымъ серебромъ; чѣмъ медленнѣе шелъ газъ и чѣмъ, стало быть, онъ болѣе подвергался дѣйствію хлористаго бензоила, тѣмъ осадокъ былъ свѣтлѣе, потому что большая часть фосфор. водорода поглощалась жидкостью, иногда даже получался совершенно бѣлый осадокъ одного хлористаго серебра. При этомъ я замѣтилъ, что, если жидкость была довольно сильно нагрѣта, то осадокъ получался очень тем-

¹⁾ Лучше всего для равномѣрного отдѣленія газа дѣлать небольшіе шарикі изъ свѣже-погашенной извести съ кускомъ фосфора внутри, какъ это описано въ руководствѣ Пелузы.

ный. Это, вѣроятно, отъ того, что газъ, проходя черезъ жидкость при такой температурѣ, нисколько въ ней не растворялся и потому дѣйствовалъ только на незначительную часть хлористаго бензоила; а при болѣе низкой температурѣ онъ распространялся болѣе или менѣе по всей жидкости, что видно было уже по пузырькамъ, которые изъ нея отдѣлялись при нагреваніи. Поэтому, чтобы не мѣшать этому поглощенію газа, послѣ первыхъ попытокъ я совсѣмъ не нагревалъ или весьма слабо, тѣмъ болѣе, что разъ при неосторожномъ нагреваніи (вѣроятно, выше 100°) произошелъ взрывъ отъ прикосновенія газа съ воздухомъ, въ которомъ, какъ известно, фосфористый водородъ загарается уже при 100°.

Я пропускалъ газъ по 4 или 5 часовъ въ продолженіе несколькихъ дней: жидкость, сначала безцвѣтная, окрашивалась мало-по-малу и, наконецъ, приняла довольно густой оранжевый цвѣтъ, а горло реторты и пріемникъ покрылись налетомъ вещества того же цвѣта, образовавшагося тутъ, очевидно, отъ взаимнаго дѣйствія паровъ хлористаго бензоила и фосфористаго водорода.

Черезъ нѣсколько дней жидкость осадила изъ себя полу-прозрачное аморфное вещество также оранжеваго цвѣта. Тогда пропусканіе газа было прекращено, и жидкость слита съ осадка, который былъ облитъ эфиромъ, извлекшимъ изъ него только избыточъ хлористаго бензоила, нисколько не растворивъ оранжеваго вещества. Поэтому, чтобы извлечь его отъ обработанной жидкости, я смѣшалъ ее съ большимъ количествомъ эфира, который и дѣйствительно обезцвѣтилъ ее, произведя желтый осадокъ, впрочемъ, весьма незначительный. Все оранжевое вещество было собрано и промыто до 4 разъ эфиромъ, пока онъ болѣе почти ничего не извлекалъ; потомъ я обработалъ его спиртомъ (85°), который раздѣлилъ мой продуктъ на 2 вещества: одно—бѣлое, растворимое въ немъ, другое—ярко-желтое нерастворимое.

Это обстоятельство усложнило и затруднило мои изслѣдованія, потому что, не смотря на продолжительное пропусканіе

фосф. водорода, все-таки его дѣйствіе такъ слабо¹⁾, что только незначительная часть хлористаго бензоила превратилась въ упомянутые продукты, которыхъ я поэтому получилъ не болѣе 5 граммовъ. Такое малое количество, которое еще уменьшилось при раздѣленіи и очищеніи другъ отъ друга этихъ 2 веществъ, не позволило мнѣ сдѣлать полнаго анализа и всѣхъ изслѣдований, которыхъ требуютъ неизвѣстныя еще соединенія, и потому, къ сожалѣнію, я не могу представить здѣсь полной химической исторіи этихъ соединеній; но я старался подвергнуть ихъ такого рода изслѣдованіямъ, которыя бы скорѣй всего могли опредѣлить ихъ химическій характеръ, объяснить реакцію и привести къ самому вѣроятному химическому составу неизвѣстныхъ веществъ.

Обращаюсь теперь къ ихъ описанію, начиная съ бѣлаго соединенія. Довольно легко растворимое въ крѣпкомъ и горячемъ спиртѣ, оно частью осаждается изъ него при охлажденіи въ видѣ бѣлаго аморфнаго порошка, вода совершенно выдѣляеть его изъ этого раствора; разсмотрѣнное въ такомъ видѣ подъ микроскопомъ, оно не представляло никакихъ слѣдовъ кристаллизациі; сухое и при обыкновенной температурѣ оно не имѣть запаха, но при нагреваніи издаетъ непріятный запахъ, нѣсколько напоминающій запахъ губоцвѣтнаго растенія *Phlomis tuberosa*. Около 100° оно уже плавится и застываетъ потомъ въ полупрозрачную массу. Само по себѣ не имѣть никакой реакції, но оставленное сырое на воздухѣ издаетъ непріятный запахъ и получаетъ кислую реакцію. Въ избыткѣ щелочи оно растворимо, не показывая однако свойствъ настоящей кислоты, потому что осаждается изъ раствора отъ прибавленія нѣсколькихъ капель кислоты, гораздо прежде нейтрализациі. Отъ солей серебра оно чернѣетъ, особенно при нагреваніи, что уже показываетъ присутствіе въ немъ фосфора.

Окисленное и растворенное азотной кислотой, бѣлое вещество даетъ съ солями магнезіи и амміака реакцію на фосфорную

¹⁾ Нужно еще замѣтить, что газъ этотъ всегда бываетъ разжиженъ водородомъ.

кислоту; соли серебра производятъ въ этомъ растворѣ желтый осадокъ, совершенно растворимый въ азотной кислотѣ, что показываетъ отсутствіе хлора въ бѣломъ соединеніи.

Какъ я уже замѣтилъ, недостаточное количество вещества не позволило мнѣ сдѣлать полнаго его анализа; но самая простота реакціи, которая, очевидно, не простидалась на углеродъ, а происходила только между хлоромъ органическаго соединенія и водородомъ газа, давала возможность выразить съ большою вѣроятностью химическій составъ и, слѣдов., реакцію его образованія, не опредѣляя всѣхъ его элементовъ, а только одинъ изъ нихъ, имѣющій болѣе рѣшительное влияніе на этотъ составъ. Потому я опредѣлилъ количественно одинъ фосфоръ, какъ единственный элементъ, который въ этомъ случаѣ могъ дать болѣе или менѣе рѣшительное понятіе объ эквивалентѣ и формулы цѣлаго соединенія:

о,гр.1948 вещества, высушенного при бо^o въ струѣ сухого воздуха, были растворены въ азотной кислотѣ, жидкость осторожно выпарена въ платиновомъ тиглѣ и остатокъ проекаленъ въ присутствіи взвѣщенаго количества магнезіи; прибавокъ вѣса показываетъ фосфорную кислоту:

тигель съ магнезіей = 33,5821
тигель послѣ проекаливанія съ веществомъ. = 33,6190
прибавокъ вѣса отъ фосфорной кислоты . = 0,0369,

который соотвѣтствуетъ о,гр.0164 фосфора во взятомъ количествѣ вещества; такое содержаніе, переведенное на 100, даетъ 8,4; следовательно процентный составъ соединенія можно выразить такъ:


фосфора	8,4
остальныхъ элементовъ <u>(C,H,O)</u>	91,6
	100,0

По химическимъ свойствамъ дѣйствующихъ соединеній и, наконецъ, по тѣмъ явленіямъ, которыя сопровождали реакцію, нельзя сомнѣваться, что она происходила только между водородомъ

фосфористаго водорода и хлоромъ бензойнаго соединенія, не касаясь его углерода и кислорода; и потому намъ нужно только опредѣлить между сколькими эквивалентами обоихъ соединеній происходила реакція; содержаніе фосфора въ продуктѣ можетъ, кажется, совершенно это рѣшить; разберемъ разные случаи реакціи и сравнимъ ихъ съ результатомъ нашего анализа.

Если бы реакція происходила, какъ мы предполагали, начавши нашъ опытъ, между простыми эквивалентами соединеній по аналогіи съ образованіемъ бензаміда, то въ такомъ случаѣ получался бы по реакції:


$C_7H_5OCl + PH_3 = HCl + C_7H_5O, PH_2$ бензофосфидъ, формула которого требуетъ 20% фосфора, что несогласно съ нашимъ результатомъ,—слѣдовательно, происходила другая реакція. Въ нашихъ общихъ замѣчаніяхъ о явленіяхъ сочетанія мы показали, что PH_3 , какъ и амміакъ, имѣлъ 3 степени сочетанія, потому въ этомъ случаѣ онъ могъ вступить въ сочетаніе съ двумя и даже съ тремя экв. органическаго соединенія. Реакція съ двумя эквивалентами также несогласна съ нашимъ анализомъ. Съ тремя же эквивалентами получается соединеніе, совершенно соотвѣтствующее нашему опредѣленію фосфора, котораго эта формула требуетъ 9%, а мы получили 8,4;



разница въ полупроцентъ совершенно объяснима незначительной потерей при выпариваніи, поэтому мы считаемъ себя въ правѣ заключить, что полученное нами бѣлое соединеніе есть *трибензофосфидъ* (или, кратче, трибензифидъ).

Соотвѣтствующее ему соединеніе для амміака, хотя еще не получено, но, вѣроятно, можетъ образоваться при дѣйствіи избытка хлористаго бензоила на бензамідъ, и открытые Гофманомъ 3-хъ спиртные амміаки даютъ намъ иѣкоторое право это предполагать. Поэтому теперь можно представить рядъ извѣстныхъ и возмож-

ныхъ сочетаній амміака и фосфорнаго водорода съ бензойной кислотой или хлор. бензоиломъ слѣдующимъ образомъ:



Теперь, если мы обратимся къ химическимъ условіямъ образованія нашего соединенія, то еще болѣе убѣдимся въ вѣроятности такой реакціи.

Прежде всего замѣтимъ, что PH_3 гораздо легче отдастъ свой водородъ, нежели амміакъ: около 150° онъ уже разлагается на водородъ, твердый фосфористый водородъ и даже фосфоръ, тогда какъ амміакъ выдерживаетъ красно-калильный жарь безъ всякаго измѣненія; онъ легко восстановляеть многія металлическія соли, теряя свой водородъ въ видѣ воды; сюра также при нагреваніи отнимаетъ у него этотъ элементъ и т. д. Ничего подобнаго амміакъ не представляетъ. Поэтому весьма естественно, что PH_3 , встрѣчая избытокъ хлористаго бензоила, который, какъ мы замѣтили, довольно легко теряетъ свой хлоръ въ видѣ соляной кислоты, даъ третью степень сочетанія. Впрочемъ, очень можетъ быть и даже довольно вѣроятно, что не прямо образовался трибензофосфидъ, а что ему предшествовали первыя двѣ степени сочетанія; но, встрѣчая потомъ избытокъ хлористаго бензоила, онъ тотчасъ или мало-по-малу перешли въ высшую, предѣльную степень. Любопытно было бы получить эти два соединенія. Для этого, разумѣется, нужно измѣнить условія: наприм., дѣйствовать PH_3 -мъ на эфирный растворъ хлористаго бензоила; эти соединенія, вѣроятно, нерастворимыя въ немъ, осаждались бы и не подвергались такимъ образомъ дальнѣйшему дѣйствію хлористаго бензоила.

Все это, кажется, достаточно объясняетъ образованіе полученнаго нами бѣлаго вещества и подтверждаетъ предложенную для него формулу $C_{21}H_{15}O_5P$.

Способъ, который мы избрали для определенія фосфора въ этомъ соединеніи, показался намъ самыемъ удобнымъ въ этомъ случаѣ; простота его и скорость исполненія устранили потери, неизбѣжныя при длинной и сложной манипуляціи: вотъ почему мы не употребили способа Бертье посредствомъ взвѣшеннаго количества чистаго желѣза, также отвергли сольмагнезіи, которая еще, какъ теперь известно, нѣсколько растворима въ водѣ.

Наконецъ, мы предпочли магнезію окиси свинца, которую иногда употребляютъ въ подобныхъ случаяхъ, во-первыхъ, потому, что это при прокаливаніи на воздухѣ можетъ поглотить кислородъ, а во-вторыхъ,—для того, чтобы можно было прокаливать въ платиновомъ тигле.

Чтобы убѣдиться въ достовѣрности употребленного мною способа, я сдѣлалъ предварительный опытъ со взвѣшенымъ количествомъ фосфора: потеря была самая незначительная—менѣе полу процента—и произошла только отъ того, что при окисленіи фосфора азотной кислотой небольшое количество паровъ его было увлечено изъ колбы.

Другое соединеніе, оставшееся послѣ обработки осадка спиртомъ, представляется въ видѣ аморфнаго оранжеваго порошка, нерастворимаго, новициуму, ни въ какихъ жидкостяхъ, развѣ только въ хлористомъ бензолѣ, изъ котораго оно осѣло; по крайней мѣрѣ, ни эфиръ, ни бензолъ и другіе углеводороды, ни углесѣра его не трогаютъ.

Оно издастъ очень сильный и проницательный запахъ, особенно при нагреваніи, нѣсколько напоминающій бѣлое соединеніе, но несравненно его острѣе и болѣе похожій на запахъ хрена или рѣшки. При нагреваніи со щелочами этотъ запахъ усиливается, и къ нему присоединяется еще запахъ фосфористаго водорода, и самое вещество бурѣстъ, не растворяясь; кислоты возвращаютъ его прежний цветъ. Дымящаяся азотная кислота

окисляеть его со взрывомъ, а обыкновенная превращаетъ его въ смолистое вещество пріятнаго миндального запаха. Определеніе въ немъ фосфора привело къ слѣдующимъ результатамъ:

0,428 вещества, окисленные и прокаленные съ магнезіей (0,264), прибавили къ ея вѣсу 0,3864, что соотвѣтствуетъ 0,1717 фосфора; переведенное на сто это даетъ слѣдующій составъ желтаго вещества:

49	фосфора
50	остальныхъ элементовъ (C_7H_5O)
100	

Такое содержаніе фосфора всего вѣроятнѣе можно объяснить слѣдующей реакцией:



продуктъ которой есть *биfosфобензидъ*, требующій 38% фосфора; лишніе 2% могли произойти отъ примѣси незначительного количества какого-нибудь фосфористаго соединенія, какъ напримѣръ, окиси фосфора или твердаго фосфористаго водорода, образовавшихся во время реакціи окисленіемъ небольшого количества фосфористаго газа; и, такъ какъ полученнное мною желтое соединеніе, какъ я уже говорилъ, ни въ чёмъ не растворяется, то я не могу его очистить совершенно отъ упомянутыхъ примѣсей такого же свойства.


Образованіе бифосфобензида P_2H_5 , C_7H_5O при бывшихъ обстоятельствахъ, кажется намъ довольно вѣроятнымъ и имѣть аналогію со многими химическими явленіями: замѣтимъ, что при взаимномъ дѣйствіи двухъ тѣль весьма часто одновременно образуются низшія и высшія соединенія относительно одного изъ нихъ; я уже не говорю о разныхъ степеняхъ окисленія, кислыхъ и основныхъ соляхъ и т. п., но даже самыи амміакъ даетъ подобныя явленія: всѣмъ извѣстны разнообразныя соединенія, которыя получилъ Лоранъ дѣйствіемъ амміака на изатинъ; хотя образованіе ихъ выражается одной общей реакцией сочетанія амміака съ изатиномъ при выдѣленіи воды, но они отличаются между

собою относительнымъ числомъ эквивалентовъ обоихъ тѣлъ, вошедшихъ въ сочетаніе. Но ближайшая аналогія бифосфобензіда — это съ биаммоніакальными соединеніями или съ биамидаами и би-аммоніями, установленными недавно Лораномъ въ его общей теорії аммоніакальныхъ соединеній¹⁾, которую потомъ оправдалъ на опытѣ Жераръ для нѣкоторыхъ платиновыхъ соединеній²⁾; такъ напримѣръ, соль Рейзе, $PtCl_2NH_3$ Жераръ представляетъ $C_7H_5N_2H_5Pt$ (chlorhydrate de diplatosamine), заключающее платинистый двуамміакъ (diamine N_2H_6 Лорана), которому, по его мнѣнію, соотвѣтствуетъ diphosphamine P_2H_6 .

Кромѣ всѣхъ этихъ аналогій, въ пользу предложенной нами формулы для оранжеваго соединенія говоритъ болѣе всего простота самой реакціи, ее объясняющей и совершенно соотвѣтствующей дѣйствительному наблюдаемымъ явленіямъ.

Итакъ, изслѣдованія наши о дѣйствіи фосфористаго водорода на хлористый бензоилъ позволяютъ, я думаю, заключить, что PH_3 такъ же, какъ и амміакъ, входитъ въ этомъ случаѣ въ сочетаніе, отдѣляя свободную соляную кислоту, которая въ случаѣ амміака оставалась съ нимъ въ соединеніи въ видѣ нашатыря; но, тогда какъ амміакъ даетъ только одно соединеніе и, именно, первую степень сочетанія — бензамидъ, фосфористый водородъ образуетъ въ этомъ случаѣ, по крайней мѣрѣ, 2 соединенія: одну высшую степень сочетанія — трибензофосфида, а другую низшую степень, которую можно назвать первою степенью сочетанія типа бифосфина PH_6 ; а самое соединеніе бифосфобензідъ.

Замѣтимъ, впрочемъ, что симметрія реакціи образованія этого тѣла еще ближе подходитъ къ реакціи бензамида, нежели трибензофосфида, а именно:



¹⁾ Comptes rendus des travaux de chimie. 1850, p. 201. A. Lorent. Sur les combinaisons ammoniacales.

²⁾ Ib. 273. Ch. Gerhardt. Recherches sur les combinaisons ammoniacales du platine.

Слѣдовательно, обѣ реакціи происходятъ между такими же эквивалентными пропорціями дѣйствующихъ соединеній; но, такъ какъ RH_3 не можетъ соединиться съ CN , то оба экв. RH_3 входитъ въ сочетаніе съ бензойной группой. Такимъ образомъ, можетъ быть, лучше всего объясняется образованіе бифосфобензида въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не образуется соответствующаго ему соединенія амміака. Съ другой стороны, то обстоятельство, что соляной кислоты не отдѣляется при дѣйствіи амміака, объясняетъ, можетъ быть, почему не образуется трибензамида, потому что тогда долженъ бы быть избытокъ амміака, чтобы соединиться съ соляной кислотой, а въ такомъ случаѣ нѣтъ причины, чтобы амидъ перешелъ въ высшую степень сочетанія, когда могутъ образоваться еще низшія; тогда какъ RH_3 , теряя легче свой водородъ и не имѣя сродства къ соляной кислотѣ, легко отдѣляется ею. Можетъ быть, дѣйствуя RH_3 на юдистый бензоиль, получится бензофосфидъ, потому что реакція при этомъ должна быть совершенно такая, какъ при образованіи бензамида.

Желая испытать аналогію RH_3 съ амміакомъ въ другихъ обстоятельствахъ, я пробовалъ получить его соединеніе съ альдегидомъ, подобное альдегиду-аммоніаку, но безъ всякаго успѣха; я пробовалъ также его дѣйствіе на юдистый этилъ, въ надеждѣ получить соединеніе, соответствующее этиламину, но, прочигавъ въ одной изъ послѣднихъ статей Гофмана, о которыхъ мы уже упоминали, намекъ на эту реакцію и, полагая, что этотъ ученый самъ намѣренъ привести ее въ исполненіе, я не продолжалъ своихъ опытовъ, хотя они были начаты гораздо прежде появленія этой статьи; кажется, впрочемъ, Гофманъ по сио пору еще ничего обѣ этомъ не публиковалъ. При своемъ опыте я однако не замѣтилъ реакціи, которая, если происходила, была, вѣроятно, чрезвычайно слабая.

Далѣе я покуда еще не продолжалъ своихъ изслѣдований о дѣйствіи RH_3 , потому что, изучая вообще явленія сочетанія, я началъ и другія работы въ этомъ направленіи, изъ которыхъ нѣкоторыя уже привели меня къ положительнымъ результатамъ,

хотя еще не разъясненнымъ анализомъ, но о которыхъ я позволю себѣ сказать въ концѣ нѣсколько словъ.


Въ скоромъ времени, однако, я постараюсь болѣе разъяснить описанную мною реакцію фосфористаго водорода. Теперь же я обращаюсь къ упомянутымъ изслѣдованіямъ.

О новомъ случаѣ образованія хлористаго бензоила.


Нѣкоторые химики, какъ напр., Жераръ¹⁾, относятъ образованіе хлористаго бензоила изъ масла горькихъ миндалей къ явленіямъ металептическаго замѣщенія, и въ самомъ дѣлѣ, симметрія реакціи, которой, какъ мы уже замѣтили въ общей части, Жераръ придаєтъ слишкомъ большое значеніе, согласуется съ этимъ мнѣніемъ, но всѣ химическія свойства этого соединенія и новый способъ его образованія, открытый Кагуромъ, совершенно противорѣчатъ такому предположенію знаменитаго французскаго ученаго: они показываютъ, что хлоръ не имѣетъ въ немъ металептическаго значенія, а скорѣе галоидное, и замѣщаетъ $\frac{1}{2}$ объема кислорода, а не 2 объема водорода. Въ самомъ дѣлѣ, онъ участвуетъ въ сочетаніяхъ, выдѣляясь при этомъ въ видѣ соляной кислоты, что никогда не бываетъ, какъ мы уже показали съ металептическимъ хлоромъ, который переходитъ въ сочетанное соединеніе въ органической группѣ; при томъ известно, что въ бензойномъ альдегидѣ можно произвести азотное (слѣд., металептическое) замѣщеніе, и этотъ азотный альдегидъ при окисленіи даетъ нитробензойную кислоту, можетъ также дать гидрамидъ и т. п., однимъ словомъ,—всѣ соединенія, какъ и первоначальный его типъ. Если бы хлористый бензоиль былъ бы продуктъ металептическаго замѣщенія, то онъ точно такъ же дать бы хлорбензойную кислоту и при сочетаніи съ амміакомъ гидрамидъ, а не бензамидъ. Мы все это объясняемъ тѣмъ, что бензойный альдегидъ, заключая одинъ

¹⁾ Онъ описываетъ оба эти тѣла въ одномъ родѣ (genre); масло горьк. минд. подъ именемъ *benzoïlöl*, это—*benzoïl chloré*.

экв. водорода сочетания (или металлич.) теряетъ именно его при дѣйствіи на него хлоромъ, а остатокъ соединяется съ хлоромъ, который тутъ представляетъ $\frac{1}{2}$ объема кислорода. Удвоивши эквивалентъ хлор. бензоила и замѣстивъ хлоръ кислородомъ, получится




торый есть, следовательно, хлористый ангидрилъ бензойной кислоты, что и оправдывается тѣмъ, что, вступая въ двойное разложеніе съ водой, онъ переходитъ въ бензойную кислоту; къ бензойному ангидриду онъ относится какъ соляная кислота (одноводородная) къ водѣ (соединенію двуводородному). Реакцію образования хлористаго бензоила и его аналогію можно выразить следующимъ образомъ:




азотистый альдегидъ



$x = NH_2$



Образованіе хлористаго бензоила при дѣйствіи пятихлористаго фосфора на бензойную кислоту подтверждаетъ эти аналогіи. Основываясь на этомъ, я придумалъ новую реакцію образования хлористаго бензоила, состоящую въ томъ, чтобы дѣйствовать на бензойную кислоту галоидной солью въ присутствіи безводной кислоты:




$2NaCl$ вступаютъ въ двойное разложеніе съ бензойной кислотой (типъ воды Bz H^O) и переводятъ ее въ HCl и C_7H_5O, Cl , также

типа соляной кислоты, а образовавшаяся Na_2O соединяется съ SO_3 .

Чтобы исполнить эту реакцію, я смѣшалъ бензойную кислоту съ поваренной солью и безводнымъ кислымъ сѣроокислымъ кали $SO_4K_2+SO_3$ въ пропорціи показанной реакціи и смѣсь нагрѣваль въ реторгѣ до 180° — 200° .

Предвидѣнная мною реакція дѣйствительно произошла: стала выдѣляться соляная кислота и смѣсь сдѣлалась мокрою отъ образовавшагося хлористаго бензоила; но, поглощенный большимъ количествомъ твердыхъ веществъ, онъ почти совсѣмъ не перегонялся, и я долженъ былъ, разбивши реторту, извлечь изъ твердой массы, издававшей острый и характеристической запахъ хлористаго бензоила, это соединеніе эфиромъ, который, выпаренный, оставилъ небольшое количество смѣси бензойной кислоты и хлористаго бензола со всѣми его признаками. Реакція почти не требуетъ объясненія.



Какъ видно, эта реакція имѣть только теоретической интересъ, но неудобна на практикѣ для приготовленія хлоробензойнаго ангидрида; но, впрочемъ, она можетъ быть удобна для приготовленія подобныхъ соединеній болѣе летучихъ кислотъ, какъ напр., уксусной; известно, что ея хлорангидридъ C_2H_3O, Cl недавно получиль Жераръ дѣйствиемъ трехъ-хлористаго фосфора на кристаллическую кислоту.

Теперь, въ заключеніе этого разсужденія, позволю себѣ сказать нѣсколько словъ о начатыхъ мною работахъ, относящихся также къ явленіямъ сочетанія.

Наблюденія надъ сухой перегонкой альдегидъ-аммоніака.

Сочетаніе амміака со спиртомъ (1-нимъ экв.) есть алкалоидъ, этиламінъ $NH_2C_2H_5$, съ уксусной кислотою—нейтральный ацетамідъ $NH_2C_2H_3O$. Любопытно было бы получить сочетаніе его съ альдегидомъ, какъ съ среднимъ членомъ между тѣми двумя соединеніями, слѣдующей реаціей $C_2H_4O + NH_3 - H_2O = NO_2, C_2O_3$ —альдегидъ аммоніакъ.

альдегидамінъ, не содержащий въ себѣ кислорода и отличающійся отъ этиламина только H_2 ; потому можно надѣяться, что онъ также былъ бы летучій алкалоидъ. Имѣя это въ виду, я попробовалъ перегонять альдегидъ-аммоніакъ въ присутствіи безводной фосфорной кислоты, а въ другой разъ съ хлористымъ цинкомъ; известно, что при такихъ обстоятельствахъ аммоніакальныя соли даютъ амиды и нитрилы, теряя элементы воды.

Сначала при слабомъ нагреваніи происходитъ, на счетъ находящейся въ смѣси воды, двойное разложеніе: отдѣляется альдегидъ и образуется аммоніакальная соль, также перегоняется нѣсколько альдегидъ-аммоніака; но при дальнѣйшемъ нагреваніи, которое поэтому нужно вести быстро, начинается очень сложное разложеніе: масса бурѣеть, отдѣляется углекислый амміакъ и даже вода и, наконецъ, перегоняется маслообразное вещество, сначала безцвѣтное, но потомъ все болѣе и болѣе темное; въ ретортѣ остается бурое полуобугленное вещество, занимающее, по крайней мѣрѣ, втрое большій объемъ, нежели первоначальная смѣсь. Въ приемникъ собирается аммоніакальная жидкость съ бурымъ маслообразнымъ слоемъ на поверхности. Отъ прибавленія кислоты

къ продукту перегонки сначала съ шипѣнiemъ отдѣлилась углекислота, а потомъ совершенно исчезла маслообразная жидкость; щелочи снова выдѣлили ее изъ прозрачного раствора. Изъ этого я заключилъ, что маслообразное вещество имѣеть свойства алкалоида. Но сложность реакціи во время сухой перегонки альдегида-аммоніака и весьма трудная летучесть этого тѣла показывали въ то же время, что оно не было ожидаемымъ альдегидаминомъ, а содержало, по крайней мѣрѣ, втрое больше его углерода; однако, тѣмъ не менѣе я обратилъ на него все свое вниманіе, стараясь по возможности замѣтить его свойства, насколько позволяло мнѣ небольшое количество полученнаго мною продукта.

Это маслообразное вещество имѣетъ чрезвычайно проницательный запахъ жженыхъ перьевъ, который на долго пристаетъ къ рукамъ и платью.

Я отдѣлилъ его эфиромъ отъ аммоніакальной жидкости и, выпаривъ, насытилъ осторожно сѣрной кислотой оставшееся маслообразное вещество, потомъ облилъ его спиртомъ, чтобы отдѣлить отъ аммоніакальной соли, вѣроятно, растворимую соль алкалоида; и, дѣйствительно, профильтрованный горячій растворъ, который оставилъ много не растворенной аммоніакальной соли, при сильномъ охлажденіи осадилъ изъ себя блестящія кристаллическія пластины; на воздухѣ онѣ чрезвычайно легко бурѣли и расплывались; ни онѣ, ни жидкость не имѣли уже больше запаха, но щелочи опять производили его въ ихъ растворѣ, который при этомъ дѣлался мутнымъ. При легкомъ нагреваніи эти кристаллики снова исчезали, но при охлажденіи опять появлялись; но, оставивъ ихъ въ спиртовой жидкости, они черезъ нѣсколько дней совсѣмъ исчезли, такъ что никакое охлажденіе не вызывало болѣе ихъ выдѣленія. Я замѣтилъ, что черезъ нѣсколько дней щелочи производили въ растворѣ этого алкалоида твердый бурый осадокъ; можетъ быть,—это уже измѣненный алкалоидъ; а, можетъ быть, подобно и многимъ другимъ жидкимъ алкалоидамъ, какъ напр., анилину, онъ въ первый моментъ выдѣляется въ твердомъ видѣ.

Такая измѣняемость этого алкалоида не позволила мнѣ полу-
чить его въ чистомъ и кристаллическомъ состояніи (изъ неболь-
шого притомъ количества), чтобъ подвергнуть его анализу и потому
я про него ничего болѣе не знаю въ настоящее время, но вскорѣ
надѣюсь пріобрѣсти и сообщить болѣе точныя свѣдѣнія объ
этомъ предметѣ.

ПОЛОЖЕНИЯ.

- I. Химическое значение, *valeur chimique*, элементовъ зависитъ отъ всѣхъ явлений (какъ физическихъ, такъ и химическихъ), связывающихъ эти элементы съ цѣльнымъ соединеніемъ, и можетъ быть выражено функцией тѣхъ измѣнений, которыя сопровождаются известнос превращеніе матеріи.
- II. Полезно было бы, для дальнѣйшаго развитія науки, выражать химическими формулами эти значения, какъ это предлагалъ Персоцъ ¹⁾,—разумѣется, не соединяя съ ними понятія французскаго ученаго о молекулярномъ расположениі.
- III. Явленія сочетанія, опредѣляясь, какъ и всѣ химическія явленія, значеніемъ участвующихъ элементовъ, обусловливаются именно металлическимъ и галоиднымъ или амфиднымъ значеніемъ ихъ.
- IV. Разсматривая съ этой же точки зреінія образованіе азотныхъ тѣлъ (*corps nitrés*), его слѣдуетъ отнести къ явленіямъ металлическаго замѣщенія, а не къ сочетаніямъ.
- V. Возможность сочетанія фосфористаго водорода подобно аммиаку подтверждаетъ то мнѣніе, что фосфоръ находится въ белковинныхъ веществахъ въ такомъ же видѣ (т. е. имѣть то же химическое значение), какъ азотъ, неопределенную (хотя, разумѣется, эквивалентную) часть котораго онъ замѣщаетъ въ нихъ; следовательно, въ такомъ видѣ, какъ въ водородномъ соединеніи.

¹⁾ Persoz. Introduction à la chimie moléculaire. 1839.

ИЗСЛѢДОВАНІЯ

НАДЪ


ЯВЛЕНІЯМИ ВЫТѢСНЕНІЯ

ОДНИХЪ ЭЛЕМЕНТОВЪ ДРУГИМИ

ПРОФЕССОРА

Н. Н. ЩЕКЕТОВА.

По изданію 1865 года.



Тип. А. Дарре.

Н. Н. Бекетовъ — въ своемъ рабочемъ кабинетѣ. 1879 г.

Выдѣленіе однихъ элементовъ другими изъ соединеній представляеть явленіе, имѣющее самый глубокій научный интересъ, потому что здѣсь мы прямо сталкиваемся съ первоначальными химическими свойствами этихъ элементовъ. Это явленіе обнаруживаетъ въ самомъ простомъ видѣ то, что называютъ химическимъ сродствомъ, тотчасъ указывая на химическое различіе элементовъ, чего не обнаруживаются явленія прямого соединенія. Вытѣсненіемъ другъ друга изъ соединеній характеризуются элементы, такъ: въ химіи составилось, напр., понятіе о необыкновенной химической энергіи калія, основанное на томъ, что онъ вытѣсняетъ почти всѣ другіе металлы; эти свойства его послужили къ открытию глинія, кремнія, цирконія, барія и множества другихъ простыхъ тѣлъ. По этимъ же явленіямъ составляются таблицы сродства простыхъ тѣлъ. Съ другой стороны, известная зависимость явленій вытѣсненія отъ вида физическихъ условій, каковы, напр., температура, давленіе, масса и проч. представляютъ также удобный случай познакомиться съ влияниемъ этихъ условій на химическую реакцію.

Поэтому понятно, что изученіе этихъ явленій скорѣе всего можетъ навести на общія начала для объясненія химическихъ явленій. Убѣжденный въ этомъ, я обратился къ изслѣдованію явленій вытѣсненія: своими опытами я старался пополнить нѣкоторые пробѣлы и вообще увеличить число известныхъ фактовъ этой реакціи. Результаты этихъ опытныхъ изслѣдований изложены въ первой части этого сочиненія. Но, имѣя въ виду, какъ было сказано, что въ этихъ явленіяхъ скорѣе всего можно прослѣдить какое-нибудь общее правило химического дѣйствія, я обратилъ особенное вниманіе на чисто теоретическую сторону этого вопроса.

Въ этой части своего труда я старался связать химическія явленія съ общими механическими свойствами матеріи, принявъ во вниманіе относительныя массы и разстоянія дѣйствующихъ частицъ. Я считаю себя въ правѣ ввести эти величины въ мои химическія соображенія, такъ какъ они даются опытомъ. Нѣкоторыя простыя правила, которыя обнаружились при этомъ способѣ разматриванія химическихъ явленій, убѣдили меня, что я напаѣлъ не на ложный путь.

Строго-математическій методъ, который такъ легко прикладывается къ выражению астрономическихъ явленій, не былъ еще приложенъ къ изученію химическихъ явленій, можетъ быть, для этого нѣтъ еще достаточно точныхъ данныхъ. Не обладая самъ необходимыми для этого математическими свѣдѣніями, я и не могъ взяться за это, а только указалъ на возможность и путь такого примѣненія, и потому желательно было бы, чтобы люди, знакомые съ примѣненіемъ математики къ молекулярнымъ явленіямъ, обратили бы свои изысканія и на химическія явленія.

I. Опытныя изслѣдованія.

Для пополненія нашихъ свѣдѣній о явленіяхъ возстановленія, я избралъ для своихъ изслѣдований нѣсколько частныхъ случаевъ, казавшихся мнѣ наиболѣе поучительными. Такимъ образомъ, я пришелъ къ изученію возстановляющаго дѣйствія водорода при обыкновенной температурѣ, которое было почти неизвѣстно. Хотя при высокихъ температурахъ это дѣйствіе очень энергично и общеупотребительно, но въ этомъ случаѣ нѣть полной аналогіи съ возстановленіемъ одного металла другимъ—мокрымъ путемъ; съ другой стороны, и самое газообразное состояніе водорода какъ бы скрываетъ его металличность, которая даже и теперь признается не всѣми химиками. Поэтому опыты въ этомъ направлениі для разъясненія металлическихъ свойствъ водорода и мнѣста его въ ряду другихъ металловъ казались мнѣ небезполезными. Самый способъ дѣйствія водорода, избранный мною, а именно, подъ болѣе или менѣе высокимъ давленіемъ, даъ мнѣ случай отчасти изучить и влияніе этого условія на химическія реакціи. Чтобы лучше разъяснить этотъ послѣдній вопросъ, я произвелъ рядъ опытовъ надъ углекислотой съ специальной цѣлью изученія давленія.

Я изслѣдовала также, но съ гораздо меньшою подробностью, нѣкоторые другіе, еще неизвѣстные случаи возстановленія, какъ напр.: кремнія—цинкомъ, барія—глинемъ и нѣкоторые другие. Эта первая часть содержитъ описание этихъ изслѣдований, частью уже публикованныхъ, а частью нѣть.

§ 1.

Дѣйствіе водорода на растворы серебра и ртути при различныхъ давленіяхъ¹⁾.

Растворъ азотнокислого серебра, какъ было давно извѣстно, осаждаетъ серебро, если чрезъ него пропустить водородъ; растворъ же сѣрнокислого серебра при этомъ не измѣняется, конечно, если водородъ дѣйствуетъ въ темнотѣ, какъ это показали опыты Дюма, Озанна и Магнуса. Впрочемъ, эти свѣдѣнія отрывочные, и сами наблюденія были сдѣланы мимоходомъ; условія реакціи не были изучены; отношенія растворовъ ртути и другихъ металловъ были совершенно неизвѣстны; вопросъ этотъ, однимъ словомъ, былъ едва затронутъ, и мнѣ онъ казался стоящимъ болѣе внимательного разсмотрѣнія, для чего я и предпринялъ рядъ опытовъ.

Чтобы сдѣлать болѣе замѣтнымъ дѣйствіе водорода и вызвать его въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ оно еще не было замѣчено, я поиспользовалъ дѣйствовать водородомъ при высокомъ давленіи въ запаянныхъ трубкахъ, не имѣя въ виду собственно изучить влияніе давленія. Этотъ способъ давалъ возможность производить опыты болѣе продолжительное время, и самое количество дѣйствія, отъ большей густоты водорода, должно было увеличиться. Однако, дѣйствуя при различныхъ давленіяхъ, я замѣтилъ некоторые особенности, которые заставили меня обратить вниманіе и на самое условіе реакціи, т. е. на влияніе давленія на химическое дѣйствіе газовъ. Для разясненія этого послѣдняго вопроса, я произвелъ отдѣльное изслѣдованіе наѣ отношеніемъ углекислоты къ солямъ извести. Эти изслѣдованія описаны ниже, въ особой главѣ.

Способъ, которымъ были произведены опыты для изслѣдованія дѣйствія водорода, очень простой. Въ различныя вѣги

1) Этотъ параграфъ изложенъ частью по моей статьѣ, представленной Парижской Академіи Наукъ въ 1859 г.; она напечатана въ Comp. Rend. XLVIII, 442.

изогнутой нѣсколько разъ стеклянной трубки (см. рисунокъ 1 на таблицѣ) помѣщають отдельно другъ отъ друга—металлическій растворъ, кислоту и очищенный цинкъ и запаиваютъ открытый конецъ трубки; потомъ, наклоняя понемногу трубку, заставляютъ цинкъ падать въ кислоту и наблюдаютъ время отъ времени явленія, происходящія въ трубкѣ. При многихъ опытахъ водородъ, прежде чѣмъ дѣйствовать на металлическій растворъ, проходилъ предварительно сквозь слой того же самаго раствора, помѣщенный въ особенной вѣтви между кислотою и растворомъ; однако я никогда не замѣчалъ разницы между этими двумя способами дѣйствія. Всѣ мои опыты были произведены безъ доступа свѣта.

Въ первомъ рядѣ своихъ изслѣдованій, результатъ которыхъ былъ представленъ Парижской Академіи Наукъ, я только приблизительно опредѣлялъ давленіе, такъ какъ сначала нужно было убѣдиться въ возможности самого восстановленія. Впослѣдствіи я произвелъ нѣсколько опытовъ другимъ способомъ—съ манометромъ. Для приблизительного же опредѣленія давленія я измѣрялъ емкость трубки и объемъ введенныхъ туда жидкостей; кромѣ того, я опредѣлялъ вѣсъ положенного туда цинка; кислоты я бралъ всегда въ количествѣ, достаточномъ для полнаго растворенія цинка. Такимъ образомъ, зная объемъ, въ которомъ долженъ быть сгуститься водородъ, происшедший отъ растворенія всего цинка, легко было заранѣе вычислить приблизительно maximum давленія, до кото-
рого можетъ дойти газъ въ трубкѣ; но, такъ какъ дѣйствіе водорода обнаруживалось всегда ранѣе полнаго растворенія цинка, а не растворенаго цинка не было никакой возможности собрать при вскрытии, сопровождавшимся болѣе или менѣе сильнымъ взрывомъ, то при первыхъ своихъ опытахъ я могъ составить себѣ только отдаленное понятіе о давленіи, при которомъ начиналось дѣйствіе. Я полагаю однако, что давленіе это, въ большей части случаевъ, вслѣдствіе незначительного количества растворенаго цинка, не могло превышать 10-ти атмосферъ. Результаты этихъ первыхъ опытовъ слѣдующіе: растворъ хлористаго серебра въ аммоніакѣ, подверженный дѣйствію сжатаго водорода, бурѣеть

на площади прикосновенія жидкости съ газами; потомъ дѣйствіе распространяется по всей массѣ, и чрезъ нѣсколько дней на стѣнкахъ и на лѣѣ трубки осаждается сѣрый порошокъ, который, будучи изслѣдованъ по открытіи трубки, представилъ всѣ свойства металлическаго серебра. Я не замѣтилъ никакого возстановительнаго дѣйствія водорода на тотъ же самый растворъ при обыкновенномъ давленіи.

Азотнокислое серебро, при такихъ же обстоятельствахъ, очень скоро осадило бѣлое металлическое серебро въ видѣ тонкой пленки, состоящей изъ кристаллическихъ сѣтокъ; нейтральный растворъ при этомъ сдѣлался кислымъ.

Подъ обыкновеннымъ давленіемъ водородъ въ продолженіе долгаго времени также дѣйствуетъ на этотъ растворъ. Самый замѣчательный явленія представило мнѣ сѣрнокислое серебро: насыщенный растворъ этой соли, подверженный дѣйствію скагаго водорода, не представилъ даже слѣдовъ возстановленія послѣ нѣсколькихъ дней дѣйствія; но тотъ же растворъ, разбавленный тремя частями воды, началь разлагаться послѣ нѣсколькихъ часовъ прикосновенія съ стущеннымъ водородомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ возстановленное серебро осѣло въ видѣ зеркальной металлической пленки, а въ другихъ осѣло темносѣрый порошокъ, который при слабомъ нагреваніи терялъ свой темный цвѣтъ и отдѣляя газъ, превращаясь при этомъ въ металлическое серебро. Я имѣлъ слишкомъ мало вещества, чтобы сдѣлать болѣе совершенное изслѣдованіе, но обстоятельства, при которыхъ оно образовалось, позволяютъ думать, что это было водородное серебро: это не могла быть окись серебра, потому что окружающая жидкость представляла кислую реакцію.

Уксуснокислое серебро разлагается водородомъ уже при обыкновенномъ атмосферномъ давленіи.

Многіе опыты съ азотнокислою закисью ртути подъ высокимъ давленіемъ даютъ положительные результаты: на площади прикосновенія появляются маленькие шарики ртути, которые, падая чрезъ нѣкоторое время на дно, собираются тамъ въ боль-

шіе шарики; жидкость при этомъ сохраняетъ первоначальный цветъ и прозрачность.

Изъ всѣхъ этихъ фактовъ можно вывести слѣдующія иклю-
ченія:

1) обыкновенный водородъ, въ газообразномъ состояніи или
въ растворѣ въ жидкостяхъ, можетъ выдѣлять нѣкоторые металлы,
каковы—серебро и ртуть, изъ ихъ растворовъ въ кислотахъ.

2) Это дѣйствіе водорода зависитъ отъ давленія газа и отъ
крѣпости металлическаго раствора или, другими словами,—отъ хи-
мической массы возстановляющаго тѣла.

Послѣ опубликованія (1859 г.) этихъ первыхъ изслѣдованій,
Фавръ¹⁾ также обнародовалъ результаты своихъ изслѣдованій
касательно отдѣленія и дѣйствія водорода при высокомъ давленіи;
ссылаясь на мои опыты, онъ говоритъ, что ему удалось при дав-
леніи бо-ти атмосферъ возстановить серебро изъ сѣрнокислого
насыщенаго раствора (онъ бралъ смѣсь кристалловъ соли съ
водой). Этотъ единственный опытъ не противорѣчитъ моимъ выво-
дамъ потому, что возстановленіе серебра зависитъ отъ давленія и
насыщенности раствора; при моихъ опытахъ давленіе никогда
не доходило, и не могло дойти (по количеству цинка), до тѣой
степени, поэтому я и нашелъ возстановленіе только въ разведен-
ныхъ растворахъ, но зато, упогребляя болѣе слабое давленіе, я
могъ замѣтить влияніе густоты раствора; съ другой стороны, изъ
вывода 2-го можно прямо замѣтить, что, увеличивая давленіе,
должно произойти возстановленіе и въ насыщенномъ растворѣ.
Далѣе будуть описаны опыты съ манометромъ, где опредѣляется
minimum давленія, необходимаго для возстановленія раствора сѣро-
кислого серебра извѣстной крѣпости. Теперь же я опишу опытъ,
который весьма наглядно и окончательно подтверждаетъ прежніе
мои выводы. Выбравъ длинную (около 80 см.), запаянную съ
одного конца трубку, я сдѣлалъ въ ней восемь изгибовъ, такъ что
она имѣла одинъ запаянный конецъ и четыре конца, обращен-

¹⁾ С. Р. 1860. 51, стр. 1027.

ныхъ внизъ (см. рис. 2-й на табл.); въ запаянныи конецъ налиль бытъ разведенныи растворъ, въ слѣдующее первое колѣно тотъ же насыщенный растворъ, во второе колѣно также насыщенный растворъ съ кристаллами соли. Этотъ растворъ назначался для очищенія водорода. Въ третье колѣно налита была кислота, и, наконецъ, въ послѣднєе, небольшое, колѣно положено было нѣсколько кусочковъ очищенаго цинка, и затѣмъ трубка была запаяна¹⁾; такимъ образомъ, въ трубкѣ были помѣщены отдѣльно четыре жидкости и цинкъ. При такомъ расположениі, отдѣляющійся водородъ долженъ былъ сначала проходить чрезъ ближайшее къ нему колѣно съ насыщеннымъ растворомъ, гдѣ онъ очищался; потомъ вгорои разъ чрезъ насыщенный растворъ и уже потомъ онъ достигаетъ третьяго, слабаго (и объемъ насыщенаго раствора на 6 частей воды, приблизительно 1 часть соли на 350 частей воды) раствора.

Послѣ двухъ дней дѣйствія замѣчены были слѣдующія измѣненія въ трубкѣ: отъ поверхности слабаго раствора (*a* на рисункѣ) образовался темный осадокъ; вторая жидкость, т. е. насыщенный растворъ, осталась совершенно прозрачною, безъ всякаго измѣненія; третья (насыщенный растворъ)—также не измѣнилась, кромѣ самыхъ кристалловъ, которые слегка погемнѣли. Опытъ продолжался болѣе десяти дней, въ продолженіе которыхъ осадокъ въ слабомъ растворѣ увеличился, а другіе два раствора остались безъ измѣненія.

Этотъ опытъ, какъ я полагаю, вполнѣ подтверждаетъ мои первые выводы, что обыкновенный и чистый водородъ возстановляетъ серебро и что это возстановленіе зависитъ отъ густоты раствора, а потому также и отъ давленія, такъ какъ нельзя сомнѣваться, что при болѣе спѣшномъ давленіи (здѣсь оно не могло быть выше 10-ти атмосферъ) возстановилось бы серебро и изъ

¹⁾ Понятно, что трубка изгибалась по мѣрѣ наливанія различныхъ жидкостей. Это весьма затрудняетъ устройство опыта, но иначе поступить нельзя, потому что жидкости смѣшались бы безъ этой предосторожности.

насыщеннаго раствора; напротивъ того, если бы возстановился и густой растворъ, то можно бы сомнѣваться въ дѣйствіи давленія, а приписать возстановленіе вліянію времени; но въ этомъ случаѣ времени было достаточно, а недоставало только болѣе высокаго давленія. Что же касается до вліянія густоты раствора, то опытъ доказываетъ это до очевидности—въ самомъ дѣлѣ измѣнился самый отдаленный, отъ источника водорода, растворъ, до котораго водородъ доходилъ позднѣе, и при томъ непремѣнно проходилъ предварительно чрезъ два густые раствора, которыхъ онъ однако не измѣнилъ.

Я пробовалъ дѣйствовать на слабый растворъ азотнокислой мѣди подъ сильнымъ давленіемъ (до 40 атмосферъ), но безуспѣшно,—растворъ не измѣнялся. Тогда я попробовалъ дѣйствовать на смѣсь растворовъ серебра и мѣди и при томъ такъ, чтобы мѣди было больше. Такой мѣдно-серебряный растворъ въ первые дни, когда давленіе еще слабое, не измѣняется, но потомъ у поверхности раствора образуется слабое бурое кольцо съ красноватымъ оттенкомъ, отличающееся по виду отъ осадка чистаго серебра. Хотя я дѣлалъ этотъ опытъ два раза и съ одинаковымъ результатомъ, но количество осадка такъ ничтожно, что я не могъ вполнѣ убѣдиться, содержитъ ли онъ металлическую мѣдь. Потому я считаю только вѣроятнымъ, но еще не доказаннымъ, что водородъ возстановляетъ мѣдь въ присутствіи и вмѣстѣ съ серебромъ.

Свинцовые растворы, подверженныя дѣйствію сгущеннаго водорода, дали отрицательный результатъ. Желая, однако, даѣтъ изучить возстановляюще дѣйствіе водорода, я обратился къ другому методу.

§ 2.

Дѣйствіе водорода въ присутствіи платины.


Платина, какъ извѣстно, имѣетъ способность вызывать соединеніе водорода, кислорода и нѣкоторыхъ другихъ газовъ между собою, что отчасти зависитъ отъ сгущенія на ся поверхности

этихъ газовъ¹⁾; поэтому естественно было мнѣ испытать возстановляющее дѣйствіе водорода въ присутствіи платины.

Первый опытъ былъ произведенъ надъ слабымъ растворомъ азотнокислой мѣди (1%) и при томъ такимъ образомъ, чтобы соединить дѣйствіе давленія съ дѣйствіемъ самой платины. Въ небольшую прямую трубочку съ толстыми стѣнками налита была нѣсколько разведенная соляная кислота; надъ ней былъ вставленъ клочекъ ваты, на которую наложено было нѣсколько кусочковъ чистаго цинка; надъ цинкомъ помѣщалась тоненѣкая трубочка съ мѣднымъ растворомъ, куда была опущена платиновая пластинка, предварительно очищенная и прокаленная; трубочка держалась на пробкѣ съ отверстіями для прохода газа (см. рис. 3-й). Цинка было положено—о,55, могущіе лаять при полномъ раствореніи 171 куб. сант. водорода при 0° или 180 сант. при температурѣ 15° — 16° , при которой шель опытъ, емкость свободной части трубы, т. е. не занятой жидкостью, цинкомъ и трубочкой, была равна 1,6 см., следовательно, наибольшее давленіе могло дойти въ трубкѣ до 107 атмосферъ при 0° и до 112 при 15° , но, такъ какъ нѣкоторая часть (хотя незначительная) водорода растворяется въ жидкости, то давленіе должно уменьшиться отъ этого на двѣ или на три атмосферы,—следовательно, можно положить что при полномъ раствореніи цинка оно дойдетъ до 110 атмосферъ.

Цинкъ, дѣйствительно, растворился весь черезъ нѣсколько дней,—следовательно, давленіе было очень значительное; оно было, скорѣе, выше, чѣмъ ниже вычисленного числа, потому что я не вычелъ изъ свободной емкости объема пробки и ваты, такъ что

¹⁾ Хотя эта способность не принадлежитъ одной платинѣ, но есть общая всѣмъ твердымъ тѣламъ, однако въ платинѣ она сильнѣе развита, что очень естественно объясняется большою плотностью этого металла,—следовательно, слой газа, приставший къ поверхности платины, подвергается большему притяженію и долженъ имѣть наибольшую плотность относительно плотности такихъ же слоевъ на другихъ тѣлахъ.



пространство стущенія водорода было нѣсколько менѣе 1,6 с.; наконецъ, и температура была нѣсколько выше принятой для вычислениія 15°¹⁾.

Послѣ растворенія всего цинка въ самой жидкости, т. е. въ мѣдномъ растворѣ, не произошло никакого измѣненія, но на краяхъ платиновой пластинки показался красно-розовый кристаллическій налетъ, который даже простымъ глазомъ, но еще лучше въ лупу, можно было признать за металлическую мѣду. Изъ этого опыта я заключилъ, что въ присутствіи платины водородъ въстановляетъ мѣду, но что на жидкость одинъ водородъ не дѣйствуетъ даже и при такомъ сильномъ давленіи; кромѣ того, этотъ опытъ убѣждаетъ, что давленіе въ 110 атмосферъ, какъ я уже говорилъ, не прекращаетъ растворенія цинка въ хлористоводородной кислотѣ²⁾. Замѣтивъ также вліяніе платины, я поставилъ нагревающуюся нѣсколько трубокъ съ растворами серебра, мѣди и свинца, положилъ въ нихъ платиновыя пластинки и впустилъ чистый водородъ такимъ образомъ, что пластинки на половину погружены были въ растворъ, а на половину выставлялись въ газъ; отогнутые концы были занаяны (см. рис. 4-й). На другой же день въ растворѣ сѣрнокислого серебра, осѣло серебро въ

¹⁾ Легкость, съ которой весь цинкъ растворился, не смотря на давление 110 атмосферъ, показываетъ, между прочимъ, что такое давленіе нѣсколько не останавливаетъ дѣйствія кислоты на цинкъ и что, если есть предѣлъ для растворенія цинка, то онъ гораздо выше, нежели предполагаетъ Бабине. Я, съ своей стороны, никогда не выражалъ по поводу своихъ первыхъ опытовъ, что будто сѣрная кислота при нѣкоторомъ давленіи перестаетъ растворять цинкъ, и потому не знаю, почему Фавръ въ своей статьѣ (C. R. 1028) приписываетъ мнѣ такое мнѣніе. Это тѣмъ болѣе странно, что мои первые опыты и не имѣли въ виду рѣшеніе этого вопроса.

²⁾ Чтобы опредѣлить съ точностью измѣреніемъ заключавшагося въ трубкѣ водорода, я пробовалъ ее открыть (или лучше разбить) въ водѣ, подводя ее подъ большой и толстый цилиндръ, но при этомъ произошелъ страшный взрывъ, разбившій въ дребезги весь цилиндръ, емкость которого была болѣе, чѣмъ въ 1000 разъ емкости всей трубочки. Причина взрыва, вѣроятно, въ малой сжимаемости воды, которая передаетъ давленіе стѣнкамъ почти безъ потери силы.

кристаллахъ на платинѣ, а чрезъ нѣсколько дней я замѣтилъ и осажденіе кристаллической розовой мѣди на платинѣ въ слабомъ растворѣ азотнокислой соли. Растворы свинца (азотнокислый и щелочной окиси свинца въ Ѣдкомъ кали) не показывали признаковъ возстановленія и послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ дѣйствія.

Эти опыты показываютъ, что платина болѣе, чѣмъ давленіе, способствуетъ вытѣсненію нѣкоторыхъ металловъ водородомъ. Если допустить, что давленіе дѣйствуетъ тѣмъ, что увеличиваетъ массу возстановляющаго тѣла, то, вѣроятно, такимъ же путемъ дѣйствуетъ и платина, но, кромѣ того, слѣдуетъ еще допустить и другое условіе, которое способствуетъ разъ начавшемуся возстановленію и ускоряетъ его. Я хочу указать на электролизъ, который происходитъ между платиной и водородомъ, какъ гальванической пары, чрезъ жидкость. Однако, не слѣдуетъ забывать, что условія электролиза сами по себѣ не могутъ еще произвести возстановленія, и, если бы водородъ по своимъ химическимъ свойствамъ не въ состояніи былъ бы возстановлять мѣдь, то не было бы тока, а следовательно,—и электролиза. Въ сущности, всякое возстановленіе одного металла другимъ совершается въ видѣ электролиза: токи же, происходящіе при этомъ, суть только слѣдствіе химического дѣйствія, которому они даютъ только известное (полярное) направленіе. Это доказывается даже предыдущими опытами: свинецъ, несмотря на тѣ же электролитическія условія, т. е. что платина и водородъ и тутъ образуютъ такую же пару, не возстанавливается однако водородомъ. Всѣ эти случаи осажденія металловъ водородомъ при обыкновенной температурѣ показываютъ, что водородъ въ возстановляющемъ ряду занимаетъ мѣсто послѣ свинца и возстанавливается слѣдующіе за нимъ металлы: мѣдь, ртуть, серебро, палладий, золото и платиновые металлы¹⁾.

¹⁾ Я не считалъ необходимымъ дѣлать опыты возстановленія водородомъ растворовъ золота и платиновыхъ металловъ, полагая, что, такъ какъ они вытѣсняются мѣдью, ртутью и серебромъ, то, по всей вѣроятности, будутъ возстанавливаться и водородомъ, и даже легче, чѣмъ предыдущіе. Этотъ пробѣлъ,

§ 3.

Опыты съ манометромъ.

Употребляя давленіе, какъ средство, и убѣдившись въ его вліяніи на возстановленіе, слѣдовало опредѣлить съ иѣкоторою точностью и саму силу давленія; для этого я измѣнилъ прежній мой способъ. Вместо изогнутыхъ трубокъ, я употребляль прямые, одинъ конецъ которыхъ вытягивался въ длинную и тонкую трубку, отогнутую параллельно первой и служащую манометромъ; въ колѣно наливалась ртуть, а манометрическая трубочка раздѣлена на части равной емкости по методу калибриванія термометровъ, передвиганіемъ капельки ртути. Кислота, цинкъ и растворъ, заключенный въ трубочкѣ, отдѣлялись другъ отъ друга ватой и пробкой; между цинкомъ и трубочкой съ растворомъ была насыпана мелкая пемза, смоченная насыщеннымъ растворомъ сѣрнокислого серебра, для очищенія отдѣляющагося водорода. Когда кислота и ртуть были налиты, то замѣчали, на какомъ дѣленіи стоитъ ртуть, и потомъ быстро запаивали тонкій конецъ манометра на послѣднемъ дѣленіи; потомъ уже доканчивали наполненіе главной трубки и запаивали ее (см. рис. 5-й); нѣсколькихъ осторожныхъ постукиваній обыкновенно бывало достаточно, чтобы заставить цинкъ спуститься до кислоты. Зная число дѣленій или, лучше, объемовъ, занимаемыхъ воздухомъ въ манометрѣ до начала опыта, легко было по объему воздуха во время опыта судить о давленіи водорода въ главной трубкѣ. Однако, не смотря на то, что этотъ способъ, при своей простотѣ, даетъ возможность опредѣлить давленіе въ данный моментъ съ достаточнouю точностью,—самое явленіе такого рода, что не допускаетъ большой точности, потому что трудно, или даже невозможно, уловить моментъ, когда начинается дѣйствіе; поэтому отдѣльныя наблюденія не могутъ совпадать одно съ другимъ, а

вишечемъ, недавно пополненъ Бруннеромъ (Pogg. An. 1864, т. 122, стр. 153), который нашелъ, что растворы палладія и платины возстанавливаются водородомъ уже при обыкновенномъ давленіи.

колеблются между нѣкоторыми предѣлами. Съ другой стороны, и самыи способы имѣеть тотъ недостатокъ, что можно только до извѣстной степени управлять отдѣленіемъ газа, опуская постепенно цинкъ, отчего давленіе можетъ легко перейти въ необходиимый для возстановленія minimum; однако, повторяя опытъ и поступая осторожнo при опусканіи цинка, можно значительно уменьшить это неудобство прибора. Конечно, можно было бы устроить какой-нибудь специальный снарядъ для накачиванія газа въ стеклянныя трубки, но, не говоря уже о трудности выполненія и дороговизнѣ такого снаряда, въ этомъ случаѣ онъ врядъ ли бытъ былъ полезенъ, потому что водородъ обладаетъ такою диффузіонною способностью, что врядъ ли какой бы то ни бытъ кранъ способенъ быть бы его удержать при высокомъ давленіи и въ продолженіе многихъ дней; впрочемъ, какъ я уже замѣтилъ, причина неточности не столько въ снарядѣ, сколько въ характерѣ самаго явленія. Такимъ образомъ были сделаны слѣдующіе опыты надъ растворами серебра различной крѣпости.

Опытъ 1-й. Поставлена трубка съ двумя растворами сѣро-кислого серебра, заключенными въ двухъ маленькихъ трубочкахъ—верхняя съ слабымъ (1 часть соли на 350 частей воды), нижняя съ насыщеннымъ (1 часть соли на 50 частей воды), давленіе скоро дошло до 14-ти атмосферъ, и на другой же день замѣчено было въ слабомъ растворѣ осажденіе серебра въ видѣ буро-фиолетового, нѣсколько прозрачнаго налета, какъ всегда бываетъ вначалѣ; въ насыщенномъ растворѣ не произошло возстановленія, хотя опытъ продолжался еще три дня безъ увеличенія давленія.

Опытъ 2-й. Поставлена трубка съ однимъ слабымъ растворомъ,—такимъ же, какъ и въ первомъ опыте. Давленіе было доведено до 6-ти атмосферъ: при этомъ я замѣтилъ дѣйствіе, хотя и очень слабое; да же я не возвышалъ давленія, и опытъ вскорѣ прекратился.

Опытъ 3-й. Трубка съ такимъ же слабымъ растворомъ; давленіе было доведено почти до 5-ти атмосферъ—именно до $4\frac{3}{4}$, но дѣйствія никакого не замѣчено въ теченіе нѣсколькихъ дней.

Сравнивая эти опыты между собою, оказывается, что въ первомъ водородъ отдѣлялся слишкомъ быстро и потому давленіе скоро перешло необходимое для дѣйствія \minim ; второй опытъ показываетъ, что давленія б-ти атмосферъ уже достаточно для дѣйствія водорода на слабый растворъ (1 ч. на 350 ч. воды); наконецъ, послѣдній, своимъ отрицательнымъ результатомъ, показываетъ, что давленія въ $4\frac{3}{4}$ атмосферы еще недостаточно для возстановленія того же раствора. Итакъ, всѣ эти три опыта, не смотря на различіе окончательного давленія и дѣйствія, согласны между собою и приводятъ къ одному общему результату, что возстановленіе слабаго раствора (1 ч. и 350) должно происходить между 5-ю и 6-ю атмосферами. Изъ первого опыта можно еще вывести заключеніе, что давленіе 14-ти атмосферъ еще не достаточно для возстановленія насыщенаго раствора, что еще разъ подтверждается прежній выводъ о влияніи крѣпости раствора на возстановленіе.

Опытъ 4-й. Поставлена трубка съ растворомъ сѣрнокислаго серебра крѣпостью въ 1% (т. е. 1 объемъ насыщенаго раствора, разведенный равнымъ объемомъ воды), слѣдовательно, растворъ былъ въ три съ половиною раза крѣпче раствора первыхъ трехъ опытовъ. На другой день давленіе уже дошло до $20\frac{1}{3}$ атмосферы, такъ какъ воздухъ занимаетъ только 3 дѣленія вмѣсто б1-го, который онъ занималъ до начала отдѣленія водорода; въ трубочкѣ съ растворомъ было замѣчено очень слабое возстановленіе, но, такъ какъ давленіе слишкомъ быстро возрастало, я не могъ наблюдать дѣйствія водорода до окончательного давленія 20-ти атмосферъ, то нельзя сдѣлать никакого положительного заключенія о томъ, при какомъ давленіи началось осажденіе серебра. Можно только заключить, основываясь на прежнихъ опытахъ, что дѣйствіе водорода на растворъ въ 1% должно происходить между 5-ю и 20-ю атмосферами.

Опытъ 5-й. Поставлена трубка съ тремя растворами, заключенными въ трехъ отдѣльныхъ трубочкахъ: въ нижней насыщенный растворъ (1 ч. на 50 ч. воды); въ средней тотъ же растворъ,

разбавленный равнымъ объемомъ воды, т. е. 1 на 100; въ верхней 1/3 часть насыщенного раствора на 3 ч. воды, потомъ 1/3 часть соли на 200 частей воды,—следовательно крѣпости растворовъ относились, какъ 1:2:4. Водородъ очищался, проходя сквозь слой насыщенного раствора сѣрнокислого серебра, длиною въ 4 см. Этотъ растворъ удерживался пробкою съ небольшимъ отверстиемъ, которая не позволяла жидкости проходить насквозь, къ находящемуся подъ нимъ цинку, но свободно пропускала отдѣляющейся снизу водородъ. Воздухъ въ манометрѣ занималъ первоначально 63,5 объема. На другой день воздухъ занималъ 19 дѣленій, т. е. давленіе дошло только до 3,4 атмосферы; ни въ одной трубочкѣ дѣйствія никакого не было; цинкъ былъ еще опущенъ въ кислоту, и давленіе стало быстро возрастать; на слѣдующій день воздухъ занималъ только 2,8 дѣленія, т. е. давленіе дошло почти до 23-хъ атмосферъ (22,7); возстановляющее дѣйствіе обнаружилось во всѣхъ 3-хъ растворахъ.

Давленіе и при этомъ опыту возрастало слишкомъ быстро, и можно заключить изъ него, что давленіе въ 23 атмосферы уже достаточно для возстановленія насыщенного раствора сѣрнокислого серебра, который, впрочемъ, по малой растворимости этой соли, всегда бываетъ слабымъ растворомъ (1 ч. на 50 ч. воды).

§ 4.

Опыты съ углекислотой.

Предыдущія изслѣдованія надъ дѣйствіемъ водорода при различныхъ давленіяхъ показываютъ только одну сторону явленія, т. е. осажденіе металловъ свободнымъ водородомъ, но не показываютъ обратного или дополнительного явленія—прекращенія выдѣленія водорода изъ его соединеній другими металлами. Хотя Бабине и приводилъ нѣсколько опытовъ, при которыхъ прекращалось отдѣленіе водорода цинкомъ и сравнительно при небольшихъ давленіяхъ; но, повидимому, эти опыты не были произведены съ достаточнымъ вниманіемъ, потому что опыты

другихъ ученыхъ и, наконецъ, мой собственныи опытъ, описанный на стр. 73, показываетъ, что при давлении въ 110 атмосферъ раствореніе цинка съ отдѣленіемъ водорода еще возможно. Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ заключать, что не можетъ существовать предѣльнаго давленія для растворенія металловъ такимъ путемъ; но, вѣроятно, для цинка этотъ предѣль еще выше 110 атмосферъ, можетъ быть, при давленияхъ, недоступныхъ изслѣдованію; жалѣзо, никель и подобные имъ металлы, вѣроятно, также подходятъ къ цинку въ этомъ отношеніи; можетъ быть, кадмій имѣетъ низшій предѣль. Вообще говоря, трудно выбрать между металлами такой, котораго химическія свойства позволяли бы надѣяться удачно произвести опытъ прекращенія его растворенія съ отдѣленіемъ водорода и обратный, т. е. осажденіе его водородомъ при извѣстномъ давлени, а для полнаго рѣшенія вопроса о вліяніи давленія необходимо оба случая наблюдать надъ тѣмъ же элементомъ. Потому-то, чтобы показать оба дополнительные или противоположные случаи вліянія давленія для однихъ и тѣхъ же дѣйствующихъ веществъ, я выбралъ для своихъ изслѣдованій углекислоту и ея соли; тѣмъ болѣе, что были сдѣланы кое-какие опыты, хотя не точные, надъ разложеніемъ углекислой извести кремнеземомъ при высокой температурѣ въ закрытомъ сосудѣ.

Съ одной стороны, я, заставляя дѣйствовать углекислоту на средній растворъ уксуснокислой извести при различныхъ давленияхъ, въ запаянныхъ трубкахъ, а съ другой стороны, я дѣйствовалъ уксусной кислотой въ избыткѣ на углекислую изесть; кислота была настолько разведена, чтобы образовавшаяся соль даже при полномъ раствореніи углекислой извести оставалась бы въ растворѣ и не могла своею кристаллизациею остановить дѣйствие кислоты. Первые же опыты показали мнѣ, что при нѣкоторомъ давлениі углекислый газъ производить въ растворѣ уксусной извести осадокъ углекислой соли; а раствореніе мрамора, который я постоянно употреблялъ при своихъ опытахъ, въ свою очередь, при нѣкоторомъ давлениі прекращается, несмотря на избы-

токъ кислоты. Опыты съ манометромъ были произведены совершенно тѣмъ же способомъ, какой былъ употребленъ для водорода и описанъ на страницѣ 75; растворы уксуснокислой извести и другихъ солей также помѣщались въ маленькихъ трубочкахъ, цинкъ замѣнялся мраморомъ; а для отдѣленія углекислоты я бралъ соляную кислоту средней крѣпости. Сдѣлавши предварительно два опыта безъ манометра для изученія дѣйствія углекислого газа на уксуснокислую извѣстъ—одинъ съ растворомъ почти насыщеннымъ, а другой съ растворомъ, содержащимъ 12% соли, я въ обоихъ случаяхъ замѣтилъ чрезъ нѣсколько дней появленіе кристаллическаго осадка, который оказался углекислою извѣстью. Тогда я произвелъ уже рядъ опытовъ съ манометромъ, употребляя по преимуществу растворъ въ 12%.

Опытъ 1-й. Растворъ 12%. Давленіе, возраставшее медленно, дошло до 13 атмосферъ (т. е. 12 атмосферъ для одной углекислоты), дѣйствія никакого не замѣчено, не смотря на то, что давленіе это поддерживалось два дня; потомъ мраморъ былъ далѣе опущенъ; давленіе дошло до 15,5 (14,5 для CO_2), но дѣйствія еще нѣтъ,—тогда давленіе еще разъ увеличено; на другой день давленіе дошло до 28,5 (27,5), и дѣйствіе оказалось. Слѣдовательно, изъ этого опыта можно уже заключить, что осажденіе углекислой извести происходило между давленіемъ углекислоты отъ 14,5 до 27,5.

Опытъ 2-й. Растворъ такой же крѣпости. Давленіе быстро дошло до 25 (24) атмосф., при которомъ уже былъ замѣченъ осадокъ; потому давленіе не было усилено опусканіемъ мрамора; на другой день, послѣ того какъ было замѣчено первое осажденіе, давленіе, къ моему удивленію, понизилось до $21\frac{1}{3}$ ($20\frac{1}{3}$) атмосферы; но осадокъ увеличился—трубка была оставлена запаянною еще на нѣсколько дней, но давленіе уже болѣе не измѣнялось, поэтому, я думаю, можно заключить изъ этого опыта, что давленіе въ 20 атмосферъ уже достаточно для дѣйствія углекислоты на растворъ уксуснокислой извести, хотя я и замѣтилъ появленіе осадка только при 24 атмосферахъ.

Опытъ 3-й. Растворъ почти насыщенный; давленіе возвратилось быстро; на другой день оно уже дошло до 38 (37) атмосферъ, и образовался очень сильный осадокъ; но нѣтъ сомнѣнія, что дѣйствіе началось раньше.

Опытъ 4-й. Такой же растворъ, какъ и въ предыдущемъ опыты,—давленіе шло такъ же быстро; но при 29,5 (28,5) я уже могъ замѣтить образованіе осадка.

Опытъ 5-й. Растворъ разведенной, но неопредѣленной крѣпости, нѣсколько слабѣе растворовъ двухъ первыхъ опытовъ. Давленіе дошло сначала до 22 (21) атмосферъ и оставалось нѣкоторое время на этой точкѣ, осадка не было еще замѣчено; потомъ давленіе было увеличено и достигло 27 (26), но и тогда я не могъ еще замѣтить никакой перемѣны въ растворѣ; наконецъ, когда давленіе потомъ уже быстро дошло до 36 (35) атмосферъ, появился сильный осадокъ, слѣдовательно, онъ образовался между 26 и 35, такъ какъ промежуточные давленія не были наблюдаемы.

Образовавшіеся въ этихъ опытахъ осадки были мною разсмотрѣны подъ микроскопомъ. Они представляли сферическія скопленія лучистыхъ кристалловъ; осадокъ легко растворяется съ отдѣленіемъ углекислоты въ уксусной и другихъ кислотахъ.

Хотя образованіе осадка углекислой известки при всѣхъ этихъ опытахъ и не было наблюдаемо при одномъ и томъ же давленіи (27, 20, 37, 28 и 35), однако всѣ дали согласные результаты и показываютъ, что ниже 14 атмосферъ этого осадокъ не появляется. Изъ сравненія первыхъ двухъ опытовъ, которые относятся къ растворамъ одинаковой крѣпости, можно заключить, что образованіе осадка происходитъ между 14,5 и 26 атмосферами и даже, судя по пониженію давленія во второмъ опыты, можно допустить, что оно происходитъ между 14,5 и $20\frac{1}{3}$,— слѣдовательно, среднее давленіе, ближайшее къ истинѣ, будетъ равно почти 17,5 атмосферы. Что же касается до вліянія густоты растворовъ, то изъ этихъ опытовъ почти ничего нельзѧ заключать обѣ этомъ, потому что при 3-мъ и 4-мъ опытахъ съ насы-

щеннымъ растворами давлениe увеличивалось слишкомъ быстро, и замѣченное меньшее давлениe 28,5 нельзя считать за необходимое *minimum*; можно только заключить, что и насыщенный растворъ также разлагается углекислотой. Послѣдній опытъ приводить къ странному результату, что растворъ, болѣе слабый (чѣмъ въ первыхъ двухъ опытахъ), требуетъ высшаго давления для образованія осадка, именно, между 26 и 35 (средн. 30,5), однако, если обратить вниманіе на свойства углекислоты и ея соединеній съ известіемъ, то обстоятельство это, я думаю, легко объяснить и его можно было предвидѣть.

Дѣйствительно, углекислота легче растворяется въ водѣ, чѣмъ въ соляныхъ растворахъ, следовательно, при томъ же давлении, ея было болѣе въ растворѣ слабой соли, отъ чего нѣкоторая часть уже образавшейся углекислой извести оставалась въ растворѣ въ видѣ двууглекислой соли и осадокъ могъ появиться только тогда, когда количество углекислой соли дошло до предѣла растворимости въ углекислой; во всякомъ случаѣ, количество углекислоты въ слабомъ растворѣ должно быть больше относительно образующейся углекислой соли и можетъ поэтому до извѣстной степени замедлять появление осадка средней углекислой соли. Вообще говоря, при дѣйствіи углекислоты на растворы углекислой извести, влияніе густоты раствора скрывается другимъ условіемъ, дѣйствующимъ въ противоположную сторону, и можно наблюдать только разницу дѣйствія этихъ двухъ условій—хотя разжиженіе, какъ и въ случаѣ дѣйствія водорода на растворъ серебра, можетъ способствовать разложенію уксуснокислой соли; но, съ другой стороны, оно также способствуетъ образованію двууглекислой соли и, следовательно, мѣшаетъ образованію осадка; такъ что въ очень слабыхъ растворахъ, вѣроятно, ни при какомъ давлении не будетъ происходить осадка (я сначала даже думалъ, что возможность образованія двууглекислыхъ соединеній помѣшаетъ моимъ наблюденіямъ, и потому прямо началь съ растворовъ, довольно крѣпкихъ), а, наоборотъ, крѣпкій, особенно насыщенный растворъ, вѣроятно, представ-

ляеть большее сопротивление разлагающему действию углекислоты, но за то мало растворяетъ углекислоты и тѣмъ способствуетъ осажденію разъ образавшейся углекислой соли, поэтому очень легко можетъ произойти, что въ крѣпкомъ растворѣ осажденіе произойдетъ при низшемъ давлениі, чѣмъ въ разведенномъ, какъ и было при моихъ опытахъ.

Для повѣрки предыдущихъ опытовъ, я поставилъ растворъ углекислой извести въ 12⁰/₀ съ углекислой при обыкновенномъ давлениі также въ запаянной трубкѣ и оставилъ его надолго; но и послѣ 8 мѣсяцевъ прикосновенія раствора съ чистой углекислой (я въ томъ убѣдился, открыть потомъ трубку въ растворѣ Ѣдкаго кали—газъ окончательно весь поглотился) никакой муты и осадка въ немъ не образовалось.

Убѣдившись во вліяніи давлениі или, лучше, густоты углекислоты на разложеніе уксуснокислой извести, я произвелъ также съ манометромъ обратный опытъ, т. е. заставилъ дѣйствовать уксусную кислоту на углекислую извѣстъ, чтобы определить, при какомъ давлениі это дѣйствие прекращается. Приборъ былъ устроенъ такимъ же образомъ, какъ и въ предыдущихъ опытахъ: уксусная кислота была взята въ избыткѣ относительно мрамора и при томъ она настолько была разведена водою, чтобы, въ случаѣ даже полнаго растворенія, не могъ образоваться насыщенный растворъ, иначе сама кристаллизація уксусной извести могла остановить дальнѣйшее дѣйствіе уксусной кислоты. Запаявъ трубку, я стряхнулъ въ кислоту весь наложенный мраморъ и оставилъ трубку надолго, взбалтывая ее по временамъ, насколько это позволяла ртуть въ манометрѣ; чрезъ нѣсколько дней давленіе дошло до 17,7 атмосферы (давленіе одной углекислоты 16³/₄); слѣдующіе дни давленіе не увеличивалось, и хотя мрамора оставалось еще много (судя по виду,— болѣе половины), но онъ болѣе уже не растворялся во все продолженіе опыта, длившагося болѣе 8 мѣсяцевъ.

Итакъ, не было никакого сомнѣнія, что при густотѣ углекислоты, соотвѣтствующей 17 атмосферамъ давлениія, дѣйствіе

ся и уксусной кислоты уравновѣщаются. Сравнивая результатъ этого опыта съ результатами первыхъ двухъ, мы видимъ большое согласіе: тамъ осажденіе происходитъ при среднемъ давлениі $17\frac{1}{2}$ атмосферы (или 19, если принять тахітум давленія 2-го опыта 24), здѣсь раствореніе прекращается при $16\frac{3}{4}$; болѣе близкихъ результатовъ врядъ ли можно ожидать не только потому, что наблюденія неодинаково вѣрны, т. е. что въ первомъ случаѣ нельзя съ точностью замѣтить моментъ появленія осадка, а въ послѣднемъ случаѣ сама реакція останавливается вмѣстѣ съ давленіемъ, которое нужно замѣтить; но еще и потому, что химическія дѣйствія, хотя между одними и тѣми же соединеніями, однако происходятъ не совершенно при одинаковыхъ условіяхъ.

Подобные опыты я производилъ и съ нѣкоторыми другими растворами. Такъ, слабый и совершенно нейтральный растворъ хлористаго кальція я помѣстилъ въ прямую и толстую трубку безъ манометра, имѣя въ виду довести давленіе до предѣла сжимаемости углекислоты, но дѣйствія никакого я не замѣтилъ, хотя и образовался на поверхности кислой жидкости подвижный и прозрачный слой жидкой углекислоты (давленіе, сѣдовательно, должно было дойти до 44—45 атмосферъ, такъ какъ температура была 17° С.). Растворъ уксуснокислого барита въ трубкѣ съ манометромъ не помогалъ при давлениі 30 атмосферъ, растворъ хлористаго барія подвергался съ такимъ же малымъ успѣхомъ давленію 40 атмосферъ. Для моей цѣли достаточно было и одного полнаго случая, и потому далѣе этихъ опытовъ я не продолжалъ, тѣмъ болѣе что производство ихъ требуетъ чрезвычайно много времени.

Во всякомъ случаѣ, изслѣдованія эти надъ углекислотою вполнѣ подтверждаютъ заключенія, которыя я прежде вывелъ изъ опытовъ съ водородомъ, т. е. что химическое дѣйствіе газовъ зависитъ отъ давлениія и, смогря по величинѣ давлениія, можетъ даже совершаться въ обратномъ направленіи, какъ это яствуетъ изъ реакцій углекислоты; вѣроятно, и для водорода, какъ я уже

замѣтилъ, тоже могутъ представиться два случая. Что же касается до того, какъ дѣйствуетъ давленіе въ описанныхъ мною явленіяхъ: имѣеть ли оно непосредственное вліяніе, или оно дѣйствуетъ только какъ средство увеличенія массы газовъ, то для разсмотрѣнныхъ здѣсь случаевъ и вообще при всякомъ дѣйствіи газа на растворъ (или, пожалуй, на поверхность твердыхъ тѣлъ) этотъ вопросъ не имѣеть практическаго значенія, потому что нельзя увеличить давленія на газъ (при постоянной температурѣ), не сгущая его и не увеличивая настолько же его массу въ данномъ пространствѣ; слѣдовательно, сказать, что дѣйствіе газа пропорціонально давленію или массѣ,—въ этомъ случаѣ все равно и выражаетъ одинъ и тотъ же фактъ.

Для того, чтобы наблюдать дѣйствіе давленія (т. е. сближенія частицъ) безъ относительного увеличенія дѣйствующихъ другъ на друга массъ, нужно взять смѣсь двухъ газовъ, напр.: кислорода съ водородомъ, хлора съ водородомъ и др. и пробовать ихъ скимать; но такихъ случаевъ очень мало, и легко попасть на такую пару газовъ, которые и при очень большихъ, доступныхъ для наблюденія давленіяхъ не будутъ между собою соединяться, какъ это, напр., уже было замѣчено для смѣси водорода съ кислородомъ; но было бы, по моему мнѣнію, совершенно ошибочно заключить изъ подобнаго отрицательного случая, что давленіе, т. е. *сближеніе* частицъ, не способствуетъ химическому соединенію газовъ, точно также, какъ было бы не основательно отвергнуть вліяніе теплоты на томъ основаніи, что азотъ и водородъ ни при какой температурѣ не соединяются. Для тѣхъ случаевъ, гдѣ не оба дѣйствующія тѣла газообразны, какъ въ описанныхъ мною явленіяхъ, вліяніе давленія можно истолковывать различно: или что углекислого и водорода дѣйствуютъ сильнѣе вслѣдствіе сближенія своихъ частицъ съ частицами растворенной соли, т. е. вслѣдствіе *непосредственнаго вліянія давленія*, или что они дѣйствуютъ сообразно закону *Берталле* отъ того, что на каждую частицу соли дѣйствуетъ большее число частицъ газа, т. е. отъ увеличенія массы, или, наконецъ, что самое вѣроятное, оба эти

обстоятельства имѣютъ вліяніе; и, дѣйствительно, можемъ ли мы допустить, чтобы дѣйствіе частицъ другъ на друга не зависѣло отъ ихъ взаимнаго разстоянія, если допускаемъ зависимость этого дѣйствія отъ числа частицъ; а такъ какъ въ случаѣ увеличенія плотности газа въ одно и то же время и уменьшается разстояніе его частицъ отъ частицъ соли и увеличивается число дѣйствующихъ частицъ, то очевидно, что оба эти условія оказываютъ свою долю вліянія, т. е. что и давленіе одно, само по себѣ, независимо отъ сопровождающаго его увеличенія массы, имѣеть вліяніе на химическія реакціи. Слѣдуетъ также обратить вниманіе на то, что, напр., углекислота для соединенія съ известью должна быть сгущена, слѣдовательно, давленіе во всякомъ случаѣ должно способствовать этому соединенію¹⁾; съ другой стороны, при разложеніи углекислой соли, также углекислота должна принять газообразную форму, слѣдовательно, давленіе, дѣйствуя въ ту же сторону, какъ и химическое притяженіе ея къ извести, должно задерживать разложеніе этой соли.

§ 5.

Возстановляющее дѣйствіе паровъ цинка.

Извѣстно, въ какой степени возстановляющее свойство водорода возрастаетъ съ температурой; можно было думать, что и цинкъ, который уже при обыкновенной температурѣ вытѣсняетъ столько элементовъ, при высшей будеТЬ выдѣлять еще большее число ихъ,—потому я сдѣлалъ нѣсколько изслѣдований въ этомъ направленіи. Для первого опыта я избралъ соединенія барія, принадлежащаго, какъ извѣстно, къ группѣ металловъ, трудно возстановляемыхъ, и началъ именно съ него, какъ съ металла, кото-

1) Время прикосновенія газовъ не играетъ большой роли, какъ думаетъ Бертело, говоря о реакціяхъ подъ высокимъ давленіемъ, иначе углекислота, находясь въ присутствіи углекислой извести въ продолженіе 8 мѣсяцевъ, должна бы была подействовать (опытъ стр. 83).

рый, по моимъ соображеніямъ, изъ трехъ (*Ca, Sr, Ba*) долженъ быть легче восстановляться. Прокаленный хлористый барій, насыпанный въ фарфоровую лодку, былъ введенъ въ такую же трубку, позади этой лодочки были поставлены еще двѣ съ пергнаннымъ цинкомъ; съ этой же стороны впускалась струя тщательно осушенного и очищенного водорода; изъ противоположной стороны выходила широкая загнутая стеклянная трубка, погружавшаяся немного въ воду. Фарфоровая трубка была помѣщена въ печь и накаливалась во время опыта до-бѣла; такимъ образомъ, горючие пары цинка, уносимые водородомъ, приходили въ соприкосновеніе съ расплавленнымъ хлористымъ баріемъ. Къ концу опыта въ стеклянной выводной трубкѣ собрался бѣлый налетъ, растворимый въ водѣ и дающій реакціи хлористаго цинка; въ водѣ, чрезъ которую выходилъ изъ снаряда водородъ, были едва замѣтны слѣды соляной кислоты. Хлористый барій въ лодочкѣ потемнѣлъ на поверхности и отчасти въ самой массѣ, по опусканіи въ воду темный слой быстро превратился въ бѣлый съ отдѣленiemъ газа (вѣроятно, водорода, судя по характерному запаху, всегда сопровождающему неочищенный водородъ), вода при этомъ приняла сильно щелочную реакцію. Этотъ опытъ, хотя произведенный и въ небольшомъ видѣ, почти не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что пары цинка при высокой температурѣ могутъ восстанавливать барій изъ его хлористаго соединенія. Въ большомъ видѣ опытъ этотъ мнѣ не удался, потому что тогда въ снарядѣ попадали или даже въ немъ образовались пары воды, которые тотчасъ окисляютъ восстановленный барій¹⁾; трубку для этого я могъ только взять глиняную, и, хотя она была обложена жѣлезнымъ листомъ, но все-таки чрезъ ся

¹⁾ И, дѣйствительно, я нашелъ на хлористомъ баріи послѣ опыта цѣлый слой окиси, которая врядъ ли могла образоваться дѣйствиемъ паровъ воды прямо на *BaCl*, такъ какъ, во всякомъ случаѣ, этихъ паровъ не могло быть много; и, вѣроятно, что они дѣйствовали на самый восстановленный барій, такъ легко отъ воды окисляющейся.

пористыя стѣнки легко проходилъ изнутри водородъ, а снаружи кислородъ воздуха и, такимъ образомъ, водяные пары могли образоваться въ самой трубкѣ. Не имѣя, такимъ образомъ, возможности произвести восстановленіе барія въ сколько-нибудь большомъ видѣ, по трудности самой реакціи и по необыкновенной окисляемости барія, я попробовалъ восстановляюще дѣйствіе паровъ цинка на соединеніи другого элемента, именно: на хлористомъ кремніи. Этотъ элементъ, какъ извѣстно, также принадлежитъ къ трудно-восстанавляемымъ, и до этого времени его могли выдѣлять только щелочными металлами (*K, Na*) и глиніемъ. Опытъ былъ устроенъ почти такъ же, какъ и съ хлористымъ баріемъ, съ тою разницею, что хлористый кремній помѣщался въ тубулатной ретортѣ, конецъ которой входилъ въ фарфоровую трубку, а въ горло была вставлена трубочка, приводящая сухой водородъ; въ фарфоровой трубкѣ помѣщалось нѣсколько лодочекъ съ цинкомъ; слѣдовательно, водородъ, насыщенный парами хлористаго кремнія, входилъ въ раскаленную фарфоровую трубку, где смѣшивался съ парами цинка. Возстановленіе совершилось очень легко, образовалось сравнительно большее количество хлористаго цинка, а внутреннія стѣнки фарфоровой трубки, особенно лодочки, заключавшія цинкъ, обросли блестящими и длинными кристаллами графитообразнаго кремнія, въ концѣ же фарфоровой трубки собрался цинкъ, проросшій довольно широкими кристаллами кремнія; при раствореніи этого куска цинка въ соляной кислотѣ, онъ оставилъ, кроме крупныхъ кристалловъ, кристаллическій порошокъ. Этотъ опытъ я повторялъ безъ водорода: реторта съ хлористымъ кремніемъ соединялась съ фарфоровою трубкою и нагревалась до кипѣнія жидкости; дѣйствіе было совершенно одинаковое, изъ чего можно было заключить, что водородъ не участвуетъ въ восстановленіи кремнія; третій разъ я бралъ вмѣсто цинка сплавъ этого металла съ оловомъ, которое могло бы служить растворяющимъ средствомъ для кремнія и, дѣйствительно, при этомъ въ лодочекѣ остался королекъ олова, проросшій кристаллами кремнія въ 5 міл. длины.

Вместо хлористаго кремнія, который приготавляется съ большими хлопотами, я пробовалъ пропускать на пары цинка фтористый кремній, но это соединеніе нисколько не разлагалось при этомъ; напротивъ того, фтористый боръ показалъ слѣды возстановленія: по крайней мѣрѣ, я могъ собрать изъ трубы послѣ опыта нѣсколько почти микроскопическихъ листоватыхъ и блестящихъ кристалловъ, которые походили на описанный Девиллемъ графитообразный боръ, но, однако, я не могу утверждительно сказать, основываясь на этомъ единственномъ опыте, о возможности возстановить боръ цинкомъ изъ фтористаго соединенія. Наконецъ, я пробовалъ нѣсколько разъ дѣйствіе паровъ цинка на хлористый глиній, съ водородомъ и безъ водорода, но совершенно безуспѣшно: хлористый глиній перегоняется, безъ всякаго измѣненія, на другой, болѣе холодный, конецъ трубы. Я не думалъ найти такое рѣзкое различіе между двумя элементами—кремніемъ и глиніемъ, которые я, повидимому, ошибочно считалъ близкими, полагая, что кремній составляєтъ переходъ отъ группы углерода, кремнія къ группѣ металловъ земель.

§ 6.

Возстановленіе барія и калія глиніемъ.

Довольно замѣчательно отношеніе глинія къ соединеніямъ барія; убѣдившись, что цинкъ возстанавливаетъ барій изъ его хлористаго соединенія, но не дѣйствуетъ на хлористый глиній, можно было подумать, что глиній въ свою очередь, и, можетъ быть, еще съ большою легкостью возстановить барій. Для опыта я взялъ прокаленный, истертый въ порошокъ хлористый барій и положилъ его съ кусками глинія въ угленой тигель; наполненный такимъ образомъ тигель помѣщенъ былъ для защиты отъ окисленія въ другой глиняный и обсыпанъ порошкомъ угля; потомъ все это накаливалось въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Въ остывшемъ тиглѣ я нашелъ сплавленный металлический королекъ, который оказался чистымъ не измѣнившимся глиніемъ, безъ вся-

кой примѣси барія. Итакъ, очевидно, что глиній не разлагаетъ хлористаго барія. По особеннымъ соображеніямъ, которыя будуть развиты во второй части этой статьи, я, однако, былъ убѣжденъ, что глиній, если не возстановляетъ барія изъ его хлористаго и, вѣроятно, также бромистаго и іодистаго, то будетъ возстановлять его изъ кислороднаго соединенія, т. е. изъ окиси. Чтобы убѣдиться въ этомъ опытомъ я взялъ безводную окись барія и, прибавивъ къ ней нѣкоторое количество хлористаго барія, какъ плавня, положилъ эту смѣсь вмѣстѣ съ кусками глинія въ угленой тигель и такимъ же образомъ накаливалъ его нѣсколько часовъ. По охлажденіи тигля я нашелъ въ немъ металлическій сплавъ уже совсѣмъ другого вида и физическихъ свойствъ, нежели глиній. Этотъ сплавъ имѣетъ крупно-кристаллическое строеніе, очень хрупокъ, свѣжій изломъ имѣетъ слабый желтоватый отблескъ; анализъ показалъ, что онъ состоитъ на 100 частей изъ 33,3 барія и 66,7 глинія, или иначе, на 1 часть барія содержитъ 2 части глинія; химическія его свойства соотвѣтствуютъ его составу: онъ легко разлагаетъ воду уже при обыкновенной температурѣ, отдавая водородъ, при чемъ образуется бѣлый студенистый осадокъ, но вода не дѣлается щелочною—это я объясняю тѣмъ, что барій и глиній окисляются одновременно и окиси ихъ соединяются, по мѣрѣ образованія, въ нерастворимый осадокъ. Такимъ же образомъ я дѣйствовалъ глиніемъ на хлоро-окись кальція, но сплавленный послѣ реакціи металъ не показалъ и слѣдовъ кальція.

Какъ легко возстановляется барій глиніемъ, такъ же легко въ свою очередь и глиній возстановляется магніемъ изъ своего фтористаго соединенія (изъ кріолита, искусственно мною приготовленнаго), въ чёмъ я также убѣдился особеннымъ опытомъ.

Если глиній возстановляетъ барій изъ окиси, то можно было ожидать и подобнаго его дѣйствія на окись калія: я произвелъ опытъ въ изогнутомъ ружейномъ стволѣ, въ закрытый конецъ котораго были положены куски Ѣдкаго калія и глинія; при довольно высокой температурѣ показались пары калія, большая

часть которыхъ сгущалась въ холодной части ствола, изъ которой я добылъ нѣсколько кусочковъ мягкаго металла, плавающаго на водѣ и горяющаго фіолетовымъ пламенемъ, имѣющаго, однимъ словомъ, всѣхъ характерныхъ свойствъ чистаго металлическаго калия. Въ большомъ видѣ я этого опыта не повторялъ, а, можетъ быть, онъ окажется удобнымъ для практики, такъ какъ цѣна глинія не высока, а возстановленіе идетъ, повидимому, гораздо легче и при низшей температурѣ, чѣмъ возстановленіе калия желеzомъ.

II. Теорія явленій вигъясненія.

Химіческія дѣйствія, проявляясь межу малѣйшими частицами тѣлъ, должны быть въ совершенной зависимости отъ массы и взаимнаго разстоянія этихъ частицъ, т. е., вообще говоря, отъ внутренняго строенія матеріи, которое по преимуществу и опредѣляетъ химіческій характеръ даннаго элемента; съ другой стороны—и виѣшнія физическія условія, измѣняя эти отношенія частицъ, могутъ измѣнить въ то же время и химическое ихъ дѣйствіе.

Такимъ образомъ, химіческія явленія, какъ и многія другія, находятся въ зависимости отъ внутреннихъ и виѣшніхъ условій. Вліяніе первыхъ обнаруживается по преимуществу тѣмъ, что называются вообще химіческимъ сродствомъ, физическія же условія составляютъ другой факторъ. Поэтому не совсѣмъ вѣрно выраженіе, употребленное Бунзеномъ, что химическое сродство есть функция физическихъ условій—это два отдельныхъ фактора, изъ которыхъ первый имѣть даже несравненно большее вліяніе на ходъ реакціи. Я не хочу этимъ сказать, что слѣдуетъ принимать какую-то особенную силу химического сродства. Врядъ ли, даже большинство ученыхъ понимаетъ такимъ образомъ это выраженіе. Сродствомъ выражаются только тѣ особенные химіческія свойства, которые въ извѣстной степени независимы отъ виѣшніхъ условій и вместе съ ними опредѣляютъ направленіе химического дѣйствія.

Явленія замѣщенія или вытѣсненія даютъ удобный случай изучить вліяніе упомянутыхъ мною условій на химіческія реакціи, и особенно вліяніе внутренняго строенія элементовъ, на которое я по преимуществу и обращаю вниманіе.

§ 1.

Вліяніе удѣльного вѣса.

Рассматривая ближе случаи вытѣсненія одного элемента другимъ, невольно, можно сказать, поражающеся однимъ, почти постояннымъ, условиемъ реакціи—именно тѣмъ, что легчайшее тѣло (т. е. менѣе плотное) вытѣсняетъ тяжелѣйшее¹⁾. Изъ этого можно заключить, что удѣльный вѣсъ элементовъ есть главное условіе или свойство, опредѣляющее направление реакціи.

Если припомнить, что было сказано въ началѣ, т. е. что химическія явленія, происходя между малѣйшими частицами, должны зависѣть отъ вѣса и разстоянія этихъ частичекъ, то вліяніе удѣльного вѣса на выдѣленіе одного элемента другимъ объясняется само собою—оно есть прямое слѣдствіе высказанного положенія.

Дѣйствительно, огъ чего происходитъ и что выражаетъ удѣльный вѣсъ, какъ не вѣсъ и число частицъ (или разстояніе), образующихъ своимъ скопленіемъ въ данномъ объемѣ извѣстную матерію. Эти три величины—вѣсъ частицъ, разстояніе (или число частицъ въ единицѣ объема) и удѣльный вѣсъ—связаны между собою простою математическою зависимостью: зная двѣ изъ нихъ всегда можно опредѣлить третью. Если обозначить: удѣльный вѣсъ— δ ; вѣсъ частицы (или эквивалента для сходныхъ тѣлъ)— e ; число частицъ въ единицѣ объема— n ; разстояніе— r ; то выраженіе удѣльного вѣса будетъ: $\delta = e \cdot n$, но, такъ какъ $n = \frac{1}{r^3}$, то будетъ $\delta = \frac{e}{r^3}$, т. е. удѣльный вѣсъ прямо пропорционаленъ вѣсу частицъ и обратно-пропорционаленъ кубу

¹⁾ Понятно, что это относится къ случаямъ, гдѣ оба элемента могутъ находиться въ сходныхъ физическихъ условіяхъ, напр.: при такой температурѣ, при которой быть большого различія въ летучести тѣлъ.

Такія условія, впрочемъ, бываютъ въ большей части реакцій мокрымъ путемъ,—ихъ я здѣсь и имѣлъ болѣе въ виду.

разстоянія, $r = \sqrt[3]{\frac{e}{\delta}}$; но $\frac{e}{\delta} = v$ (относительному объему эквивалентовъ, часто употребляемыхъ въ наукѣ), и потому $r = \sqrt[3]{v}$.

Удѣльный вѣсъ тѣль, опредѣляясь вѣсомъ и числомъ частицъ въ извѣстномъ объемѣ, не выражаетъ однако вполнѣ механическаго строенія тѣль, потому что при томъ же числѣ (въ единицѣ объема) и вѣсѣ частицы могутъ быть различно расположены, и это расположение должно, въ свою очередь, также оказывать влияніе на направление химической реакціи; но, тогда какъ непосредственное наблюденіе даетъ намъ возможность опредѣлить относительный вѣсъ частицъ и относительное ихъ число въ единицѣ объема, оно намъ не даетъ никакихъ прямыхъ указаний на расположение этихъ частицъ. Неопределенность этой третьей данной въ нашей задачѣ—показать и уяснить отношеніе строенія элементовъ къ ихъ химическимъ свойствамъ—могла бы затруднить, или даже сдѣлать невозможнымъ, сколько-нибудь удовлетворительное решеніе этой задачи, если бы нельзя было съ большою вѣроятностью допустить, что въ элементахъ, играющихъ одну и ту же химическую роль, расположение частицъ приблизительно одинаково и что различіе ихъ зависитъ преимущественно отъ вѣса и числа частицъ. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что однородные элементы, напр., металлы, часто отличаются между собою этими двумя свойствами гораздо болѣе, нежели два элемента изъ двухъ совершенно различныхъ группъ, напр.: калий и хлоръ въ этомъ отношеніи болѣе сходны, чѣмъ калий и натрій, магний и цинкъ; въ первомъ случаѣ мы можемъ допустить различіе въ расположении частицъ, тогда какъ во второмъ только и остаются сходство и аналогія въ расположениіи частицъ,—иначе придется допустить, что, не смотря на ближайшую аналогію химическихъ и даже физическихъ свойствъ между магниемъ и цинкомъ, нѣть никакой аналогіи въ ихъ строеніи,—что, очевидно, невозможно.—Съ другой стороны, въ элементахъ очень близкихъ, принадлежащихъ къ одной естественной группѣ, напр.: *Cl*, *Br* и *I* или *Mn*, *Fe* и *Co*, сходство строенія идетъ, повидимому, еще далѣе, и они въ этомъ

отношений отличаются между собою только въсомъ частицъ или эквивалентовъ при одинаковомъ ихъ числѣ въ единицѣ объема, или—что то же—при одинаковомъ разстояніи этихъ частицъ; аналогія же между этими элементами такъ велика, что, вѣроятно, ни одинъ химикъ не предположитъ въ нихъ различія въ расположениіи частицъ.

Наконецъ, нѣкоторая аналогія рядовъ сходныхъ элементовъ съ рядами гомологовъ въ углеродистыхъ соединеніяхъ также приводитъ насъ къ тому, чтобы искать различія между ними скорѣе въ вѣсѣ и числѣ частицъ, чѣмъ въ ихъ расположениіи.

Допустивши сходство или даже одинаковость расположенія частицъ у однородныхъ элементовъ, вліяніе этого условія, одинакового для всѣхъ, устраняется само собою, при разсмотрѣніи вліянія строенія элементовъ на ихъ взаимное вытѣсненіе; этимъ также объясняется, почему удѣльный вѣсъ можетъ выражать различіе строенія тѣлъ и находится въ такой тѣсной связи съ химическими свойствами элементовъ.

Естественно, что правило вытѣсненія относится только къ элементамъ, принадлежащимъ къ одной и той же химической группѣ, уже потому, что только такие элементы вытѣсняютъ другъ друга и вообще производятъ аналогичнія химическія дѣйствія, которыя только и можно сравнивать между собою. Такъ, это правило можетъ быть примѣнено къ цѣлой группѣ настоящихъ металловъ¹⁾, группѣ галоидовъ, группѣ амфидныхъ тѣлъ и т. п.

Разсмотримъ ближе примѣнность этого правила къ металламъ. Осажденіе металловъ изъ ихъ растворовъ было преимущественно изслѣдовано бреславскимъ профессоромъ Фишеромъ²⁾;

1) Этимъ выражениемъ я хотѣлъ указать на то, что устраяю такие металлическіе элементы, которые не имѣютъ рѣзкаго химического характера, каковы: молибденъ, вольфрамъ, титанъ, tantalъ и др., которые еще Берцеліусъ называлъ электро-отрицательными металлами и которые вообще составляютъ переходъ къ различнымъ группамъ металлоидовъ или должны составить свои самостоятельные группы.

2) Pogg. Ann. Томы—4, 6, 8 и 9 въ 1825, 26 и 27 г.г.

другіе авторы не занимались этимъ вопросомъ специально и только при случаѣ, между другими наблюденіями, указываютъ и на возстановленіе одного металла другимъ, такъ что свѣдѣнія эти разбросаны въ цѣлой химической литературѣ: въ трудахъ Деви, Ге-Люссака, Берцеліуса, Велера и др.; но ихъ можно найти въ каждомъ полномъ руководствѣ, напр., въ химії Гмелина. Въ новѣйшее время Одлингъ прибавилъ нѣсколько интересныхъ фактовъ осажденія металловъ мокрымъ путемъ¹⁾.

Случаи, описанные Фишеромъ и другими, почти всѣ поддаются подъ правило удѣльного вѣса; есть, конечно, исключенія. Чѣмъ дальше стоятъ металлы другъ отъ друга по удѣльному вѣсу, тѣмъ правило абсолютнѣе; для металловъ съ очень близкимъ удѣльнымъ вѣсомъ встречаются случаи или обратные, или чаще случаи взаимнаго вытѣсненія; нѣкоторые изъ послѣдніхъ случаевъ были давно уже известны (*Sn* и *Pb*), другіе (напр., *Hg* и *Ag*) замѣчены Одлингомъ. Расположеніе металловъ по удѣльному вѣсу почти совпадаетъ съ ихъ расположениемъ по вытѣсненію; конечно, расположеніе по вытѣсненію не можетъ быть такъ абсолютно, какъ по удѣльному вѣсу; однако, нѣкоторые металлы по удѣльному вѣсу такъ близки, что разница для нихъ колеблется между тѣмъ же числомъ, какъ и разница показаний удѣльного вѣса для одного и того же металла (напр.: *Ni* и *Co*, *Cd* и *Cu*); слѣдовательно, трудно опредѣлить ихъ относительныя мѣста въ рядѣ удѣльного вѣса; но замѣчательно, что въ этихъ же случаяхъ трудно опредѣлить и ихъ химическія отношенія по вытѣсненію.

¹⁾ Jahresbericht, 1856 г., 262, въ извлечениі.

ТАБЛИЦА
строенія металлическихъ элементовъ.

	Удѣльный вѣсъ δ	Эквива- лентъ e	Число частичъ въ единицѣ объема $\frac{\delta}{e}$ уд. в. воды 100	Эквива- лентъ объема $v = \frac{e}{\delta}$	Относитель- ное разстоя- ніе частицъ r $\sqrt[3]{v} = r$	Отно- сительное разстояніе частицъ ка- зия припято за 100
<i>K</i>	0,86	39,2	2,2	45,6	3,58	100
<i>Na</i>	0,97	23	4,2	23,7	2,87	80
<i>Ca</i>	1,58	20	7,9	12,6	2,33	65
<i>Mg</i>	1,75	12	14,6	7,0	1,91	53
<i>Al</i>	2,5	9 13,5	27,7 18,5	3,6 5,4	1,53	43
<i>Zn</i>	6,9	32,6	21,2	4,6	1,66	46,5
<i>Fe</i>	7,8	28	27,8	3,6	1,53	43
<i>Co</i>	8,6	29,5	29,1	3,4	1,51	42
<i>Cd</i>	8,8	56	15,7	6,5	1,86	52
<i>Cu</i>	8,9	31,7 63,4	28,0 14,0	3,6 7,2	1,53 1,93	43 54
<i>Pb</i>	11,4	103,5	11,0	9,2	2,09	58,5
<i>Hg</i>	13,5	100 200	13,5 6,75	7,3 14,6	1,94 2,45	54 69
<i>Ag</i>	10,4	108	9,6	10,2	2,17	61
<i>Au</i>	19,3	197	9,7	10,2	2,17	61
<i>Pt</i>	21,0	98,7	21,2	4,6	1,66	46,5

Сравнивая эти два ряда, легко убѣдиться, что они почти совпадаютъ другъ съ другомъ, слѣдовательно,—вообще говоря—место металла и каждой группы въ вытѣснительномъ рядѣ можетъ быть довольно вѣрно опредѣлено и, такъ сказать, заранѣе предсказано его удѣльнымъ вѣсомъ. Щелочные металлы стоять въ главѣ того и другого ряда, магній и глиній между ними и тяжелыми металлами; за ними стоять въ обоихъ рядахъ цинкъ, легко вытѣсняющій всѣ остальные тяжелые металлы; потомъ

группа желѣза, никеля и кобальта; потомъ кадмій, потомъ свинецъ, мѣдь, серебро и ртуть—металлы, вытѣсняемыя предыдущими и вытѣсняющіе слѣдующіе, т. е. золото и платиновые металлы, которые уже не вытѣсняютъ предыдущихъ металловъ.

Неопредѣленность химическихъ отношеній замѣчается только между сосѣдними по удѣльному вѣсу. Такъ, отношенія калія и натрія не имѣютъ рѣзкаго характера, и хотя калій, вообще говоря, болѣе энергичный элементъ, вытѣсняетъ *Na* изъ хлористаго соединенія при нагреваніи (хотя калій болѣе летучъ, чѣмъ *Na*)—по наблюдению Дэви; натрій, содержащій немногого калія, по наблюденіямъ Ге-Люссака, очищается отъ этого металла на воздухѣ окислениемъ, т. е. калій прежде натрія окисляется; Бунзенъ показалъ, что амальгама калія относится къ амальгамѣ натрія въ прикосновеніи съ водой электро-положительно; наконецъ, и количество теплоты, отдѣляющееся при соединеніи, болѣе для калія, чѣмъ для натрія,—все это, кажется, достаточно говорить въ пользу того, что въ отношеніи калія и натрія даже небольшое различіе удѣльного вѣса дасть, такъ сказать, химическій перевѣсь калію надъ натріемъ; однако въ послѣднее время открыть и обратный случай, именно: Вильямсонъ¹⁾ нашелъ, что щѣдкое кали восстанавливается отчасти натріемъ при 170° , а Ванклинъ замѣтилъ то же при дѣйствіи натрія на расплавленное уксусно-кислое кали²⁾. Такое взаимное вытѣсненіе объясняется, конечно, близостью удѣльного вѣса двухъ металловъ и могло быть предвидѣно, но все-таки не уничтожаетъ первенства калія относительно химической энергіи.

Что касается до отношенія первой щелочной группы ко второй и отношенія металловъ второй группы между собою, то они еще мало изслѣдованы; но что известно, также говоритъ въ пользу правила удѣльного вѣса. Такъ, давно известно, что хлористыя соединенія *Ca*, *Sr* и *Ba* разлагаются парами калія,

¹⁾ Jahresbericht 1861.

²⁾ Тамъ же.

густой растворъ *BaCl* возстановляется амальгамами калия и натрия; Каронъ получилъ кальций, нагревая его хлористое соединение съ натриемъ; *K* и *Na* электро-положительны относительно *Ca* и *Mg* (Buns.); изъ моего опыта надъ дѣйствіемъ глинія на соединенія барія и кальція можно отчасти заключить, что барій легче возстановляется кальціемъ (Бунзенъ говоритъ то же). Стронцій и въ этомъ отношеніи, какъ и въ другихъ, по всей вѣроятности, занимаетъ среднее мѣсто; по удѣльному же вѣсу они расположены такъ: *Ca*—1,58; *Sr*—2,54; *Ba*, вѣроятно, > 3 , такъ какъ его эквивалентъ самый больший. Магній съ уд. в. 1,75 выдѣляетъ металлы, ниже его стоящіе, начиная съ глинія (сухимъ путемъ, какъ видно изъ моего опыта, сгр. 89), въ чемъ я убѣдился непосредственнымъ опытомъ, такъ: кусочки магнія въ растворѣ сѣрнокислого цинка покрываются чрезъ нѣкоторое время кристаллическимъ осадкомъ цинка; кристаллы эти были подвержены мною полной химической пробѣ; они растворялись въ соляной кислотѣ съ отдѣленіемъ водорода; амміакъ въ избыткѣ растворялъ сначала образовавшійся бѣлый осадокъ; къ аммоніакальному раствору было прибавленъ сѣрнистый водородъ, который произвелъ изобильный бѣлый осадокъ, нерастворимый въ нашатырѣ; точно такъ же осаждается кадмій, желеzo, никонецъ—мѣдь, свинецъ и серебро. Надъ растворами палладія, платины и золота я не считалъ необходимымъ дѣлать опыты; глиній дѣйствуетъ гораздо слабѣе магнія; такие металлы, какъ: мѣдь, свинецъ, ртуть, серебро и палладій возстанавливаются очень легко; но другіе—нѣтъ. При одномъ опыте мнѣ однако-же удалось возстановить цинкъ изъ раствора хлористаго цинка, а изъ сѣрнокислого—нѣтъ; при дѣйствіи соляныхъ растворовъ на глиній всегда образуется много окиси глиноzemа. Слабое дѣйствіе глинія и совершенное отсутствіе возстановленія имъ растворовъ желеzo, никеля, кобальта (отчасти цинка) и кадмія я объясняю тѣмъ, что глиній дѣйствуетъ преимущественно на воду, образуя, какъ мы видѣли, окись, и потому выдѣляются, вѣроятно, только тѣ металлы, которые возстанавливаются при этихъ условіяхъ водородомъ, т. е. сви-

нецъ, ртуть и т. п., а *Fe, Ni, Co, Zn* и *Cd* могутъ быть восстановлены только непосредственно глиніемъ,—это тѣмъ болѣе мнѣ кажется вѣроятнымъ, что глиній плохо насыщаетъ кислоты и съ кислородомъ даетъ окись не основную, потому-то въ смѣси соли съ водой онъ скорѣе даетъ окись, выдѣляя водородъ, чѣмъ соль, выдѣляя металъ; но сухимъ путемъ, въ отсутствіи воды, онъ, вѣроятно, легко будетъ восстанавливать *Zn, Cd, Fe* и т. д. Это можно уже заключить изъ того, что при моемъ опыте (стр. 86) пары цинка, даже въ избыткѣ и при высокой температурѣ, не могли восстановить хлористаго глинія. Но отношенію къ *Ca* и *Ba*,—*Al*, какъ мы видѣли, занимаетъ именно то мѣсто, которое соотвѣтствуетъ его удѣльному вѣсу. Отношеніе другихъ (такъ наз. тяжелыхъ) металловъ между собою довольно хорошо изслѣдовано Фишеромъ; большая часть случаевъ, имъ описанныхъ, подходитъ подъ правило удѣльного вѣса. Такъ, цинкъ, легчайший между этими металлами,—всѣ ихъ восстанавливаютъ (начиная съ *Fe*), а самъ ими не восстанавливается; за нимъ слѣдуетъ желеzo и кадмій; никель и кобальтъ мало изслѣдованы въ этомъ отношеніи, но нѣть сомнѣнія, что, начиная съ мѣди, они восстанавливаютъ всѣ слѣдующіе металлы; затѣмъ слѣдуетъ по удѣльному вѣсу мѣдь, восстанавливаемая предыдущими металлами и, въ свою очередь, вытѣсняющая серебро, золото и платину; замѣчательно, что, такъ какъ удѣльный вѣсъ мѣди почти одинаковъ съ удѣльнымъ вѣсомъ кадмія, то можно было предвидѣть взаимное восстановленіе; и, дѣйствительно, недавно Одлингъ нашелъ, что при кипяченіи мѣди съ кисловатымъ растворомъ хлористаго кадмія получается слѣдъ восстановленія кадмія, однако эта обратная реакція, какъ видно, гораздо труднѣе происходитъ, чѣмъ обыкновенная нормальная, т. е. восстановленіе мѣди кадміемъ такъ, что во всякомъ случаѣ кадмій въ восстанавливающемъ ряду долженъ стоять выше мѣди. Во всѣхъ этихъ случаяхъ мѣдь подчиняется правилу удѣльного вѣса; но замѣчательное исключение представляется ея отношеніе къ свинцу, удѣльный вѣсъ котораго 11,4, тогда какъ мѣди 8,9; а между тѣмъ, какъ известно, мѣдь

довольно легко возстановляется изъ своихъ растворовъ свинцомъ. Такая аномалия заставила меня сдѣлать нѣсколько опытовъ обратного возстановленія: я употреблялъ насыщенный растворъ хлористаго свинца, нейтральный и кислый, и нагрѣвалъ его съ пластинкою мѣди; въ другой разъ я дѣйствовалъ мѣдью на аммониакальныи растворъ окиси свинца; наконецъ, пробовалъ возстановлять свинецъ сухимъ путемъ изъ окиси и изъ хлористаго свинца; но во всѣхъ этихъ случаяхъ я не могъ замѣтить возстановленія свинца¹⁾). Однако Одлингъ утверждаетъ, что мѣдь, при кипяченіи съ сильно кислымъ растворомъ хлористаго свинца, возстановляется этого металла. Во всякомъ случаѣ, если и можетъ быть обратное возстановленіе, то оно, какъ видно, чрезвычайно трудно и должно тогда прекращаться, замѣняясь *нормальною реакцией*, т. е. возстановленіемъ мѣди свинцемъ. Поэтому я полагаю, что отношеніе этихъ двухъ металловъ между собою слѣдуетъ считать отступленіемъ отъ общаго правила, а мѣдь необходимо поставить ниже свинца въ возстановительномъ рядѣ, что подтверждается тоже, какъ видно изъ моихъ опытовъ, и отношеніемъ ихъ къ водороду. Такую аномалию врядъ ли можно объяснить удовлетворительно: можетъ быть, она имѣетъ связь съ наклонностью мѣди входить въ соединенія двумя различными эквивалентами.

За свинцемъ и мѣдью слѣдуетъ ртуть, которая вытѣсняется легко всѣми предыдущими металлами, а ихъ не вытѣсняетъ, но представляется аномалию только въ отношеніи серебра, которое возстанавливается, не смотря на то, что удѣльный вѣсъ ртути 13,5, а серебра 10,5 (Одлингъ замѣтилъ, впрочемъ, и тутъ обратный случай); но такъ какъ ртуть находится въ жидкомъ состояніи, то нѣтъ аналогіи во видахъ условіяхъ относительно серебра, и отступленіе отъ правила можетъ быть частью

1) Правда, разъ мѣдь покрылась мѣстами едва замѣтными темными пятнами, но нѣкоторыя пробы, которымъ я могъ ихъ подвергнуть, заставляютъ меня сомнѣваться, чтобы это былъ свинецъ.

этимъ объяснено. Серебро, следующее за ртутью, восстанавливается еще легче всѣми предыдущими металлами¹⁾, представляя аномалию относительно ртути и свинца; послѣдній металлъ имѣеть, впрочемъ, такой близкій удѣльный весъ, что реакцію эту почти нельзя относить къ числу отступлений отъ правила; въ свою очередь, серебро восстанавливается палладіемъ, золото и платину. Палладій, въ свою очередь, восстанавливаетъ золото и платину (Fischer); наконецъ, золото и платина, какъ самая тяжелѣйшая, восстанавливаются, какъ известно, всѣми предыдущими; но, повидимому, ихъ взаимное отношеніе обратно правилу удѣльного веса, т. е., что золото восстанавливается платиною, и вообще золото легче восстанавливается, чѣмъ платина; отношеніе этихъ двухъ металловъ еще не вполнѣ установлено;ѣроятно, они взаимно восстанавливаются; впрочемъ, вообще слѣдуетъ взять во вниманіе ихъ близкій удѣльный весъ. Относительно другихъ металловъ ихъ удѣльный весъ значительно отличается, что и вполнѣ соотвѣтствуетъ легкости ихъ восстановленія и вообще непрочности ихъ соединеній.

Если собрать всѣ извѣстные случаи восстановленія, которыхъ болѣе 80, и прибавить къ нимъ тѣ, которые навѣрное можно предвидѣть, каковы: восстановленіе калиемъ и натріемъ (и также литіемъ) всѣхъ металловъ, начиная съ цинка, и осажденіе тѣхъ же металловъ кальціемъ, стронціемъ и баріемъ, въ чёмъ, я думаю, никто не станетъ сомнѣваться,—то мы получимъ еще около 80 случаевъ, и изъ этихъ 160 случаевъ едва можно насчитать 4 настоящихъ отступленія отъ правила, и при томъ всегда для металловъ, очень близкихъ по удѣльному весу; нако-

1) Относительно мѣди Одлингъ упоминаетъ объ обратномъ восстановленіи этого металла серебромъ; но если взять во вниманіе, съ какою легкостью серебряные растворы восстанавливаются мѣдью, какъ можно сказать, мгновенно мѣдь покрывается въ нихъ серебромъ, то очевидно, что обратная реакція ненормальная и при томъ готчашь должна прекратиться вслѣдствіе того, что мѣдь электро-положительна относительно серебра.

нецъ — что главное — тѣ же самые металлы, которые представляють такое отступление, каковы: мѣдь, свинецъ, серебро и ртуть относительно одного или двухъ случаевъ, въ отношеніи ко всѣмъ другимъ металламъ, т. е. въ большинствѣ случаевъ подчиняются этому правилу. Итакъ, можно сказать безъ преувеличенія, что, примѣня это правило къ каждому отдельному металлу, ни одинъ изъ нихъ не представляетъ настоящаго исключенія изъ правила удѣльного вѣса.

Въ дополненіе примѣра металлическихъ элементовъ я приведу еще отношеніе между элементами другихъ группъ. Три галоиды въ порядке выг҃ененія изъ своихъ соединений съ водородомъ и другими металлами слѣдуютъ правилу уд. в., который для жидкаго хлора = 1,33 брома = 2,88 и юда = 4,94; но, такъ какъ отношеніе ихъ эквивалентовъ къ углѣльному вѣсу почти одинаково для всѣхъ трехъ, иначе говоря, число частицъ въ единицѣ объема и разстоянія ихъ одинаковы, то порядокъ ихъ выг҃ененія зависитъ только отъ вѣса частицъ, т. е. какъ будто ихъ химическая энергія обратно пропорціональна эквиваленту. Это, впрочемъ, какъ я уже замѣтилъ, только частный случай и между металлами встрѣчается далеко не всегда, и часто бываютъ обратные случаи, напр.: калий имѣетъ значительный эквивалентъ (39), большій многихъ изъ тѣхъ металловъ, которые онъ выг҃еняетъ, каковы: *Mg*, *Zn*, *Fe*, *Mn*, *Ni* и *Co*; это зависитъ отъ того, что разстояніе частицъ калия значительно превышаетъ разстояніе частицъ всѣхъ остальныхъ металловъ — обстоятельство, которое и обусловливается малый его удѣльный вѣсъ. Элементы амфициной группы — кислородъ, сѣра, селенъ и теллуръ слѣдуютъ правилу уд. в., сколько можно судить по нѣкоторымъ известнымъ реакціямъ. Здѣсь также, какъ и для предыдущей группы, уд. в. возрастаетъ съ эквивалентомъ для трехъ послѣднихъ; что же касается до кислорода, то, по аналогіи, можно предположить, что, если бы онъ могъ быть полученъ въ жидкому или твердому состояніи, имѣть бы самый меньшій уд. в., такъ какъ и эквивалентъ его меньшій изъ четырехъ.

	<i>O</i>	<i>S</i>	<i>Se</i>	<i>Te</i>
Эквив.	8	16	40	64
Уд. в.	—	2,0	4,0	6,0.

Извѣстно, что кислородъ довольно легко вытѣсняетъ три другіе элемента изъ ихъ растворимыхъ металлическихъ соединеній, каковы соединенія съ водородомъ, калиемъ и др.; при томъ, если сѣра и селень находятся вмѣстѣ, то сначала осаждается селень, а изъ замѣчанія Берцеліуса (Pogg. Ann., T. 8, стр. 423) видно, что сѣра непосредственно вытѣсняетъ селень изъ его соединенія съ калиемъ. Отношенія селена къ теллуру неизвѣстны.

§ 2.

Объясненіе вліянія удѣльного вѣса.

Удѣльный вѣсъ (δ), какъ мы видѣли (на стр. 93), выражается формулой: $\delta = \frac{e}{r^3}$, гдѣ e —эквивалентъ, а r —относительное разстояніе частицъ, слѣдовательно, удѣльный вѣсъ выражается именно тѣми величинами, отъ которыхъ зависитъ взаимное притяженіе частицъ (p): это притяженіе должно быть пропорционально массамъ и обратно пропорционально какой-нибудь степени разстоянія, такъ что полное взаимное притяженіе двухъ частицъ выразится формулой $\frac{e^2}{r^n}$; если предположить $n=3$, то получится: $p = \frac{e^2}{r^3}$ или $\delta \cdot e$; если $n=4$, то $p = \frac{e^2}{r^4} = \frac{\delta \cdot e}{r}$ (при $n=6$, $p=\delta^2$); рядъ чиселъ для p , полученныхыхъ по этимъ формуламъ, имѣть послѣдовательность, близкую къ послѣдовательности ряда удѣльного вѣса, приближаясь къ нему съ увеличеніемъ n , а при $n=6$ получится рядъ, совершенно совпадающій съ рядомъ уд. в., такъ какъ члены его будутъ расположены по δ^2 ; однако и при $n=4$, т. е. при формулы: $p = \frac{e^2}{r^4}$ или $\frac{\delta \cdot e}{r}$ эти два ряда очень близко подходитъ другъ къ другу.

Изъ этого сближенія двухъ рядовъ очевидно, что вліяніе уд. в., какъ выражающее до извѣстной степени взаимное притяженіе частицъ, мы и должны искать въ самомъ притяженіи. При вступленіи элемента въ какое-нибудь химическое соединеніе, напр., при раствореніи металловъ въ кислотахъ и соляхъ, самому акту соединенія должно предшествовать разъединеніе частицъ металла; притяженіе частицъ противодѣйствуетъ этому раздѣленію, и потому, чѣмъ слабѣе частичное притяженіе, тѣмъ легче металлъ будетъ переходить изъ элементарнаго состоянія въ соединенное. Такимъ образомъ, металлы съ наименьшою плотностью, соотвѣтствующею наименьшему частичному притяженію, будутъ легче другихъ входить въ соединенія; это объясняетъ намъ, почему металлы щелочей и щелочныхъ земель такъ легко теряютъ свое элементарное состояніе и входятъ въ различныя соединенія, а, напротивъ того, такие металлы, каковы: золото, платина, иридій и т. п. такъ трудно уступаютъ дѣйствію постороннихъ веществъ и съ трудомъ переходятъ въ соединенія.

Если плотность металловъ имѣеть вліяніе на большую или меньшую способность ихъ вступать въ соединенія, то мы имѣеть право заключить обѣ обратномъ ходѣ реакціи, т. е. что плотнѣйшіе элементы легче выходятъ изъ соединеній и уступаютъ свое мѣсто менѣе плотнымъ, тѣмъ болѣе, что притяженіе однородныхъ частицъ должно оказывать свое вліяніе и въ самомъ соединеніи. Во время же акта замѣщенія одного металла другимъ, мы имѣемъ, съ одной стороны, выдѣленіе частицъ тяжелѣйшаго металла, притяженіе которыхъ дѣйствуетъ въ сторону химической реакціи, а съ другой стороны,—притяженіе частицъ вытѣсняющаго легчайшаго металла, дѣйствующее въ обратную сторону; но такъ какъ притяженіе первыхъ сильнѣе притяженія вторыхъ, то очевидно, что химическая реакція должна совершиться въ сторону сильнѣйшаго притяженія. Это объясняетъ также, почему, при погруженіи въ кислоту двухъ металловъ различной плотности (спаянныхъ между собою), химическое дѣйствіе обнаружится только на легчайшемъ, т. е. тамъ, гдѣ оно встрѣчаетъ наимень-

шес сопротивление, производя такимъ образомъ электрическій токъ отъ этого металла и тяжелѣйшему. Участіе сопротивленія, происходящаго отъ взаимнаго притяженія частицъ, всего лучше уясняется, если обратить вниманіе на измѣненіе объемовъ (иначе говоря,—на измѣненіе разстоянія между частицами), которое претерпѣваютъ элементы, переходя изъ свободнаго въ соединенное состояніе. При сравненіи эквивалентовъ—объемовъ металловъ съ объемами ихъ соединеній, мы замѣчаемъ въ большей части случаевъ увеличеніе этого объема, слѣдовательно, частицы металла, входя въ соединеніе, болѣе или менѣе удаляются другъ отъ друга; на это удаленіе, конечно, трагится сила, что и составляетъ сопротивленіе при раствореніи металловъ. Удаленіе частицъ во время химическихъ соединеній (увеличеніе объема), вообще говоря, у тяжелыхъ больше, такъ какъ въ большей части случаевъ и относительное разстояніе ихъ частицъ меньше, и потому для соединенія онѣ должны, такъ сказать, раздвигаться. Между легкими металлами есть даже такой, именно калий (это, повидимому, единственный), частицы которого не только не удаляются, входя въ соединеніе съ хлоромъ, но даже нѣсколько сближаются; это видно изъ того, что объемъ хлористаго калия менѣе объема, входящаго въ его составъ калия (экв. объема $Ka=45,6$, а $KaCl=37,4$); натрій въ этомъ отношеніи близко къ нему подходитъ: его частицы почти не измѣняютъ своего разстоянія, вступая въ соединеніе съ хлоромъ; напротивъ того, для тяжелыхъ металловъ измѣненіе объема при соединеніи весьма значительно. Такъ, объемъ хлористыхъ соединеній свинца и серебра въ два съ половиною раза болѣе объема самыхъ металловъ; частички платины еще болѣе удаляются, вступая въ соединеніе, напр., объемъ одноклористой платины въ пять разъ болѣе объема металла; впрочемъ, такие металлы, какъ цинкъ и кадмій, представляютъ также сильное увеличеніе—въ пять и четыре раза (даже кальций почти въ 3 раза); но не слѣдуетъ забывать, что эквиваленты этихъ металловъ гораздо менѣе эквивалентовъ платины, серебра и свинца и потому на удаленіе ихъ частицъ тратится менѣе силы; или, лучшее скажемъ, на то, чтобы притянуть эти частицы.

зать, химическая реакция встречаетъ менѣе сопротивленія. Это различное измѣненіе объемовъ или разстояній, при соединеніи, зависитъ отъ первоначальнаго разстоянія частицъ: чѣмъ оно больше въ элементѣ, тѣмъ, повидимому, менѣе измѣняется, когда элементъ вступаетъ въ соединеніе. Такъ напр., самое большое относительное разстояніе между частицами калія, потомъ натрія, потомъ кальція, потомъ серебра и свинца; у цинка и платины— одинаковыя, и измѣненіе объема также весьма близкое.

Итакъ, съ точки зреінія измѣненія объемовъ, легчайшіе металлы (особенно калій и натрій) также представляютъ наименьшее сопротивленіе химическому дѣйствію. Для среднихъ же металловъ (*Zn* и *Cd* и др.), хотя измѣненіе объема значительное, но сопротивленіе уменьшается, сравнительно съ такими металлами, какъ *Ag*, *Pb* и *Pt*, вслѣдствіе меньшаго эквивалента, однимъ словомъ,—тутъ играютъ роль тѣ же величины (разстояніе и вѣсъ частицъ), которые опредѣляютъ удѣльный вѣсъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что сравненіе механическаго строенія элементовъ съ ихъ химическими свойствами уже съ первого раза оказывается полезу разъясненію химическихъ реакцій: голые факты вытекаютъ одного элемента другимъ получаются нѣкоторый смыслъ и являются какъ бы необходимымъ слѣдствіемъ самого строенія тѣлъ. Вмѣсто принятаго въ наукѣ объясненія, что цинкъ, напр., потому вытесняетъ серебро и свинецъ, что имѣеть болѣе сродства, иначе говоря, потому, что цинкъ есть цинкъ, можно пойти нѣсколько далѣе голаго факта, обративъ вниманіе на то, что частицы серебра и свинца связаны крѣпче между собою притяженіемъ, нежели частицы цинка, что и выражается ихъ удѣльнымъ вѣсомъ.

Конечно, нельзя думать, что влияніе разстоянія и вѣса частицъ (уд. в.) есть единственное внутреннее влияніе и что оно исключительно даетъ направленіе реакціи: нѣкоторыя исключения изъ разобранныго здѣсь правила удѣльного вѣса и возможность обратныхъ реакцій для нѣкоторыхъ металловъ указываютъ намъ и на другія условія, къ которымъ я теперь обращаюсь.

§ 3.

Вліяніе умови рівності паявъ.

Мы только что разсматривали вліяніе вѣса и разстоянія частицъ на явленія вытѣсненія одного элемента другимъ; это вліяніе проявляется не только во время химической реакціи, но должно дѣйствовать постоянно въ каждомъ тѣлѣ; равно въ элементахъ, какъ и въ сложныхъ тѣлахъ, следовательно должно оказывать вліяніе и на саму прочность этихъ послѣднихъ, и на ихъ взаимныя реакціи.

Поэтому, для болѣе полного разъясненія явленія вытѣсненія, нужно обратиться къ разсмотрѣнію тѣхъ же внутреннихъ условій и для сложныхъ тѣлъ, примѣняя этотъ способъ изученія не только къ дѣйствію простыхъ тѣлъ на сложные, но и сложныхъ на сложные, т. е. къ явленіямъ двойного замѣщенія. Это тѣмъ болѣе необходимо, что только тогда выяснится вліяніе третьаго элемента на вытѣсненіе одного элемента другимъ—вліяніе, которое иногда выражается довольно рѣзко, какъ видно даже изъ описанного (на стр. 90) случая возстановленія барія глиніемъ только изъ окиси, но не изъ хлористаго соединенія. Эти отношенія лучше всего изучаются при двойныхъ разложеніяхъ потому, что въ этихъ случаяхъ элементы находятся уже въ соединеніи и строеніе ихъ, какъ элементовъ, уже не существуетъ, а проявляются, напротивъ того, ихъ отношенія къ частицамъ разнородныхъ элементовъ; обмѣнъ при реакціи двухъ сложныхъ тѣлъ лучше всего укажетъ намъ на то, какія условія строенія тѣлъ оказываются на него вліяніе. Съ этой точки зрѣнія я здѣсь разсмотрю условія прочности соединеній и вліяніе этого условія къ двойнымъ и простымъ замѣщеніямъ, ограничиваясь по преимуществу болѣе простыми двойными соединеніями, каковы—окиси и галоидныя соли.

Умови прочности соединеній.

Для примѣра выберемъ сошеніе глинія и серебра къ кислороду, хлору и іоду. Соединенія этихъ двухъ металловъ съ на-

званными элементами имѣютъ обратное отношеніе прочности, тогда какъ для глинія самое прочное соединеніе есть окись, потомъ хлористое и, наконецъ, самое непрочное или легко разлагаемое—иодистое; для серебра, напротивъ того, кислородное соединеніе отличается своею легкоразлагаемостью, хлористое уже несравненно прочнѣе и иодистое еще болѣе устойчивое, судя, напр., по тому, что свѣтъ, который такъ быстро измѣняетъ хлористое, не оказываетъ никакого дѣйствія на иодистое¹⁾. Другіе металлы въ своихъ соединеніяхъ съ этими тремя элементами то будутъ приближаться къ глинію, какъ напр., водородъ, магній и нѣкот. др., то къ серебру, какъ напр., ртуть, то занимаютъ среднее мѣсто, какъ калій, для которого наиболѣе устойчивое и прочное соединеніе есть хлористое. Обратимъ вниманіе на вѣсъ соединенныхъ частицъ, и тогда не трудно будетъ замѣтить, что какъ въ ряду глинія, такъ и въ ряду серебра и другихъ металловъ наиболѣе прочными соединеніями оказываются тѣ, въ которыхъ вѣсъ обоихъ паявъ наиболѣе приближается къ равенству, и, съ увеличеніемъ разницы въ вѣсѣ соединенныхъ паявъ, уменьшается прочность соединеній. Слѣдующая таблица показываетъ это замѣчательное отношеніе:

AlO	1,12	$AlCl$	1	AlJ	1
9:8	1	9:35,5	4		14
MgO	$1\frac{1}{2}$	$MgCl$	1	MgJ	1
12:8	1		3		10
KO	5	KCl	1,1	KJ	$\frac{1}{3\frac{1}{2}}$
39:8	1		1		
PbO	13	$PbCl$	3	PbJ	$\frac{1}{1\frac{1}{4}}$
103:8	1		1		
AgO	$13\frac{1}{2}$	$AgCl$	3	AgJ	$\frac{1}{1\frac{1}{5}}$
110:8	1		1		

Вліяніе отношенія соединенныхъ массъ на прочность соединеній можетъ быть также отчасти объяснено механическимъ строеніемъ. Дѣйствительно, притяженіе однородныхъ частицъ про-

¹⁾ Fischer, Pogg. Ann. 1862 г.

должается и въ соединеніи и, такъ какъ оно пропорционально произведенію массъ, соединенныхъ, напр.: для AgO , $AgAg = 11664$, а $AgO = 864$, то въ этомъ случаѣ притяженіе однородныхъ частицъ будетъ противодѣйствовать, не смотря на большее разстояніе, притяженію разнородныхъ; конечно, оно не можетъ быть сильнѣе, иначе соединеніе бы разрушилось или даже не могло бы существовать, въ случаѣ же равенства (или близкаго къ тому отношенія) соединенныхъ массъ, и квадраты этихъ массъ равны, слѣдовательно, притяженіе однородныхъ частей не будетъ нарушать прочность соединеній, напр., AlO и AgJ —иначе говоря, при неравенствѣ соединенныхъ массъ частицы имѣютъ наклонность перейти въ элементарное состояніе, чего нѣтъ для соединеній равныхъ массъ; что касается до калія, то и въ этомъ отношеніи строеніе его соединеній указываетъ на ихъ большую прочность, потому что и въ случаѣ большаго неравенства между паями, напр., для O , притяженіе его частицъ не должно уменьшать прочность соединеній, потому что его частицы не могутъ уже больше сблизиться, и какъ будто не стремятся къ элементарному состоянію, такъ какъ въ соединеніяхъ онѣ не болѣе удалены, чѣмъ въ самомъ элементѣ.

A. Вліяніе условія равенства паевъ на двойные разложенія.

Въ случаѣ прикосновенія двухъ сложныхъ тѣлъ, если элементы такъ расположены, что большія массы соединены съ меньшими, напр., AgO и KJ , то элементы, стремясь къ болѣе прочному равновѣсію, производятъ двойное разложеніе, и въ приведенномъ примѣрѣ получаются AgJ и KO , какъ я самъ уѣдался опытомъ (тоже для $BiK + AgO$); притяженіе массъ при такомъ распределеніи элементовъ всегда должно быть больше, въ силу простого ариѳметического вывода,—что сумма произведеній большихъ величинъ съ произведеніемъ меньшихъ всегда больше суммы произведеній меньшихъ съ большими. Въ приведенномъ примѣрѣ произведеніе паевъ для первого расположенія элементовъ $= \frac{AgO}{864} + \frac{KJ}{4978} = 5842$, а для второго $\frac{AgJ}{13716} + \frac{KO}{343} = 14059$.

Итакъ, вслѣдствіе стремленія большихъ массъ соединиться съ большими, двойные разложенія будутъ преимущественно происходить въ этомъ направленіи и, если элементы уже такъ расположены, то двойного разложенія или вовсе не будетъ, или оно будетъ неполное. Этимъ я объясняю, почему, напр., ъдкое кали не разлагаетъ іодистаго и бромистаго серебра¹⁾, легче же разлагается хлористое серебро; то же и относительно бромистой и іодистой ртути и іодистаго свинца и, наоборотъ, окиси серебра и ртути легко разлагають іодистыя и бромистыя соединенія калія, натрія и кальція. Всѣ эти реакціи, изъ которыхъ многія не были известны, я самъ нарочно производилъ.

Вліяніе этого условія прекрасно подтверждается реакціями, описанными Фильдомъ²⁾, который нашелъ, что *AgCl* съ *KBr* и *KJ* даетъ *AgBr*, *AgJ* и *KCl*, а *AgBr* съ *KJ*, въ свою очередь, даетъ *KBr* и *AgJ*; обратныхъ же реакцій не происходитъ.

Итакъ, на двойные разложенія имѣеть преимущественное вліяніе вѣсъ частицъ; что же касается до разстоянія то оно, повидимому, не должно тутъ играть важной роли, потому что при взаимномъ дѣйствіи двухъ сложныхъ тѣлъ, въ которыхъ уже не существуетъ первоначального строенія элементовъ и частицы которыхъ уже претерпѣли известное раздѣленіе, происходитъ только незначительное измѣненіе разстояній, иногда едва замѣтное; это доказывается тѣмъ, что въ большей части двойныхъ разложеній суммы объемовъ соединеній до разложенія и послѣ разложенія или равны между собою, или вторая сумма нѣсколько менѣе. Это послѣднее обстоятельство, т. е. что при двойныхъ разложеніяхъ получаются болѣе плотныя соединенія, еще замѣчено Кремерсомъ²⁾, который указываетъ на связь этого обстоятельства съ нерастворимостью соединеній, которая обык-

¹⁾ Или съ большимъ трудомъ при кипяченіи съ избыткомъ; при томъ разложение самое неполное.

²⁾ Field (Jahresbericht), стр. 519.

новенно образуются (если это возможно) при двойныхъ разложе-
ніяхъ, какъ это было давно высказано Бертолетомъ.

По этимъ двумъ ученымъ, двойные разложенія совершаются въ сторону большей нерастворимости и большей плотности; теперь, по моему мнѣнію, слѣдуетъ прибавить и въ сторону наибольшаго равенства соединенныхъ паевъ. Очевидно, что всѣ эти правила въ связи между собою и дополняютъ другъ друга; ясно также, что послѣднее условіе можно считать причиною двухъ другихъ. Дѣйствительно, образованіе нерастворимыхъ соединеній объясняется уплотненіемъ соединеній во время двойного разложенія, а самое уплотненіе это можно считать слѣдствіемъ болѣе выгодныхъ условій взаимнаго притяженія частицъ отъ расположения ихъ по правилу равенства паевъ.

B. Вліяніе условія равенства паевъ на вытѣсненіе однихъ элементовъ другими.

Если стремленіе элементовъ соединяться въ разныхъ массахъ имѣеть вліяніе на относительную прочность соединеній и особенно оказываетъ свое вліяніе на двойные разложенія, то понятно, что оно не можетъ остаться безъ вліянія на вытѣсненіе однихъ элементовъ другими. Изъ ряда соединеній одного и того же металла тѣ, которые болѣе удовлетворяютъ условію равенства паевъ, должны труднѣе подвергаться вытѣсненію, какъ соединенія самыя прочныя, и наоборотъ; а съ другой стороны, и дѣйствіе вытѣсняющаго металла будетъ или облегчено, или затруднено,—смогря по тому, подходитъ или нѣтъ его пай къ паю третьаго элемента, съ которымъ онъ долженъ вступить въ соединеніе. Возможны случаи, гдѣ вліяніе этого условія, особенно если оно дѣйствуетъ вдвойнѣ, способствуя разложенію существующаго и образованію новаго соединенія, препятствуетъ выдѣленію и даже извращаетъ его (впрочемъ, это бываетъ преимущественно для металловъ, близкихъ по удѣльному вѣсу,—или требуетъ высокой температуры).—Такъ напр., извѣстно, что окись глинія не возстановляется каліемъ и натріемъ, хлористое соединеніе, напро-

тивъ, возстановляется довольно легко, а изъ моего опыта (стр. 89) видно, что относительно калия возможно даже извращеніе (при высокой температурѣ, однако).

Въ первомъ случаѣ отношенія паевъ глинія, калия и хлора способствуютъ двойнѣй реакціи: неравенствомъ паевъ для первоначального соединенія ($AlCl$) и равенствомъ могущаго образоваться соединенія (KCl); во второмъ же случаѣ, гдѣ вмѣсто хлора кислородъ, неравенство паевъ существующаго соединенія (KO) способствуетъ его разложенію, а равенство паевъ Al и O способствуетъ образованію нового соединенія (AlO); то же отношеніе, конечно, напротивъ того, препятствуетъ реакціи въ случаѣ AlO и K . Этимъ же объясняется описанный мною опытъ легкаго возстановленія барія глиніемъ изъ окиси и невозстановленіемъ того же металла изъ хлористаго соединенія¹⁾. Отчасти тѣмъ же объясняется дѣйствіе паровъ цинка на хлористый кремній (пай цинка и хлора почти равны), тогда какъ фтористый кремній въ этомъ случаѣ не разлагается. Къ тому же роду явленій принадлежитъ упоминаемая Девиллемъ реакція возстановленія калия серебромъ изъ юдистаго соединенія (впрочемъ, въ присутствіи кремнезема, изъ которого возстановляется кремній). Послѣданія двѣя реакціи происходятъ, однако, при высокой температурѣ, которая уже одна измѣняетъ условіе реакціи. Хорошимъ примѣромъ влияния условія равенства паевъ на вытѣсненія могутъ служить также реакціи, описанныя Бертелю и Девиллемъ: ртуть легко разлагаетъ юдисто-водородную кислоту, выдѣляя водородъ, очень слабо дѣйствуетъ на бромисто-водородную кислоту при обыкновенной температурѣ и на соляную кислоту вовсе не дѣйствуетъ даже при $200^{\circ}C$. Серебро разлагаетъ также юдисто-водородную кислоту, не дѣйствуя на соляную. Слѣдовательно, чѣмъ пай галоида становится болѣе относителльно водорода, тѣмъ

¹⁾ Впрочемъ, удѣльный вѣсъ обоихъ металловъ долженъ быть очень близокъ $Al = 2,5$, а барія, хотя не определенъ, но, судя по удѣльному вѣсу $Ca = 1,58$ и $Sr = 2,6$; удѣльный же вѣсъ барія долженъ быть болѣе 3-хъ, такъ какъ эквивалентъ его наибольшій.

легче водородистыя кислоты разлагаются ртутью и серебромъ, эквиваленты которыхъ, напротивъ, все болѣе и болѣе приближаются къ галонду и ближе всего къ паю юда.

Не слѣдуетъ, впрочемъ, думать, чтобы извращеніе явлений вытѣсненія, подъ влияниемъ условія равенства паять, легко вызывалось, особенно при обыкновенной температурѣ. Напримѣръ, возстановленія легкихъ металловъ тяжелыми при невысокой температурѣ, хотя бы даже эти металлы и не находились въ соединеніяхъ, соответствующихъ наибольшей прочности, врядъ ли возможны; напротивъ того, реакція легко совершается нормальнымъ образомъ, т. е. повинуясь правилу удѣльного вѣса. Такъ, Велеръ, подогревая въ трубкѣ юдистое серебро съ глиниемъ, получилъ юдистый алюминій и серебро. То же замѣтилъ и я при нагреваніи магнія съ юдистымъ серебромъ (также въ стеклянной трубкѣ): серебро возстановилось очень легко и даже съ отдѣленіемъ тепла и свѣта. Однако, тѣмъ не менѣе, я полагаю, что при очень высокой температурѣ возможно возстановленіе глинія, и особенно магнія, изъ юдистаго соединенія серебромъ.

Вообще говоря, влияніе соединенного элемента на возстановленіе металловъ весьма ограничено и существенно не измѣняетъ болѣе общаго правила — вытѣсненія тяжелыхъ элементовъ легкими. Это тѣмъ болѣе справедливо, что обратная этому правилу возстановленія совершаются, какъ я уже замѣтилъ, преимущественно при высокихъ температурахъ, какъ напр.: дѣйствіе желеѣза и алюминія на Ѣдкое кали; паровъ цинка на хлористый барій и хлористый кремній, при обыкновенныхъ же температурахъ отношенія этихъ металловъ нормальныя. При томъ Девилль объясняется иѣкоторая изъ этихъ явлений, напр., дѣйствіе желеїза на кали, не возстановляющимъ дѣйствиемъ желеїза, а тѣмъ, что само кали при высокой температурѣ распадается на кислородъ и калій.— Во всякомъ случаѣ, какъ мы сейчасъ увидимъ, высокая температура должна уменьшать прочность въ особенности тѣхъ химическихъ соединеній, которыя не удовлетворяютъ условію равенства паять.

§ 4.

Вліяніе високої температури на разложенія (въ связи съ механическимъ строеніемъ тѣль).

Мы видимъ, что прочность соединеній уменьшается, по мѣрѣ возрастанія различія въ вѣсѣ соединенныхъ паевъ; непрочность этихъ соединеній особенно проявляется при высокихъ температурахъ,— они-то и представляютъ преимущественно явленія диссоціаціи или распаденія на элементы. Такъ, въ ряду соединеній серебра и ртути только окиси распадаются отъ нагрѣванія; по мнѣнію Девілля, и для окисей калія, во всѣхъ этихъ соединеніяхъ, пай металлическаго элемента значительно больше пая кислорода; вода также представляеть, какъ извѣстно, явленіе распаденія, но въ этомъ случаѣ пай кислорода больше пая металла. Напротивъ того, окиси глинія, магнія, и кремнія, гдѣ нѣтъ большой разницы въ вѣсѣ соединенныхъ паевъ, представляютъ соединенія самыя огнепостоянныя.

Изъ соединеній водорода самыя непрочныя при высокой температурѣ это его соединенія съ сѣрой, селеномъ, юдомъ и *Te*, и этого, конечно, нельзя приписать меньшему сродству юда, сѣры др., потому что, напр., юдистое и сѣрнистое серебро суть соединенія огнепостоянныя и юдистое серебро не измѣняется даже отъ кислорода при нагрѣваніи, тогда какъ въ тѣхъ же условіяхъ юдъ необыкновенно легко вытѣсняется кислородомъ изъ соединеній его съ глиніемъ, магніемъ, кальціемъ и др., однимъ словомъ—изъ всѣхъ соединеній съ малыми металлическими паями. То же можно замѣтить и относительно хлористыхъ соединеній, такъ напр.: при обыкновенной температурѣ, хотя хлористые глиній и магній не разлагаются кислородомъ, но при нагрѣваніи кислородъ легко вытѣсняетъ хлоръ, и обратной реакциіи не бываетъ, т. е. хлоръ даже въ избыткѣ не действуетъ на раскаленные окиси этихъ двухъ металловъ; но зато тотъ же хлоръ (*Br* и *J*) легко выдѣляютъ кислородъ изъ окисей металловъ высокихъ паевъ, каковы: ртуть, серебро, свинецъ, даже калій;

окись кальція при нагрѣваніи разлагается хлоромъ, но не разлагается іодомъ, а—напротивъ того; іодъ чрезвычайно легко выдѣляется кислородомъ при нагрѣваніи изъ іодистаго кальція, такъ какъ пакъ этихъ тѣль очень различны.

Вообще говоря, различные случаи обратныхъ вытѣсненій при неравенствѣ паевъ, какъ мы видѣли изъ примѣровъ предыдущей статьи, требуютъ содѣйствія высокой температуры. Это разлагающее дѣйствіе нагрѣванія преимущественно на соединенія неравныхъ паевъ объясняется механическою теоріею теплоты, и есть даже логический выводъ этой теоріи въ приложеніи къ химическимъ явленіямъ. По закону Дюлона и Пги, теплоемкость простыхъ тѣлъ обратно пропорціональна вѣсу (или кратному его числу) ихъ паевъ, иначе говоря,—теплоемкость паевъ одинакова ($e \cdot c = e' \cdot c'$), слѣдовательно, если два элемента соединены въ пайныхъ отношеніяхъ, то количество теплоты въ каждой составной части одинаково (иногда кратное одно другого); но, по механической теоріи, теплота есть родъ движенія, и количество ея (въ этомъ случаѣ теплоемкость) измѣряется количествомъ движенія, поэтому уравненіе $e \cdot c = e' \cdot c'$ показываетъ, что количество движенія въ химическихъ паяхъ одинаково. Количество движенія выражается вѣсомъ и скоростью, $\text{движение} = p \cdot v^2$ (гдѣ p —вѣсъ движущейся массы, а v —ея скорость), но p въ этомъ случаѣ есть ни что иное, какъ химической пай, т. е.— e , а v^2 должно быть пропорціонально теплоемкости, потому вместо $e \cdot c = e' \cdot c'$ будетъ $e \cdot v^2 = e' \cdot v'^2$; откуда $\frac{e}{e'} = \frac{v'^2}{v^2}$; по закону Дюлона, чѣмъ больше пай, тѣмъ менѣе теплоемкость и наоборотъ, или, иначе, чѣмъ больше пай, тѣмъ менѣе скорость (т. е. собственно квадратъ скорости); если же вѣсъ соединенныхъ паевъ одинаковъ, то и скорость ихъ движенія одинакова; чѣмъ они больше будутъ отличаться другъ отъ друга вѣсомъ, тѣмъ въ то же время они болѣе будутъ отличаться другъ отъ друга скоростями движеній. Съ возрастаніемъ температуры количество теплоты, т. е. количество движенія возрастаетъ, но

такъ какъ вѣсъ соединенныхъ частицъ не измѣняется, то, слѣдовательно, увеличивается одна скорость движенія, а вмѣстѣ и разница скоростей; незначительная разница движеній при низкихъ температурахъ при высокихъ можетъ дойти до большихъ размѣровъ.

Итакъ, мы видимъ, что разница скоростей, во-первыхъ, зависитъ отъ разницы вѣса химическихъ частицъ и, во-вторыхъ,—стъ температуры. Совершенно естественно допустить, что если соединенные частицы двигаются съ различными скоростями (имѣютъ ли онѣ другое число колебаній, или, что гораздо вѣроятнѣе, амплитуды колебанія другія), то эта различная скорость движеній будетъ стремиться разорвать ихъ взаимную связь; особенно если допустить, что съ возвышениемъ температуры увеличиваются амплитуды или радиусы качаній, то при извѣстной температурѣ разность этихъ радиусовъ, а слѣдовательно, и удаленіе частицъ другъ огъ друга будетъ такъ велико, что притяженіе не вѣ состояніи будетъ ихъ удерживать вмѣстѣ. Если бы не было первоначальной разницы скоростей, что можетъ быть только при равенствѣ вѣса паевъ, то возвышение температуры не измѣнитъ и взаимнаго разстоянія соединенныхъ частицъ (онѣ будутъ колебаться вмѣстѣ), и такое соединеніе не будетъ разлагаться¹⁾; но такъ какъ совершенного равенства паевъ на са-

1) Подобное объясненіе было уже предложено американскими учеными Дреперомъ для явлений разложения свѣта, напр.: *AgCl* разлагается потому, что свѣтъ приводить въ колебаніе частички хлора и серебра, но, если амплитуды колебанія этихъ двухъ элементовъ различны, то частички будутъ отставать одна отъ другой и, наконецъ, отрываться одна отъ другой. Дреперъ не обратилъ вниманія на вѣсъ паевъ и потому онъ только предполагаетъ различіе колебаній, но не выводить его изъ различія вѣса; слѣдовательно, онъ не могъ заранѣе вывести никакого заключенія о томъ, какія соединенія должны легче и преимущественно разлагаться; а между тѣмъ къ дѣйствію свѣта приложима та же аргументація; поэтому-то я совершенно могъ предвидѣть, что изъ соединеній серебра легче должно разлагаться отъ свѣта *AgO*, потомъ *AgCl* и, наконецъ,—*AgBr* и что *AgJ* должно разлагаться всего трудище или даже совсѣмъ не разлагаться; недавно Фишеръ, дѣйствительно, доказалъ опытами, что *AgJ* не разлагается свѣтомъ.

момъ дѣлъ не бываетъ, то, объясняя разложеніе соединеній отъ теплоты разницаю скоростей движения, зависящую отъ неравенства пасвъ, мы приходимъ къ заключенію, что не можетъ быть совершенного равенства скоростей (т. е., v никогда не будетъ $= v'$, а слѣдовательно, и $v - v'$ и $v^2 - v'^2$ никогда не будутъ равны нулю), а всегда будетъ существовать большая или меньшая разница, возрастающая съ температурой, слѣдовательно, каждое соединеніе имѣть предѣльную температуру существованія, которая будетъ тѣмъ выше, чѣмъ менѣе первоначальная разница скоростей, т. е. чѣмъ менѣе разница въ вѣсѣ соединенныхъ пасвъ. Такимъ образомъ, этотъ взглядъ приводить къ заключенію, которое уже отчасти принято въ наукѣ, что при очень высокихъ температурахъ не могутъ существовать соединенія, а только элементы, которые одни, если даже принять для многихъ парные атомы, удовлетворяютъ условію равенства скоростей. Но прежде чѣмъ температура достигнетъ до такого разрушающаго напряженія, она производить извѣстнаго рода распределеніе элементовъ.

Двойные разложения и при обыкновенной температурѣ, какъ мы видѣли, совершаются преимущественно по направлению равенства соединенныхъ пасвъ, вслѣдствіе большей прочности соединеній при такомъ распределеніи элементовъ; высокая температура, увеличивая еще непрочность соединеній неравныхъ пасвъ, будетъ, слѣдовательно, еще болѣе способствовать именно такому распределенію элементовъ, при которомъ должны образоваться соединенія равныхъ или близкихъ къ тому пасвъ. Такимъ образомъ, если мы представимъ себѣ собраніе многихъ свободныхъ элементовъ въ пространствѣ, нагрѣтому до высокой температуры, то соединенія, которыхъ образуются при этихъ обстоятельствахъ, будутъ наиболѣе удовлетворять упомянутому условію. Такого рода распределеніе элементовъ мы отчасти замѣтили въ минеральныхъ веществахъ нашей планеты.

Кремній и глиній находятся исключительно въ соединеніяхъ кислородомъ или въ видѣ свободныхъ окисей, или, чаще, въ

соединений между собою (пай и теплоемкость *Si*, *Al* и *O* очень близки между собою); съ другой стороны, и большая часть кислорода находится именно въ соединенияхъ съ этими двумя элементами, такимъ образомъ, три элемента, составляющіе главную часть земной коры, распределены согласно равенству паче.

Хлоръ соединенъ преимущественно съ натріемъ и частью съ каліемъ; фторъ преимущественно съ кальціемъ—отношеніе паче 19:20 (почти 1:1); изъ обыкновенныхъ соединеній серебра встрѣчается юдистое серебро. Углеродъ также находится (и во всякомъ случаѣ находился) почти исключительно въ видѣ углекислоты, хотя соединенные количества относятся какъ 3:8; но такъ какъ въ углекислотѣ двѣ частицы кислорода, то отношеніе между вѣсомъ соединенныхъ частицъ на самомъ дѣлѣ 6:8; при томъ относительно углерода, а также и водорода, можно сказать, что они соединены именно съ тѣмъ не металлическимъ элементомъ (кислородомъ), пай котораго наиболѣе подходитъ къ ихъ пайю, такъ какъ всѣ другіе магаллониды имѣютъ высокій пай. Что же касается до самого кислорода въ водѣ (гдѣ отношеніе паче 1:8 или частицъ какъ 1:16), то это нисколько не противорѣчить выскажанному правилу о распределеніи элементовъ на землѣ, потому что кислородъ находится въ избыткѣ. Вся кора земли состоитъ изъ окисленныхъ соединеній, въ которыхъ главную роль играютъ окиси *Al* и *Si* и только, такъ сказать, остатокъ кислорода соединенъ съ водородомъ и все таки есть еще свободный кислородъ и можно съ большою вѣроятностью допустить, что образованіе воды послѣдовало послѣ образованія кремнезема и глинозема.

Химическія явленія, разсмотрѣнныя мною въ предыдущихъ статтяхъ, а именно—явленія простого замѣщенія, двойного замѣщенія и вліянія на нихъ температуры, я старался объяснить механическимъ строеніемъ элементовъ. Это объясненіе, основанное на сравненіи аналогическихъ элементовъ, позволило мнѣ устраниТЬ понятіе обѣ особенной силѣ сродства, замѣнивъ ее болѣе определенными данными. Такъ напр., разница химиче-

скихъ свойствъ калія и платины удовлетворительно объясняется различиемъ ихъ строенія: частички калія гораздо далѣе отстоять другъ отъ друга, чѣмъ частички платины, и массы ихъ болѣе, чѣмъ вдвое меньше массъ частичекъ платины; слѣдовательно, калій представляеть несравненно менѣе сопротивленія для химического дѣйствія. Даже, какъ мы видѣли, частички калія не удаляются другъ отъ друга во время соединенія, тогда какъ частички платины въ этомъ случаѣ должны значительно раздѣгаться. Двойные разложенія, напр., происходящія между AgO и KJ , $AgCl$ и KJ по направленію $AgCl$ и $AgJ+KO$ и KCl также объясняются достаточно, съ точки зренія механическаго строенія, стремлениемъ элементовъ располагаться въ сторону большаго притяженія и, слѣдовательно, большей прочности.

Вліяніе температуры на химическія явленія также согласуется и съ этимъ воззрѣніемъ и механическою теоріей теплоты. Такимъ образомъ, вмѣсто неопределеннаго понятія, вмѣсто простого заявленія факта замѣщенія одного элемента другимъ во имя сродства, я старался показать, что эти явленія суть необходимыя слѣдствія самаго строенія тѣлъ.

Но, не смотря на то, что многія химическія явленія получаются такимъ образомъ болѣе рациональное объясненіе и большее научное значеніе, я долженъ сознаться, что главное и существенное явленіе химіи то, которое ученые давно уже обозначили *избирательными сродствами*, т. е. стремленіе разнородныхъ элементовъ соединяться другъ съ другомъ,—остается не объясненнымъ и не можетъ быть объяснено однимъ вліяніемъ тѣхъ же условій механическаго строенія.

Если понятно, почему серебро вытѣсняется цинкомъ, а KJ съ AgO даетъ двойное разложеніе, то не понятно главное, почему калій соединяется съ кислородомъ, хлоромъ, даже съ юдомъ, а не съ серебромъ или цинкомъ. Если смѣшать два металла и два галоида въ пайныхъ пропорціяхъ, то всякому известно, что получается только соединеніе металловъ съ галоидами, не смотря ни на какое различіе въ вѣсѣ паевъ и хотя

бы другое расположение элементовъ (т. е. соединеніе металла съ металлами) и болѣе удовлетворяло бы этому условію. И это, конечно, никакъ не показываетъ невѣрность самаго правила, а доказывается только, что самое явленіе другого рода, и что тутъ действуютъ такія условія, которыхъ не проявляются при двойныхъ и простыхъ замѣщеніяхъ.

Обратившись къ разсмотрѣнію взаимныхъ отношеній сходныхъ и несходныхъ между собою элементовъ, я сдѣлаю попытку дать некоторое объясненіе этому существенному для химіи явленію. Хотя вопросъ этотъ не относится непосредственно къ предмету настоящей статьи, но объясненія, мною предложенные для явленій замѣщенія, могутъ показаться неполными и даже невѣрными, если бы я не показать различія и вообще отношенія этихъ явленій къ явленіямъ прямого соединенія, потому я не могу совершенно обойти ихъ.

§ 5.

Соединенія сходныхъ и несходныхъ тѣлъ.

Сравнивая то, что происходитъ при соединеніи между собою сходныхъ элементовъ съ происходящимъ при соединеніи разнородныхъ элементовъ и сравнивая продукты обѣихъ реакцій, оказывается, что различие этихъ двухъ явленій заключается не столько въ симметріи самой реакціи, сколько *въ различной степени измѣненія* первоначальныхъ химическихъ свойствъ, которое проявляется въ свойствахъ образовавшихся соединеній. Съ точки зрѣнія симметріи (на которую въ настоящее время только и обращаютъ вниманіе), реакціи эти могутъ быть одинаковы, напр., $ClCl + KK = KCl + KCl$ и $ClCl + BrBr = ClBr + ClBr$ или $KJ + AgCl = AgJ + KCl$; — повидимому, во всѣхъ случаяхъ происходятъ одни и тѣ же явленія,—но какая, однако, существенная разница между ними.


Тогда какъ при соединеніи хлора съ калиемъ отдѣляется громадное количество теплоты, при соединеніи брома съ хлоромъ ничего подобного не происходитъ; но главная разница заклю-

чается въ томъ, что элементарныя свойства хлора и калія во время соединенія исчезаютъ, образуя продуктъ KCl , не имѣющій никакихъ свойствъ первоначальныхъ своихъ составныхъ частей; напротивъ того, $ClBr$ представляеть почти безъ всякаго измѣненія сумму свойствъ хлора и брома: дѣйствіе его на другія тѣла ничѣмъ не отличается отъ дѣйствія смѣси хлора и брома—такія же соединенія и, конечно, такое же отдаленіе теплоты. То же можно сказать и про большую часть соединеній металловъ съ металлами, при которыхъ получаются сплавы почти со средними физическими свойствами и съ суммою химическихъ. Хотя всѣ эти явленія могутъ вообще быть названы химическими, но степень или напряженность химического дѣйствія, т. е. измѣненіе химическихъ свойствъ, весьма различное. Всѣдѣствіе малой напряженности химизма, явленіе этого утрачиваетъ даже ту математическую опредѣленность и простоту, которою оно вообще характеризуется. Тогда какъ хлоръ и калій соединяются только въ одной пропорціи и KCl нельзя уже болѣе соединить ни съ хлоромъ, ни съ каліемъ, сплавы, напротивъ того, могутъ быть получены всѣхъ возможныхъ составовъ, и въ большей части случаевъ сплавъ равныхъ наевъ ничѣмъ не будетъ отличаться отъ ближайшихъ къ нему по составу сплавовъ. Различіе всѣхъ этихъ явленій, какъ я уже замѣтилъ, не можетъ быть объяснено разницей притяженій, зависящей отъ массъ и разстояній частицъ. Приближеніе однородныхъ и разнородныхъ элементовъ, въ силу этихъ условій, можетъ быть одинаково или, пожалуй, оно можетъ быть сильнѣе между однородными.

Для уясненія же этихъ вопросовъ необходимо обратиться къ изученію явленій, сопровождающихъ тѣ и другія химическая реакціи, и проникнуть, если можно, еще глубже въ строеніе матеріи. Если привести въ прикосновеніе хлоръ съ бромомъ и каліемъ, то, конечно, частички хлора будутъ оказывать притяженіе безразлично и на частички брома и калія, сообразно массамъ и разстояніямъ; будетъ ли оно сильнѣе въ отношеніи брома или калія, это вопросъ второстепенный, но вся сущность заключается

въ томъ, что произойдетъ отъ прикосновенія хлора съ бромомъ—съ одной стороны и отъ прикосновенія хлора съ калиемъ—съ другой; отдѣленіе теплоты только въ послѣднемъ случаѣ указывается намъ на это, и теплогѣ этой больше неоткуда взяться, какъ изъ самихъ соединяющихся частичекъ хлора и калия; съ другой стороны, элементарные свойства хлора и калия совершенно утратились, и, чтобы опять возвратить имъ эти свойства, мы должны имъ опять придать ровно столько теплоты, сколько ея отдѣлилось при ихъ соединеніи,—следовательно мы въ правѣ сказать, выражая только голый фактъ, что химическія свойства хлора и калия выдѣлились въ видѣ теплоты; но если теплота есть родъ движенія и можетъ происходить только отъ другого (соответствующаго ей количества) движенія, то необходимо допустить, что частички или атомы хлора и калия въ свободномъ состояніи обладаютъ извѣстнымъ количествомъ движенія, которое выдѣляется вполнѣ или отчасти при ихъ соединеніи и, такъ какъ извѣстно, что въ какихъ бы обстоятельствахъ не соединились бы между собою эти элементы, образованіе хлористаго калия сопровождается всегда отдѣленіемъ одного и того же количества теплоты, т. е. что KCl , какъ и всѣ другія соединенія, имѣть опредѣленный и постоянный термохимическій эквивалентъ, то очевидно, что это отдѣленіе теплоты, или потеря частичнаго движенія, есть необходимое *следствіе и условіе* подобнаго соединенія; напротивъ того, хлоръ и бромъ, соединяясь между собою, сохраняютъ все свое первоначальное или элементарное движеніе, оттого нѣтъ отдѣленія теплоты и нѣтъ утраты химическихъ свойствъ. Въ этомъ, конечно, и заключается вся существенная разница этихъ двухъ явлений. Различное состояніе элементовъ и соединеній можно представить такимъ образомъ: если m , m' и m'' будуть обозначать первоначальный запасъ элементарного движенія K , Cl и Br , а n —потеря движенія во время соединенія, K^m , $Cl^{m'}$ и $Br^{m''}$ —выражаетъ состояніе свободныхъ элементовъ, а $K^{m-n/2} + Cl^{m'-n/2}$ и $Cl^{m'} + Br^{m''}$ выражаетъ ихъ состояніе въ соединеніи; сумма силъ до соединенія калия съ хлоромъ была

$m+m'$, а послѣ соединенія $m+m'-n$, въ хлористомъ же бромѣ мы полагаемъ, что сумма силь $m'+m''$ осталась безъ измѣненія; конечно, можетъ быть, и въ этомъ случаѣ произошла потеря, а сумма соединенія также выразится $m'+m''-n$; но n , во всякомъ случаѣ, должно быть очень мало, сравнительно съ $m'+m''$, а KCl , напротивъ того, n , по всей вѣроятности, подходитъ близко къ $m+m'$ и величина $m+m'-n$, можетъ быть, приближается къ нулю. Однако, въ настоящее время ничего неизвѣстно про величины m , m' и m'' , а опять дается только приблизительно величину n . Мы даже не знаемъ, теряютъ ли оба элемента во время соединенія одинаковое количество движенія, хотя это гораздо вѣроятнѣе: если иѣтъ, то величина n должна состоять изъ двухъ неизвѣстныхъ слагаемыхъ $x+y=n$, тогда, напр., соединеніе элементовъ хлористаго калія выразится:



Но если при соединеніи хлора съ каліемъ движеніе уничтожается и вместо $m+m'$ получаемая величина $m+m'-n$ можетъ близкая къ нулю, а при соединеніи хлора съ бромомъ, напротивъ того, первоначальный запасъ $m'+m''$ остается почти безъ измѣненія, то мы въ правѣ заключить, что элементарные движенія калія и хлора (различныхъ элементовъ) таковы, что они взаимно уничтожаются; а элементарные движенія хлора и брома (аналогическихъ элементовъ), напротивъ того, могутъ только прибавляться другъ къ другу: въ этомъ, конечно, и заключается существенное различіе частичекъ калія и другихъ металловъ отъ частичекъ хлора и подобныхъ ему элементовъ. Этимъ объясняется и различіе явлений, происходящихъ при прикосновеніи хлора съ каліемъ, съ одной стороны, и хлора съ бромомъ—съ другой: движенія первой пары элементовъ интерферируютъ, а движенія второй согласны между собою и только прибавляются одно къ другому. Если это дѣйствительно такъ, а это только необходимый выводъ изъ фактовъ, то понятно, что когда хлоръ, бромъ и калій находятся вмѣстѣ, то частички Cl и K , приде-


въ прикосновеніе, вслѣдствіе общаго свойства притяженія, тѣряютъ (т. е. взаимно уничтожаютъ) свое первоначальное движение и, слѣдовательно, приходятъ уже въ то сравнительно покойное состояніе, которое онѣ имѣютъ въ соединеніи, отъ чего и образуютъ между собою *прочное соединеніе*¹⁾, которое не можетъ быть иначе разложено, какъ только возвращеніемъ этого потерянного движенія; частички брома не могутъ отнять у хлористаго калія хлора и выдѣлить калій, вступивши сами въ соединеніе съ хлоромъ, потому что онѣ не могутъ ему возвратить его движенія, во-первыхъ, потому, что это движеніе другого рода и можетъ быть только передано частичкамъ хлора, которыя онѣ бы только замѣстили, а, во-вторыхъ, уже потому, что частички калія не могутъ болѣе интерферировать съ движениемъ частичекъ брома; наконецъ, если бы рядомъ съ частичками калія и образовался бы *ClBr*, то въ силу того, что *Cl* и *Br* въ этомъ соединеніи сохраняютъ свое элементарное движение, частички калія тотчасъ разрушатъ это соединеніе, интерферируя съ движениемъ хлора или брома (или обѣими элементами), и образуютъ покойныя сложныя системы *KCl* и *KBr*.

¹⁾ Тутъ, пожалуй, является и другая причина болѣе прочнаго соединенія, а именно та, что частички хлора и калія, потерявши свое первоначальное движение (вѣроятно,—большую часть), вслѣдствіе этого могутъ болѣе сблизиться и оказывать поэтому другъ на друга сильнѣйшее притяженіе; это я основываю на томъ, что съ большою вѣроятностью можно допустить, что движение отдельныхъ частицъ играетъ роль силы отталкивателной, препятствующей большему ихъ сближенію, и потому, по мѣрѣ утраты этого движенія, притягательная сила все болѣе и болѣе сближаетъ частицы (не то ли мы видимъ въ строеніи нашей солнечной системы: развѣ не движение планетъ препятствуетъ имъ упасть на солнце?); это предположеніе подтверждается еще тѣмъ, что въ большей части случаевъ соединенія занимаютъ меньшій объемъ, чѣмъ объемъ составныхъ частей. Матерія, по мѣрѣ соединенія, сжимается, такъ: во всѣхъ хлористыхъ и бромистыхъ соединеніяхъ объемъ соли значительно менѣе суммы объемовъ металла и галоида (относительно жидкаго состоянія хлора и брома).

Только что изложенное динамическое объясненіе явлений избирательного сродства есть только логический выводъ изъ фактовъ. Основываясь преимущественно на термохимическихъ явленіяхъ, подлежащихъ измѣренію, оно, можно сказать, не заключаетъ въ себѣ ничего гипотетического, но, если бы мы захотѣли сдѣлать еще шагъ впередъ, т. е. объяснить, почему элементарные движенія однихъ элементовъ (*K*, *Na* и др.) интерферируютъ съ движеніями другихъ (*Cl*, *Bг* и т. д.) и не интерферируютъ между собою, тогда нужно уже оставить твердую почву непосредственного опыта и войти въ міръ гипотезъ. Конечно, тутъ можно руководствоваться аналогією, такъ какъ многія физическая и чисто механическая явленія представляютъ многочисленный рядъ случаевъ интерференцій или взаимнаго уничтоженія силъ; но, вообще говоря, нѣть достаточныхъ оснований принять тотъ или другой способъ движенія, которымъ должны между собою отличаться элементы; поэтому я нахожу излишнимъ входить здѣсь въ дальнѣйшія подробности по этому вопросу и ограничусь только нѣкоторыми общими замѣчаніями.

Какимъ бы родомъ движенія ни обладали атомы или, вѣроятнѣе, атомическая система,—существование самаго движенія врядъ ли можетъ подлежать сомнѣнію и должно служить основаниемъ всякой динамической теоріи, которая только одна возможна въ химії при настоящемъ состояніи вопроса о соотношеніи физическихъ силъ. Ученіе объ элементарномъ движеніи, какъ основной причины химическихъ свойствъ и явлений, имѣетъ то важное преимущество предъ оставленной теперь электрохимической теоріей, что въ основаніи ея лежитъ общее начало материальныхъ силъ, которое можетъ существовать и проявляться во всѣхъ возможныхъ видахъ и потому вполнѣ согласуется съ полнымъ разнообразiemъ химическихъ свойствъ элементовъ и даетъ возможность понять противоположность этихъ свойствъ безъ дуализма, къ которому приводить электрохимизмъ.

Фактическимъ основаніемъ динамической теоріи, какъ мы видѣли, служатъ термохимическая изслѣдованія, и потому я за-



Тип. А. Дарре.

Н. Н. Бекетовъ—съ послѣднимъ выпускомъ студентовъ физико-химического отдѣленія. 1887 г.

канчиваю свой трудъ нѣкоторыми ука^заніями на значеніе чи-
словыхъ данныхъ, сюда относящихся.

§ 6.

Термохимическія явленія.

Количество теплоты, отдѣляющееся при химическихъ соединеніяхъ можетъ служить, какъ мы видѣли, до извѣстной степени мѣрою напряженности химического процесса и, следовательно, мѣрою того измѣненія, которое свободные элементы претерпѣваютъ, вступая въ соединеніе. Такъ, изъ результатовъ Фавра и Зильбермана и др. можно замѣтить вообще, что вытѣсняющіе элементы отдѣляютъ болѣе теплоты, нежели вытѣсняемые: хлоръ болѣе брома, бромъ болѣе іода, натрій болѣе цинка, а цинкъ болѣе серебра; но это только приблизительная параллель двухъ явленій.

Сравнивая количество теплоты, отдѣляющейся при извѣстной реакціи, съ другими сопровождающими ее измѣненіями, легко замѣтить, что числа, данныя опытомъ, даже направленныя на явленія растворенія и сжиманія газовъ (или, вообще,—измѣненія физического состоянія), не могутъ быть между собою сравниваемы, потому что они не выражаютъ одного простого явленія, т. е. теплоту соединенія, а представляютъ сумму, по крайней мѣрѣ, двухъ главныхъ факторовъ, которые, повидимому, не находятся между собою въ какомъ-нибудь постоянномъ отношеніи. Это два фактора: количество теплоты отъ самаго акта соединенія (или нейтрализаціи свойствъ) и отдѣленіе или поглощеніе теплоты вслѣдствіе измѣненія объема, относя его къ жидкому или твердому состоянію; если объемъ продукта менѣе объема составныхъ частей, т. е. произошло скатіе, то понятно, что при этомъ отдѣляется извѣстное количество теплоты, которое слѣдуетъ вычесть изъ всей теплоты, отдѣляющейся при образованіи соединенія и, наоборотъ, въ случаѣ расширенія, вслѣдствіе соединенія, къ наблюдаемой теплотѣ слѣдуетъ прибавить ту, которая была потрачена на расширеніе.

На самомъ дѣлѣ бываютъ оба случая, но чаще первый; въ немногихъ случаяхъ объемъ продукта равенъ суммѣ объемовъ составныхъ частей. Напр., соединеніе хлора и брома съ металлами сопровождается болѣе или менѣе значительнымъ сжатиемъ для KCl съ 72 до 37 почти вдвое, хлористаго свинца съ 36 до 24, $AgCl$ съ 37 до 26, $PbBr$ съ 36 до 27, $AgBr$ съ 37 до 29; напротивъ того, соединеніе свинца и серебра съ юдомъ сопровождается расширениемъ съ 34 до 38 и для AgJ съ 36 до 42; не смотря на это различіе измѣненій объемовъ, во всѣхъ этихъ случаяхъ отдѣляется теплота.—Это показываетъ, конечно, что отдѣленіе теплоты происходитъ не отъ одного измѣненія объемовъ, иначе бы при образованіи, напр., юдистаго свинца было бы поглощеніе теплоты, а между тѣмъ отдѣляется 23000 единицъ теплоты—почти столько, сколько отдѣляется при соединеніи брома съ серебромъ (25000 ед.), при которомъ происходитъ сжатіе.

Тѣмъ не менѣе, однако, измѣненіе объемовъ идетъ параллельно количеству отдѣляющейся теплоты; большимъ количествамъ теплоты соответствуетъ обыкновенно и наибольшее сокращеніе объема, а наименьшее замѣчается при увеличеніи объема. Такъ, самое сильное сжиманіе при образованіи хлористаго калия—первоначальный объемъ уменьшается почти вдвое и теплота наибольшая около 10000 ед.; за KCl по сжиманію и отдѣленію теплоты сгѣдуется $NaCl$ и т. д.; изъ трехъ галоидовъ большее сжиманіе производить хлоръ, меньшее юдъ и, наконецъ,— PbJ и AgJ представляютъ явленіе расширенія при своемъ образованіи и при томъ наименьшее отдѣленіе теплоты. Это прямо указываетъ, что количество теплоты, отдѣляющееся при химическихъ соединеніяхъ, въ связи съ измѣненіемъ объемовъ, хотя и не производится только имъ однимъ, слѣдовательно, количество теплоты, или такъ называемый (весьма неудачно) термохимическій эквивалентъ соединеній, есть сумма или разница количествъ теплоты происходящей отъ самого акта соединенія, и теплоты (поглощаемой или отдѣляемой) отъ измѣненія количества вещества.

ненія об'єма, сопровождаючого це соединеніе, и можеть бути вираженъ такимъ образомъ: $T=X+B$ (1), гдѣ T есть наблюданое количество теплоты или термохимической эквивалентъ, X —теплота отъ самаго соединенія или нейтрализації свойствъ, а B —теплота отъ измѣненія об'єма.

Энергія химического дѣйствія выражается преимущественно величиною X , которую нельзя опредѣлить непосредственно, но B , выражая теплоту измѣненія об'єма, которое въ большей части случасевъ извѣстно, можетъ бути до нѣкоторой степени, хотя приблизительно, опредѣлено. Только такие исправленные термохимические эквиваленты (X) можно между собою сравнивать и судить по нимъ о силѣ химического дѣйствія.

Итакъ, для полученія X необходимо обратиться къ опредѣленію B ; если бы дѣло шло о теплотѣ при измѣненіи об'єма одного тѣла (простого или сложнаго), опредѣленіе это не представляло бы никакихъ особыхъ затрудненій: измѣненіе об'єма D извѣстно; отношение D къ d къ коэффициенту расширенія, т. е. $\frac{D}{d}$, выражать то число градусовъ ($\pm t$), на которое слѣдовало повысить или понизить температуру тѣла, чтобы произвести въ немъ наблюданое измѣненіе об'єма, а $\frac{D}{d}$ (или t), умноженное на теплоемкость тѣла C , т. е. $\frac{D}{d} \cdot C$ (или $\pm t \cdot C$) выразить все количество теплоты, которое поглотится или отдѣлится отъ измѣненія об'єма; т. е. будетъ равно B , слѣдовательно, мы получимъ $B = \frac{D}{d} \cdot C$ (2); если коэф. расширенія d и теплоемкость C —извѣстны, то опредѣлится и B ; но, къ несчастью, такое простое выраженіе для B не примѣнимо въ данномъ случаѣ, потому что мы имѣемъ дѣло не съ единичными тѣлами, а съ двумя, которые измѣняютъ свой об'ємъ во время своего соединенія, и изъ которыхъ каждый имѣть и свой коэффициентъ расширенія и свою теплоемкость; но главное затрудненіе еще не въ этомъ, а въ томъ, что мы хотя знаемъ общее измѣненіе об'єма, но не знаемъ, насколько измѣняется

объемъ каждого элемента, и мнѣнія на этотъ счетъ могутъ быть различны, такъ какъ непосредственнымъ наблюденіемъ невозможно разрѣшить этого вопроса. Мы или можемъ допустить, что оба элемента подвергаются равному измѣненію объема, такимъ образомъ, напримѣръ, при образованіи KCl и хлоръ, и калій сжимаются почти вдвое и въ соединеніи занимаютъ объемы, пропорціональные своимъ прежнимъ объемамъ, слѣдовательно, въ большей части случаевъ, различные; или, напротивъ того, предположивши, что элементы занимаютъ въ соединеніи равные объемы, измѣненіе объема (v) каждого элемента выразится отношеніемъ разницы объемовъ $(\frac{V}{2} - v)$ къ первоначальному объему, т. е.

$$D = \frac{V}{2} - v; \text{ это измѣненіе можетъ быть весьма различно для каж-} \\ \underline{v}$$

даго элемента, и можетъ случиться, что, тогда какъ одинъ элементъ расширяется, то другой, напротивъ того, сжимается, слѣдовательно, и калорическая дѣйствія будутъ противоположныя: первый элементъ поглощаетъ теплоту, а второй отдѣляетъ ее, смотря по тому, какое изъ этихъ двухъ¹⁾ предположеній принять въ основаніе для опредѣленія B и численное значеніе ся будетъ различно. Второе предположеніе, т. е. что элементы занимаютъ въ соединеніи равные объемы, кажется, впрочемъ, болѣе вѣроятнымъ: въ самомъ дѣлѣ, напр., въ данномъ объемѣ галоидной соли, гдѣ есть частица K , тамъ и частица Cl , слѣдовательно, число частицъ K и Cl одинаково, потому можно допустить, что объемы ихъ одинаковы, т. е. что каждый элементъ какъ бы занимаетъ половину всего объема галоидной соли. Принявши это предположеніе, мы получимъ слѣдующее выраженіе для B : уравненіе (2) приметъ видъ: $B = \frac{D}{d} \cdot C + \frac{D'}{d'} \cdot C'$.

¹⁾ Могутъ быть еще и другие способы рассматривать измѣненіе объемовъ.

но $D = \frac{V}{2} - v$, а $D' = \frac{V}{2} - v'$ или $D = \frac{V - 2v}{2v}$, а $D' = \frac{V - 2v'}{2v'}$ и

$$B = \frac{V - 2v}{2v \cdot d}, \quad C + \frac{V - 2v'}{2v' \cdot d'}, \quad C' \quad (3).$$

Величины V , v , v' (эквив. объемовъ) и C , C' (теплоемкость) для большей части элементовъ извѣстны, но не такъ для d -и d' (коэф. расширения), которые опредѣлены для немногихъ только металловъ и неизвѣстенъ, напр., для хлора; такой недостатокъ отымаєтъ возможность получить рядъ чиселъ B , а слѣдовательно, и X , т. е. исправленныхъ термохимическихъ эквивалентовъ для сравненія ихъ между собою, а въ этомъ случаѣ только и важно сравненіе, отдельные же величины X не имѣютъ большого интереса, и я только для примѣра приведу нѣсколько величинъ B , вычисленныхъ по формулѣ (3). Я, впрочемъ, и не могъ имѣть здѣсь въ виду удовлетворительное разрѣшеніе этого вопроса и самую формулу (3) могу считать только приблизительно выраждающею теплоту измѣненія объема, такъ какъ обстоятельства этого измѣненія не вполнѣ еще извѣстны. Я хотѣлъ только указать на важность этого обстоятельства (т. е. измѣненія объемовъ) при обсужденіи термохимическихъ явлений въ связи съ напряженностью химического дѣйствія. Формулою (3) я желалъ выразить отношеніе различныхъ величинъ и наглядно представить, хоть приблизительно, математическое значеніе B .

Въ примѣръ приложенія формулы (3) привожу таблицу термохимическихъ эквивалентовъ и другихъ данныхъ для галоидныхъ соединеній серебра и хлористаго калія.

Чэквив. объемъ соеди- нений	Эквив. объемовъ состав. частей		Т количество теплоты при соеди- неніи по <i>F.</i> и <i>S.</i>	<i>B</i> количество теплоты, отдѣляющей- ся (+) или поглощаю- щейся (-) отъ измѣненія объемовъ	<i>T-B=X</i> теплота, отдѣляющ., отъ измѣненія хими- ческихъ свойствъ	<i>d</i> и <i>d'</i> кубический коэф. расши- рения	
	Метал- ловъ <i>v</i>	Гало- идовъ <i>v'</i>					
<i>KCl</i>	37,4	45,4	26,7	+ 100960	+ 17183	83777	<i>Ag</i> 0,00005973
<i>AgCl</i>	26	10,35	26,7	+ 34800	- 30651	65451	<i>Br</i> 0,001264
<i>AgBr</i>	29,6	10,35	26,7	+ 25618	- 41861	77479	<i>J</i> 0,000856
<i>AgJ</i>	42,7	10,35	25,5	+ 18651	- 107757	126408	<i>Cl</i> 0,0013 ¹⁾ <i>K</i> 0,000243 ²⁾

Для калія и хлора (въ жидкомъ состояніи) коэф. расширения еще неизвѣстны, и я пробовалъ ихъ вычислить на основаніи слѣдующихъ соображеній. Естественно было допустить, что коэффиціентъ расширения твердыхъ и жидкіхъ тѣлъ находится въ зависимости отъ ихъ строенія, какъ напр., отъ разстоянія частицъ, т. е. огъ уд. в. и эквивалента. И, въ самомъ дѣлѣ, сравнивая эти величины, можно замѣтить, что съ уменьшеніемъ числа частицъ въ единицѣ объема (т. е. съ увеличеніемъ разстоянія $n = \sqrt[3]{r}$, гдѣ n —число частицъ, а r —разстояніе) коэффиціентъ расширения увеличивается. Такое отношеніе очень естественно объясняется меньшимъ сопротивленіемъ удаленія частицъ при большемъ ихъ первоначальному разстояніи. Замѣчательно, что

¹⁾ Вычислены.

²⁾ Вычислены.

Вертгеймъ (Ann. de ch. et ph. 1848) нашелъ уже отношение числа частицъ въ единицѣ объема къ коэффициенту сопротивленія металловъ при разрывѣ. Я пришелъ къ тому, что коэффициентъ расширения для отдельныхъ группъ металловъ обратно пропорционаленъ числу частицъ въ единицѣ объема $n = \frac{\delta}{e}$ или, что все равно, прямо пропорционаленъ кубу разстояній r^3 . Такимъ образомъ, зная коэффициентъ расширения одного изъ металловъ группы, можно вычислить по немъ всѣ остальные. Такое отношение имѣетъ коэффициентъ расширения *Pb*, *Fe*, *Ag* и *Sn*, а *Zn*, *Cd* и *Cu* составляютъ другую группу, имѣющую нѣсколько большій коэффициентъ расширения. Калій я отнесъ къ первой группѣ и вычислилъ его коэффициентъ расширения по серебру и свинцу; хлоръ—по брому. Прежде меня Vogell (Pogg. Ann. T. III. 1860) указываетъ также на подобное отношение, но вместо r^3 онъ береть r^4 и не раздѣляетъ металловъ на группы.



Тип. А. Дарре.

Академикъ Н. Н. Бекетовъ. 1902 г.

О взаимномъ обмѣнѣ галоидныхъ солей въ расплавленіи состояній.

Академика Николая Бекетова, при ближайшемъ сотрудничествѣ
Влад. Бекетова.

(Доложено въ засѣданіи Физико-математического отдѣленія 19 марта 1903 г.).

Вопросъ о распределеніи элементовъ между собою во время обмѣна сложныхъ соединеній давно занимаетъ многихъ химиковъ, для чего и производились изслѣдованія различными методами; но въ большинствѣ этихъ изслѣдованій не обращалось вниманія на вліяніе атомныхъ вѣсовъ и эквивалентовъ на направление реакціи. Предполагая, что атомные вѣса или вообще дѣйствующія другъ на друга химическія массы (эквт.) должны непремѣнно оказывать вліяніе на направление реакціи, я окончательно въ этомъ убѣдился при обзорѣ химическихъ соединеній и ихъ взаимныхъ реакцій и тогда же (въ 1859 и затѣмъ въ 1865) нашелъ возможнымъ высказать такое правило: химическіе элементы при равныхъ валентностяхъ стремятся распределиться такъ, чтобы большіе по вѣсу атомы соединялись съ большими, а меньшіе съ меньшими; въ случаѣ же различія эквивалентности атомы замѣняются эквивалентами — я это вкратцѣ выразилъ: стремленіемъ къ соединенію по возможности равныхъ массъ или атомовъ (при одинаковой эквивал.). Такимъ образомъ, если мы имѣемъ системы двухъ положительныхъ (A и A') элементовъ и двухъ отрицательныхъ (B и B'), то, согласно этому правилу, эти элементы такъ между собою распредѣляются, что сумма произведеній атомныхъ вѣсовъ образовавшихся соединеній будетъ больше соответствующей суммы противоположной системы,

то есть, что $A B + A'B' < AB' + A'B$, принимая, что A и B принадлежать элементамъ съ наибольшими атомными вѣсами, а A' и B' наименьшимъ. Напр., если мы имѣемъ элементы Li (7), Cs (133), Cl (35,5) и I (127), то, находясь въ атомныхъ (эквивалентныхъ) пропорціяхъ, они распредѣляются такимъ образомъ, что юдь соединится главнымъ образомъ съ цезиемъ, хлоръ съ литиемъ; такъ какъ $127 \times 133 + 35,5 \times 7 = 16891 + 248,5 = 17139,5$ больше $127 \times 7 + 35,5 \times 133 = 889 + 4721,5 = 5610,5$ и чѣмъ больше будетъ эта разница, тѣмъ это яснѣе выразится въ относительныхъ количествахъ распределенія элементовъ. Это положеніе было мною высказано, какъ на основаніи наблюдавшихъ въ природѣ наиболѣе распространенныхъ соединеній, такъ и на основаніи теоретическихъ соображеній, что, во-первыхъ, такое распределеніе элементовъ соотвѣтствуетъ наибольшему притяженію, которое во всякомъ случаѣ (отъ чего бы оно не зависило) должно быть пропорционально взаимодѣйствующимъ массамъ, а во-вторыхъ, способствуетъ наибольшему погашенію (нейтрализаціи) присущей элементамъ энергіи (вѣроятнаго атомнаго движенія). Въ эпоху, когда мною въ первый разъ высказано было правило о стремленіи элементовъ соединяться въ направленіи равенства атомныхъ вѣсовъ и паевъ, для многихъ случаевъ химическихъ соединеній еще не были опредѣлены теплоты ихъ образованія. Имѣя однако указанное сейчасъ предположеніе о болѣйшей нейтрализаціи свойствъ, можно было уже заранѣе предвидѣть, что и тепловой эффектъ пойдетъ также въ томъ же направленіи, то есть системамъ, болѣе соотвѣтствующимъ распределенію атомныхъ вѣсовъ къ равенству, будетъ соотвѣтствовать и наибольшее отдаленіе теплоты. Впослѣдствіи, когда накопилось много термохимическихъ опредѣленій, благодаря работамъ Томсена и Бертело и уже выяснилось отношеніе между выдѣленіемъ тепла и общимъ направленіемъ реакціи и Бертело рѣшился высказать свой извѣстный законъ о наибольшей работѣ, я получилъ возможность сравнить термохимическія данныя съ предложенными мною правиломъ и могъ убѣдиться, что оба правила идутъ въ одну сторону и на основаніи этого я уже могъ предсказать нѣко-

торыя термохимическія даннія для реакцій, для которыхъ эти даннія еще не были опредѣлены. Для опытного доказательства этого предположенія и были предприняты мною изслѣдованія и сдѣланы опредѣленія теплоты образованія безводныхъ окисей щелочнныхъ металловъ и нѣкоторыхъ ихъ галоидныхъ солей. Эти опредѣленія въ большинствѣ случаевъ оправдали мои предсказанія. Стремленію элементовъ образовать соединенія съ возможно близкими атомными вѣсами я придалъ еще другое значеніе—а именно отношение его къ прочности соединеній при высокой температурѣ, то есть къ температурѣ ихъ диссоціації.

По механической концепціи тепла и на основаніи закона Дюлонга и Пти о равной теплоемкости атомовъ слѣдуетъ, что тепловые движения атомовъ будутъ тѣмъ болѣе различны, чѣмъ различнѣе ихъ атомные вѣса и потому и самая прочность такой системы по отношенію къ температурѣ будетъ тѣмъ ниже, чѣмъ болѣе атомные вѣса, соединенные между собою, будутъ отличаться другъ отъ друга и уклоняться отъ равенства. Это положеніе подтверждается многими известными примѣрами изъ явленій диссоціаціи, но я все таки (въ 1872 году) предпринялъ для подтвержденія этого правила изслѣдованіе совмѣстно съ Чернаемъ о температурѣ начала диссоціаціи SH_2 , SeH_2 и TeH_2 . Сравнительно съ температурою диссоціаціи воды OH_2 , оказалось, что эта температура падаетъ отъ кислорода къ tellуру, т. е. по мѣрѣ увеличенія атомнаго вѣса элемента, соединеннаго съ водородомъ, и при таѣй большой разницѣ атомныхъ вѣсовъ, какъ для TeH_2 $\frac{125}{2}$ образующееся соединеніе, какъ я тогда замѣтилъ, начинаетъ разлагаться и диссоціація достигаетъ до конца уже при обыкновенной температурѣ и въ темнотѣ. Съ другой стороны и происходящее при соединеніи сжатіе, отнесенное къ твердому или жидкому состоянію, также связано, какъ не разъ было мною высказывало, съ количествомъ выдѣляющейся при соединеніи теплоты, а следовательно и съ соединеніемъ въ близкихъ вѣсовыхъ пропорціяхъ, идущихъ, какъ было выше сказано, въ ту же сторону.

Все это вмѣстѣ, затрагивая существенные стороны механизма химическихъ реакцій, придаетъ этому вопросу высокую степень научнаго интереса, почему я и предпринялъ рядъ изслѣдований, могущихъ дать новые факты для подтвержденія или опроверженія упомянутыхъ теоретическихъ соображеній.

Понятно, что разъясненіе этого вопроса лучше всего можетъ быть выведено изъ опредѣленія распределенія элементовъ при двойныхъ обмѣнахъ, особенно при обмѣнахъ солей, имѣющихъ аналогичное строеніе. Нельзя сказать, чтобы этимъ вопросомъ не занимались другіе ученые до меня; и многія цѣнныя наблюденія и выводы сдѣланы двумя русскими химиками. Прежде всего я долженъ упомянуть о тщательномъ и въ высшей степени плодотворномъ изслѣдованіи профессора Густавсона въ 1873 году, напечатанное въ журналѣ Русск. Химическ. Общества подъ заглавиемъ: Опытъ изслѣдованія реакціи обмѣна въ отсутствіи воды. Для этого изслѣдованія авторъ избралъ рядъ галоидангидридовъ неорганическихъ элементовъ въ виду возможности отдѣленія продуктовъ реакціи другъ отъ друга, а слѣдовательно и точнаго ихъ анализа химическимъ путемъ.

Не задаваясь повидимому цѣлью опредѣлить вліянія атомныхъ вѣсовъ на направленіе реакціи, хотя мною уже было гораздо ранѣе высказано правило о вліяніи соединяющихся массъ на направленіе обмѣна, авторъ тѣмъ не менѣе пришелъ къ слѣдующему заключительному выводу изъ своихъ опытовъ. Онъ говоритъ въ своемъ заключеніи (стр. 382, т. V. Ж. Р. X. Об.): чѣмъ болѣе атомный вѣсъ элемента (B, Si, Ti, As, Sn), тѣмъ болѣе хлора въ данномъ соединеніи (т. е. BCl_3 , SiCl_4 , TiCl_4 , AsCl_3 , SnCl_4) замѣщается бромомъ при дѣйствіи четырехбромистаго углерода и конечно наоборотъ.

Этотъ выводъ, сдѣланный авторомъ изъ своихъ опытовъ, согласуется какъ нельзя болѣе съ тѣмъ раньше мною высказаннымъ правиломъ о стремленіи элементовъ соединяться между собою такъ, чтобы большіе вѣса соединялись съ большими, а меньшіе съ меньшими, но они все-таки не довольно ясно выражаютъ это

стремлениe потому, что галоидангидриды взяты изъ разныхъ группъ элементовъ, что вводить разность въ чисто-химическихъ условiяхъ, то есть слишкомъ большую разницу химическихъ свойствъ элементовъ. Вліяніе этихъ специально химическихъ свойствъ можетъ конечно иногда преобладать и потому затемнять вліяніе относительныхъ массъ на ходъ реакцiи.

Другое чрезвычайно важное и интересное изслѣдованіе по вопросу о вліяніи атомныхъ вѣсовъ на ходъ химическихъ реакцiй сдѣлано также русскимъ химикомъ профессоромъ Потылицынымъ 3 года спустя послѣ изслѣдованій Густавсона. Хотя авторъ изслѣдованія А. Потылицынъ изслѣдовалъ не явленія двойного обмѣна, а только замѣщеніе одного галоида другимъ, какъ видно изъ заглавiя—Опыты надъ взаимнымъ вытѣсненiемъ галоидовъ (Журн. Р. Хим. Общ., т. VIII, 1876, стр. 193—210), но тѣмъ не менѣе его изслѣдованія и выводы, имъ сдѣланные, совершенно подходятъ къ занимающему меня вопросу.

Авторомъ высказанъ слѣдующiй законъ замѣщенiя хлора бромомъ при высокой температурѣ (около 400°); по мѣрѣ увеличенiя атомнаго вѣса въ аналогической группѣ элементовъ (следовательно съ одинаковой эквивалентностью) процентъ вытѣсненiя также растетъ и притомъ прямо пропорционально такъ, что атомный вѣсъ, дѣленный на процентъ замѣщенiя, является величиной

постоянной $\frac{P}{B} = \text{Const.}$; для первой группы металловъ перiодической системы эти постоянныя = 3,15; для слѣдующихъ группъ замѣчается то же, но процентъ замѣщенiя менѣе, а потому константа больше; далѣе оказалось, что по мѣрѣ увеличенiя эквивалентности атомовъ, не смотря на ихъ возрастающую величину, процентъ все уменьшается, а константа, следовательно, все возрастаетъ. Эти выводы автора также не только не противорѣчатъ моему правилу о стремлениi элементовъ соединяться въ сторону наибольшаго равенства дѣйствующихъ массъ, а прямо подтверждаютъ его: тѣмъ болѣе, что тогда же, когда мною было высказано это правило я выводилъ изъ него заключенiе, что въ случаѣ воз-

можного замѣщенія при нѣкоторыхъ условіяхъ болѣе энергического элемента, каковой здѣсь хлоръ, болѣе слабымъ, какъ здѣсь бромъ—стремленіе къ соединенію большихъ массъ съ большими будетъ способствовать такой обратной реакціи. Это даже сказалось во второмъ выводѣ А. Потылицына, что въ групахъ съ большою эквивалентностью процентъ замѣщенія все падаетъ. Если обратить вниманіе на то, что, идя по горизонтальному ряду періодической системы черезъ группы возрастающей значности, соединяющіяся съ галоидомъ массы все уменьшаются, такъ какъ и ихъ эквиваленты, т. е. $\frac{P}{n}$ (P —вѣсъ атома, а n число, означающее ихъ значность или атомность) уменьшаются, то понятно, что и стремленіе ихъ соединяться съ большимъ атомнымъ вѣсомъ уменьшается, а напротивъ стремленіе соединиться съ меньшимъ (хлоромъ) возрастаетъ; но такъ какъ въ числителяхъ все таки стоитъ атомный вѣсъ, то въ аналогичныхъ элементахъ (т. е. принадлежащихъ къ одной группѣ), стремленіе къ соединенію съ большою массою (бромомъ) все таки какъ и для первой группы возрастаетъ. Такимъ образомъ я считаю себя въ правѣ заключить, что оба изслѣдованія о вліяніи атомныхъ вѣсовъ на распределеніе элементовъ между собою въ общемъ согласуются съ моимъ правиломъ, хотя и не имѣли его въ виду.

Высказавъ уже давно (въ 1859 и 65 г.) свои взгляды о вліяніи атомныхъ вѣсовъ и эквивалентовъ на ходъ соченанія элементовъ между собою, я конечно не измѣнилъ съ тѣхъ поръ своего взгляда на этотъ вопросъ—тѣмъ болѣе, что и приведенные выше изслѣдованія Г. Густавсона и Потылицына согласуются съ этими взглядами, и съ своей стороны предпринимали разныя изслѣдованія для подтвержденія означенного правила.

Съ этою цѣлью были мною произведены опредѣленія теплотъ образования типическихъ однокислородныхъ соединеній щелочныхъ металловъ: литія, натрія, калія, рубідія и цезія. Я полагаю, что эта группа металловъ, состоящая изъ элементовъ чрезвычайно близкихъ между собою какъ по своей химической энергіи,

такъ и по многимъ химическимъ и физическимъ свойствамъ, можетъ послужить для доказательства примѣнимости моего правила. Такъ какъ я полагалъ, что теплота образованія химическихъ соединеній идетъ въ ту же сторону, какъ и стремленіе элементовъ къ соединенію въ наиболѣе близкихъ вѣсовыхъ масахъ (конечно при сходныхъ химическихъ условіяхъ), то я предположилъ, что малый эквивалентъ кислорода—8 по отношенію къ атомнымъ вѣсамъ сходныхъ между собою щелочныхъ металловъ долженъ проявить наибольшую энергию соединенія съ лигнемъ (отношеніе массъ $\frac{7}{8}$ или $\frac{7 \cdot 2}{16}$) и затѣмъ падать по направленію къ цезію по мѣрѣ возрастанія атомнаго вѣса, а для іода въ такомъ случаѣ наоборотъ.

Мои опредѣленія теплотъ образованія одно-окисей щелочныхъ металловъ и подтвердили это, такъ сказать, заранѣе составленное предположеніе. Окись литія при своемъ образованіи отдѣляется значительно больше теплоты чѣмъ остальныя, не исключая и цеія; прочность ея по отношенію къ дѣйствію угля и водорода также иллюстрируетъ это свойство. Въ сущности большія теплоты образованія окисей магнія и алюминія также говорятъ въ пользу моего правила.

Все это вмѣстѣ привело меня къ желанію предпринять новыя изслѣдованія для выясненія этого занимающаго меня такъ долго вопроса. Наиболѣе подходящимъ явленіемъ для разъясненія вліянія атомныхъ вѣсовъ обоихъ соединяющихся элементовъ, является конечно процессъ двойного обмѣна солей и при томъ солей близкихъ между собою элементовъ. Поэтому я, естественно, и выбралъ для изученія обмѣнъ, могущій произойти между галоидными солями щелочныхъ металловъ: но такъ какъ въ водномъ растворѣ такого обмѣна мы наблюдать не можемъ, то слѣдовательно и пришлось обратиться къ взаимодѣйствію солей въ отсутствіи растворителя—при ихъ сплавленіи. Чтобы узнать составъ полученнаго сплава пока представляется единственный способъ, уже испытаный съ этою цѣлью нѣкоторыми учеными, а именно: опредѣленіе

теплотъ растворенія сплавовъ, опредѣлилъ предварительно, въ тѣхъ же условіяхъ температуры и разжиженности, теплоты растворенія двухъ противоположныхъ смѣсей, напр. $AB + A'B'$ и $A'B + AB'$ или нагляднѣе $C\text{Na} + \text{ClK}$ и $\text{JNa} + \text{ClK}$.

Зная теплоты растворенія смѣсей, казалось бы, что полученная теплота растворенія сплава и должна показать сколько находится въ сплавѣ одной системы и сколько другой, что и покажетъ степень обмѣна двухъ солей. Въ дѣйствительности этого методъ и даетъ въ общемъ подобный результатъ, если были приняты во вниманіе могущія произойти во время сплавленія взаимныя вліянія солей помимо обмѣна. Для выясненія этихъ условій я и перейду къ изученію этого метода.

МЕТОДЪ.

Первый и самый главный вопросъ, который представляется при примѣненіи метода теплотъ растворенія сплавленныхъ солей, чтобы узнать какія соли образовались въ сплавѣ путемъ могущаго быть обмѣна, заключается въ томъ не происходитъ ли измѣненія другого рода, кромѣ обмѣна, которое могло бы измѣнить въ свою очередь теплоту растворенія и тѣмъ самымъ искаѣтъ результатъ опыта и вычисленія, внося въ него неизвѣстную величину. Во-первыхъ, можно предположить (какъ это одно время думалъ Бертело), что самый актъ сплавленія одной чистой соли на столько измѣняетъ ея молекулярное строеніе, что это можетъ повлиять на теплоту ея растворенія. Однако еще опыты Оствальда наѣ теплотой растворенія проплавленной и непроплавленной поваренной соли (CNa) не показали никакой разницы; мы повторили эти опыты и даже пробовали растворять смѣсь $\text{C}\text{Na} + \text{ClK}$, предварительно проплавленные каждая отдельно и ту же смѣсь изъ солей непроплавленныхъ, а только перекристаллизованныхъ и хорошо высушенныхъ и ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ никакой разницы не замѣтили. Такимъ образомъ первое возраженіе, которое можно сдѣлать противъ употребленія метода, которымъ

уже раньше меня пользовались Оствальдъ¹⁾ и Хрущовъ²⁾, отпадаетъ. Однако главное возраженіе противъ метода заключается въ возможности образованія двойныхъ солей, возможность, которую въ нѣкоторыхъ случаяхъ нельзя отрицать, а въ другихъ, гдѣ образованіе такихъ соединеній мало вѣроятно—все-таки не всегда можно подтвердить путемъ опыта. Имѣя это въ виду, я и выбралъ такія системы солей, какъ галоидныя соли щелочныхъ металловъ, для которыхъ не только неизвѣстны двойныя соли, но для которыхъ такія соединенія наименѣе вѣроятны. Съ другой стороны для этихъ солей, какъ представляющіхъ самыя простыя соединенія изъ двухъ одноатомныхъ (то есть одно-эквивалентныхъ по отношенію другъ къ другу) элементовъ, обмѣнъ могъ бы имѣть только одну форму реакціи. Тѣмъ не менѣе, какъ мы увидимъ далѣе, и для этихъ системъ или паръ солей происходятъ при сплавленіи нѣкоторыя взаимодѣйствія съ образованіемъ какого-то особенного молекулярного строенія, которое часто однако современемъ совсѣмъ повидимому исчезаетъ. Такой вопросъ ставилъ и Оствальдъ и для его разъясненія пробовалъ сплавлять смѣси такихъ солей, для которыхъ невозможенъ обмѣнъ—напр. двухъ солей съ разными металлами, но съ однимъ и тѣмъ же галоидомъ и для первого опыта взялъ сплавъ ClNa съ ClK, чтобы сравнить теплоту растворенія сплава съ теплотою растворенія такой же смѣси. Результаты его опытовъ чрезвычайно интересны и бросаютъ свѣтъ на измѣненія, которые могутъ происходить въ твердомъ тѣлѣ. Такъ сплавъ ClNa съ ClK въ эквивалентныхъ пропорціяхъ тотчасъ же послѣ сплавленія и быстраго охлажденія дадь очень малое поглощеніе теплоты при раствореніи—3,62 б. к. (почти на 40% менѣе) сравнительно съ смѣсью—5,97, но черезъ часъ, будучи сильно растергъ, дадь уже—4,7; а пролежавъ въ кускахъ 1 или 2 мѣсяца, уже дадь теплоту растворенія смѣси—5,97.

Сплавъ $\frac{\text{SO}_4\text{Na}_2}{2}$ и ClNa дадь меньшее отклоненіе, а черезъ 7 мѣ-


1) J. für Pr. Ch. т. 25. 1882, стр. 1—19.

2) Ж. Рус. Ф.-Х. Об., XV, 65.

сяцевъ показалъ ту же теплоту растворенія, какъ и смѣсь, нако-
нецъ сплавъ $\frac{\text{SO}_4\text{K}_2}{2} + \text{KCl}$ не показалъ разницы теплоты растворе-
нія и вскорѣ послѣ сплавленія. Принимая во вниманіе важность
этихъ опытовъ для изученія метода, мы повторили опыты Ост-
вальда, но только для галоидныхъ солей, но такъ, что въ одномъ
случаѣ былъ одинъ и тотъ же галоидъ при различныхъ метал-
лахъ, а въ другомъ два различныхъ галоида при одномъ и томъ
же металлѣ.

Наши опыты со сплавами не обмѣнивающихся солей ClNa
съ ClK и KCl съ JK дали результаты, нѣсколько отличные отъ
опытовъ Оствальда, хотя въ общемъ съ ними сходные. Кромѣ
влиянія времени и измѣненія на теплоту растворенія нами были
сдѣланы опыты для опредѣленія влиянія температуры на скорость
молекулярного переустройства сплава. Влияніе этихъ факторовъ
видно изъ прилагаемыхъ таблицъ.


I.



1 гр. молекула (двойная) въ 230 гр. молекулъ воды.

№	Темпера- туро- вре- мени	Время и температура сохраненія сплава до опыта
1.	5700	Не сплавленныхъ солей.
2.	5020	Свѣже-приготовленный и весьма мелко измель- ченный.
3.	4820	1 мѣсяцъ при комнатной температурѣ.
4.	4820	3 $\frac{1}{2}$ мѣсяца при комнатной температурѣ.
5.	4840	8 мѣсяцевъ при комнатной температурѣ.
6.	5055	8 мѣсяцевъ при комн. температурѣ и 3 дня при 85°.
7.	5070	8 мѣсяцевъ при ком. температ. и 9 дней при 85°.
8.	5175	8 мѣсяцевъ при комн. температ. и 16 дней при 85°.
9.	5395	12 часовъ при 190°.
10.	5285	12 часовъ при 190° и 22 ч. при 250°.
11.	5220	22 часа при 250°.
12.	5520	6 дней при 150° и 5 дней при 85°.
13.	5670	10 дней при 85° и 2 $\frac{1}{2}$ мѣс., при 22—25°.

II.



1 гр. молекула (двойная) въ 270 гр. молекулъ воды.

№ №	Теплота растворения	Время и температура сохраненія сплава до опыта
1.	9635	Не сплавленныхъ солей.
2.	9100	Свѣже-приготовл. и весьма мелко измельченный.
3.	8955	3 дня при комнатной температурѣ.
4.	8995	10 дней при комнатной температурѣ.
5.	9060	1½ мѣсяца при комнатной температурѣ.
6.	9140	3½ мѣсяца при комнатной температурѣ.
7.	9175	8 мѣсяцевъ при комнатной температурѣ.
8.	9290	8 мѣсяцевъ при комн. температ. и 3 дня при 85°.
9.	9325	8 мѣсяцевъ при комн. температ. и 9 дней при 85°.
10.	9110	3 дня при 85°.
11.	8860	48 часовъ при 150°.
12.	8775	6 дней при 150° и 5 дней при 85°.

Примѣчаніе. Сплавы сохранились измельченными. Въ строкахъ 3—8 I табл. и въ строкахъ 3—9 II табл. сплавы измельчены по возможности одинаково.

Изъ таблицы № I ($\text{NaCl} + \text{KCl}$) оказывается, что даже и послѣ 8 мѣсяцевъ сохраненія сплава при комнатной температурѣ сплавъ далъ отклоненіе теплоты растворенія на 15% отъ простой смѣси, но если онъ былъ мелко истолченъ, то даже свѣже-приготовленный далъ отклоненіе всего 12%. Что же касается до вліянія температуры, то оказалось, что нагрѣваніе до извѣстной температуры до 85° и 190° ускоряютъ молекулярное переустройство, но дальнѣйшее нагрѣваніе до 250° (№ опытовъ 10 и 11) показываютъ, что переустройство пошло въ обратную сторону и послѣдній опытъ (№ 13) показываетъ, что нагрѣваніе до 85° , но болѣе продолжительное достаточно, чтобы довести переустройство до конца (разница въ 30 м. к. совпадаетъ съ ошибк. набл.). Опыты со сплавомъ KCl съ KJ табл. II приводятъ къ тѣмъ же выводамъ. №№ 2—7 показываютъ медленное молекулярное переустройство отъ 3-хъ дней до 8-ми мѣсяцевъ; получилось отклоненіе отъ простой смѣси около 5%; затѣмъ опытъ № 9 показываетъ быстрое приближеніе къ смѣси при температурѣ не выше 85° (отклон. 3,2%) и обратный ходъ при 150° .

Несмотря однако на то, что методъ опредѣленія теплоты растворенія сплавленныхъ солей имѣетъ указанные опытомъ недостатки вслѣдствіе неполнаго тожества теплотъ растворенія смѣсей и сплавовъ, я все-таки нашелъ вполнѣ возможнымъ употребить его для рѣшенія вопроса о главномъ направленіи реакціи, такъ какъ отклоненіе отъ смѣси вообще говоря незначительны сравнительно съ тѣми разницами теплотъ растворенія, которыя наблюдаются для двухъ противоположныхъ системъ, для которыхъ имѣется въ виду произвести обмѣнъ. Это ясно видно при обзорѣ нижепомѣщенныхъ таблицъ нашихъ наблюдений.

Общіе результаты опытовъ, какъ Оствальда, такъ и нашихъ на дѣ теплотой растворенія сплавовъ, показываютъ, что сплавы эти вскорѣ послѣ ихъ приготовленія требуютъ меньшаго количества тепла для ихъ дезагрегаціи и затѣмъ мало-по-малу отъ времени, отъ умѣренного нагрѣванія приближаются къ состоянію смѣси и иногда вполнѣ доходятъ до этого состоянія, иногда

же не вполнѣ измѣняются до этого предѣла, даже и при довольно продолжительномъ сохраненіи (8 мѣсяцевъ). Нѣкоторые сплавы впрочемъ не представляютъ такого явленія (опытъ Оствальда), а сейчашь же поглощаютъ теплоты столько же, сколько и смѣси.

Какія же возможны объясненія этихъ замѣченныхъ явленій?

Слѣдуетъ замѣтить, что самыи фактъ уменьшенія потребленія теплоты на раствореніе прямо указываетъ на соотвѣтствующее уменьшеніе сїєленія частицъ; очевидно агрегація сплава вслѣдствіе разнородности частицъ уменьшается. Это собственно уже прямо говоритъ противъ образованія настоящихъ двойныхъ солей. Какъ же мы можемъ себѣ представить состояніе сплава. Я полагаю, что причина этого должна заключаться въ самомъ строеніи твердыхъ и особенно кристаллическихъ тѣлъ не изъ одной частицы, какъ это впрочемъ и принимается большинствомъ химиковъ и физиковъ, а въ силу этого частицы напр. поваренной соли въ твердомъ состояніи не представляютъ уже $CINa$, а $n(CINa)$, гдѣ n не менѣе 2.

Слѣдовательно естественно допустить, что при сплавленіи двухъ солей, между которыми даже и не можетъ произойти никакого химического обмѣна (напр. $CINa$ съ CIK или CIK съ JK) во время застыванія и кристаллизациіи образуются, такъ сказать, смѣшанныя частицы (называемыя нѣкоторыми учеными твердыми растворами), но такъ какъ частичные объемы ихъ не одинаковы, то эти смѣшанныя частицы вѣроятно имѣютъ меньшую степень агрегаціи (образуются вѣроятно съ меньшимъ отдѣленіемъ теплоты) и мало-по-малу стремятся перестроиться въ болѣе прочные агрегаты однородныхъ частицъ; напримѣръ (если $n=2$) $2(CINa, CIK)=CINa, CINa+CIK, CIK$ и т. д. Какъ бы то ни было, но съ этимъ явленіемъ приходится считаться, примѣняя этотъ методъ для опредѣленія распределенія элементовъ. Для системъ безъ обмѣна имѣется определенный предѣлъ измѣняемости молекулярнаго строенія—когда сплавъ даетъ теплоту растворенія смѣси, но для системъ обмѣнивающихся, которыхъ собственно и составляютъ предметъ настоящаго изслѣдованія такой предѣль неизвѣстенъ и

потому приходится довольствоваться тѣмъ признакомъ окончанія переустройства въ опредѣленную смѣсь 4-хъ солей, что самое измѣненіе теплоты растворенія прекратилось и принять слѣдовательно послѣднее опредѣленіе, если оно совпадаетъ съ предыдущимъ, отдѣленнымъ отъ него нѣкоторымъ временемъ—такъ конечно мы и старались поступить въ своихъ опытахъ, для чего сплавы сохранялись болѣе или менѣе продолжительное время и черезъ нѣкоторые промежутки опредѣлялась ихъ теплота растворенія, но понятно, что нельзя же было располагать неопределенно долгимъ срокомъ, такъ какъ и безъ того уже изслѣдованія растянулись на два слишкомъ года и я рѣшился представить тѣ выводы, которые уже, какъ я думаю, могутъ представить извѣстный интересъ и послужить для сужденія о правильности или неправильности моего первоначального предположенія о распределеніи элементовъ согласно наибольшей суммы произведеній атомныхъ вѣсовъ.

Опыты производились въ платиновомъ калориметрѣ емкостью въ $\frac{1}{2}$ литра. Хотя образующіеся растворы не всѣ были одинаковой крѣпости, но для каждой отдельной задачи, то есть для двухъ противоположныхъ системъ и ихъ сплава всегда соблюдалось условіе получения во всѣхъ 3-хъ случаяхъ растворовъ одинаковой крѣпости. Такимъ образомъ понятно могли получиться вполнѣ сравнимые результаты. На очистку солей обращено было самое тщательное вниманіе. Сплавленіе производилось въ стеклянныхъ цилиндрахъ въ струѣ сухого азота. Самое трудное условіе для успѣха практическаго выполненія изслѣдованія заключалось въ возможно полномъ устраненіи поглощенія влаги во время измельченія и взвѣшиванія солей, такъ какъ многіе изъ употребленныхъ нами солей, каковы напр. JNa и особенно CILi и JLi, принадлежать къ солямъ чрезвычайно гигроскопическимъ, поэтому необходимо было устраниТЬ всякую возможность гидратациіи этихъ солей. Для выполненія этой практической задачи былъ устроенъ особенного рода осушительный стеклянный шкафъ, въ которомъ, кромѣ сосудовъ съ осушающими веществами, помѣщались вѣсы

сь разновѣсками и принадлежностями для измельченія солей и ихъ сплавовъ. Для производства этихъ манипуляцій въ одной изъ стѣнокъ шкапа были плотно вдѣланы двѣ длинныя каучуковыя перчатки, черезъ которыя и производились въ шкапу работы. Самыя соли хранились въ этомъ шкапу еще въ особенныхъ экскаторахъ для того, чтобы при помѣщеніи въ шкапъ новыхъ сплавовъ и солей не подвергать уже прежде помѣщенныхъ въ немъ солей возможности притянуть влагу. Съ помощью всѣхъ этихъ приспособленій дѣйствительно достигалась цѣль, то есть возможность гидратациіи была устранена и анализъ столь гигроскопическихъ солей какъ CILi и JLi , истолченныхъ въ этомъ шкапу, давалъ близкія къ теоріи числа. Результаты опредѣленій теплотъ растворенія такимъ образомъ тщательно приготовленныхъ различныхъ системъ двухъ солей, сначала въ видѣ смѣсей, а затѣмъ въ видѣ сплава этихъ солей (безразлично въ какомъ распределеніи) приведены въ видѣ шести табличекъ, отдельно для каждой изъ шести испытанныхъ системъ. Эти шесть системъ обнимають всѣ комбинаціи, которые можно сдѣлать изъ четырехъ щелочныхъ металловъ: Li , Na , K , Cs и двухъ галоидовъ: Cl и J .

III.

Li , Na , Cl , J .

1 гр. молек. въ 230 гр. молекулъ воды.

Теп. раств. смѣси: $\text{LiCl} + \text{NaJ}$. . .	+ 10200 cal.
Теп. раств. смѣси: $\text{LiJ} + \text{NaCl}$. . .	+ 13435 cal.
Сплавъ свѣже-приготовленный . . .	+ 10605
Сплавъ черезъ 4 мѣс. по приготовл.	+ 10630
Сплавъ черезъ 8 мѣс. по приготовл.	+ 10395

Послѣднее число даетъ: 6% ($\text{LiJ} + \text{NaCl}$).

IV.

Li, K, Cl, J.

1 гр. молекула въ 180 гр. мол. воды.

Теп. раств. смѣси: LiCl + KJ . . .	+	3555
Теп. раств. смѣси: LiJ + KCl . . .	+	10325
Сплавъ свѣже-приготовленный . . .	+	3350
Сплавъ черезъ 4 мѣс. по приготовл.	+	3615
Сплавъ черезъ 8 мѣс. по приготовл.	+	3380

Предпослѣднее число даетъ 1⁰/₀ (LiJ + KCl)

V.

Li, Cs, Cl, J.

1 гр. молек. въ 340 гр. молек. воды

Т. раств. смѣси: LiCl + CsJ	+	185
Т. раств. смѣси: LiJ + CsCl	+	10330
Т. раств. сплава черезъ 4 мѣсяца по приготовлениі	+	380
Черезъ 8 мѣсяцевъ по приготовлениі	+	290

Послѣднее число даетъ 1⁰/₀ (LiJ + CsCl).

VII.

Na, K, Cl, J.

1 гр. молек. въ 150 гр. молек. H₂O.

Тепл. раствор. смѣси: NaCl + KJ . . .	— 6180
Т. раствор. смѣси: NaJ + KCl	— 2630
Т. раствор. сплава свѣже-приготовл. .	— 5580
Т. раствор. сплава черезъ 1 мѣсяцъ . .	— 5440
Т. раствор. сплава черезъ 4 мѣсяца . .	— 5320
Т. раствор. сплава черезъ 8 мѣсяцевъ. .	— 5390

Послѣднее число даетъ 22% (NaJ + KCl).

VIII.

Na, Cs, Cl, J.

1 гр. молек. въ 340 гр. молек. воды.

Т. раствор. смѣси: NaCl + CsJ	— 9455
Т. раствор. смѣси: NaJ + CsCl	— 2770
Т. раствор. сплава черезъ 4 мѣсяца . .	— 9140
Т. раствор. сплава черезъ 8 мѣсяцевъ. .	— 9190

Послѣднее число даетъ 4% (NaJ + CsCl).

VIII.

K, Cs, Cl, J.

1 гр. молек. въ 4бо гр. молек. воды.

Т. раствор. смѣси: KCl + CsJ	— 12780
Т. раствор. смѣси: KJ + CsCl. . . .	— 9750
Т. раствор. сплава черезъ 4 мѣсяца. . .	— 12005
Т. раствор. сплава черезъ 8 мѣсяцевъ.	— 12195

Послѣднее число даетъ 19% (KJ + CsCl).

Приведенные въ этихъ таблицахъ числа представляютъ среднія двухъ опредѣленій, обыкновенно очень близкихъ между собою. Въ каждой табличкѣ первыя двѣ строки выражаютъ теплоты растворенія двухъ противоположныхъ системъ (отъ тѣхъ же двухъ металловъ), а слѣдующія строки представляютъ теплоты растворенія сплавовъ, съ показаніемъ при нихъ процента системы, гдѣ юдь соединенъ съ металломъ наименшаго атомнаго вѣса; проценты эти вычислены по послѣднимъ опредѣленіямъ теплотъ растворенія наиболѣе долго хранившихся сплавовъ.

Просматривая эти таблицы, ясно бросается въ глаза преобладающее направление распределенія галоидныхъ элементовъ хлора и юда въ сторону наименшей разности соединенныхъ массъ и чѣмъ больше разница въ вѣсѣ атомныхъ двухъ металловъ, тѣмъ меньшій % юдистаго соединенія приходится на меньшій атомный вѣсъ; напр. при распределеніи юда между литиемъ и натриемъ на литій приходится 6%, а при его распределеніи между литиемъ и цезиемъ, на долю первого всего 1%; для системы Na, K, на долю натрія приходится уже 22%, а при распределеніи между Na и Cs на натрій приходится только 4%, но все-таки въ обоихъ случаяхъ больше, чѣмъ для литія, что конечно и слѣдовало ожидатъ

то же и относительно системы K, Cs на калій 19%, т. е. больше, чѣмъ для натрія и литія. Числа эти, вычисленные на основаніи теплотъ растворенія сплавовъ, нельзя конечно считать абсолютно вѣрными, т. е. они можетъ быть и не выражаютъ вполнѣ точно распределенія элементовъ между собою, потому что на теплоты растворенія сплавовъ, кромѣ состава образовавшихся солей, оказываются влияние и различные молекулярныя агрегаціи; но, какъ видно было изъ опытовъ, эти отступленія сравнительно съ величинами теплоты растворенія незначительны и если бы возможно было ихъ съ точностью узнать и ввести, какъ поправку, въ полученные нами числа, то они бы нисколько не измѣнили общей картины распределенія элементовъ и по всей вѣроятности относительныя величины, то есть отношенія процентовъ распределенія, остались бы тѣ же самыя. Итакъ я нахожу возможнымъ сдѣлать выводъ, что произведенные опыты надъ шестью системами подтвердили безъ одного исключенія общий принципъ стремленія элементовъ соединяться въ направленіи большихъ атомныхъ вѣсовъ съ большими и меньшими съ меньшими.

IX.

	D	$\frac{M \cdot Cl + M_1 \cdot J}{M \cdot J + M_1 \cdot Cl}$		%
		M · Cl + M ₁ · J	M · J + M ₁ · Cl	
Соли: Li и Na . . .	+ 4,0	1,8		94
Соли: Li и K . . .	+ 7,1	2,3		99
Соли: Li и Cs . . .	+ 10,7	3,0		99
Соли: Na и K . . .	+ 3,1	1,3		78
Соли: Na и Cs. . .	+ 6,7	2,3		96
Соли: K и Cs. . .	+ 3,5	1,9		81

Независимо отъ этого результата опытовъ, оказывается, что и теплоты образования этихъ системъ также больше при подобномъ же распределеніи элементовъ, чѣмъ при обратномъ. Для выясненія этого вывода и прилагается IX-я таблица. Въ ней подъ буквою D приведены разницы теплотъ образования (въ большихъ калоріяхъ) двухъ противоположныхъ системъ, а именно между тою системою, гдѣ хлоръ связанъ съ наименьшимъ атомнымъ вѣсомъ, а іоль съ наибольшимъ; какъ видно, вездѣ эта разница положительная, т. е. во всѣхъ случаяхъ, гдѣ элементы расположены согласно принципу приближенія къ возможному равенству соединенныхъ массъ и теплота образования больше; для наглядности сравненія результатовъ опытовъ теплотъ растворенія съ теплотами образования приведены и $\%$ хлористаго металла съ наименьшимъ атомнымъ вѣсомъ (эти числа дополнительныя до 100 къ приведеннымъ въ предыдущихъ таблицахъ), средняя между этими двумя рядами чиселъ показываетъ отношеніе суммы произведеній атомныхъ вѣсовъ при распределеніи большихъ съ большими къ суммѣ произведеній обратной системы. Сопоставляя всѣ эти три ряда, оказывается, что всѣ они идутъ въ одну и ту же сторону и въ этомъ среднемъ ряду чѣмъ больше отношеніе, тѣмъ большій процентъ хлора связывается съ меньшимъ атомнымъ вѣсомъ.

19-го Марта 1903 года.

Изъ письма Н. Н. Бекетова

на имя Предсѣдателя Общества физико-химическихъ наукъ

18 Ноября 1903 года.

Посылаю Вамъ двѣ статьи: 1) О значеніи періодической системы Д. И. Менделѣева и 2) О взаимномъ обмѣнѣ галоидныхъ солей въ расплавленномъ состояніи. Обратите въ первой вниманіе на стран. 20—21¹), где я еще разъ ясно высказываю мысль, что

¹) Научное обозрѣніе, 1903 г.—„Такое ясное доказательство справедливости той идеи, которая легла въ основаніе періодической системы, неизвѣстно вызываетъ потребность дать возможное объясненіе такой зависимости химическихъ и физическихъ свойствъ отъ атомныхъ вѣсовъ элементовъ, но, такъ какъ существование атомовъ элементовъ намъ неизвѣстно, то относительно этого вопроса могутъ быть высказаны только болѣе или менѣе вѣроятныя предположенія. Одна изъ такихъ наиболѣе, по моему мнѣнію, вѣроятныхъ гипотезъ заключается въ томъ, что періодический законъ выражаетъ собою законъ образованія элементовъ въ природѣ изъ какого нибудь первоначальнаго вещества, существовавшаго, а вѣроятно и теперь существующаго.

Такое предположеніе въ извѣстной степени подтверждается тѣмъ установленнымъ фактамъ, что не только материалъ нашей планетной системы, но и материалъ самыхъ отдаленныхъ звѣздъ и туманностей, какъ это показываютъ спектроскопическія изслѣдованія, содержать тѣ же самые земные элементы. Можно было бы поэтому предположить, что изъ сношенія первичной матеріи образовались по упомянутому закону химические элементы, послуживши материаломъ для образованія небесныхъ тѣлъ. Это согласовалось бы и съ тѣмъ общепринятымъ фактомъ, на которомъ особенно настаиваютъ астрономы, что въ міровомъ пространствѣ, находящемся между небесными тѣлами, нѣтъ настоящей вѣсомой матеріи, такъ какъ, по ихъ мнѣнію, она должна была бы оказывать достаточно сильное сопротивленіе, чтобы измѣнить нынѣ существующее движеніе, законы которого прочно установлены наукой.

періодической законъ есть собственно законъ образованія элементовъ изъ другого болѣе еще простого вещества и привожу для этого разные доводы. Въ настоящее время, когда Рамзей уже во второй разъ (вѣдь еще въ августѣ онъ писалъ сюда о превращеніи эмонаціи радія въ гелій и тогда же въ журналахъ, напр., Научное слово уже появилась статья—«Радій—источникъ гелія) заявляетъ и подтверждаетъ, что гелій является какъ бы превращеніемъ радія. Я съ своей стороны полагаю, что появленіе гелія еще не объяснено и потому возможны двѣ противоположныя гипотезы:

1) дѣйствительное превращеніе эмонаціи изъ вещества радія въ гелій—или

2) атомъ гелія вслѣдствіе своего строенія какъ бы сгущаетъ эфиръ и измѣняетъ его настолько, что является возможность образованія изъ него вполнѣ уже вѣсомаго вещества—эмонаціи и гелія. Можетъ быть эмонація есть переходное состояніе между эфиromъ и геліемъ. По этой второй гипотезѣ радій производить не разложеніе (элемента) или превращеніе, а *образованіе* элемента изъ болѣе подвижнаго и какъ бы химически неуловимаго вещества.

Такое предположеніе о томъ, что химические элементы не представляютъ уже собой первоначальной формы матеріи, не противорѣчить, конечно, никакъ той устойчивости и неизмѣнности атомныхъ вѣсовъ, которая присуща имъ при всѣхъ химическихъ реакціяхъ. Пишущему эти строки уже представлялся однажды случай высказать печатно ту мысль, что при образованіи элементовъ изъ нѣкотораго примордіального вещества, находящагося притомъ въ несравненно болѣе динамическомъ состояніи, произошла, вѣроятно, столь огромная затрата, или потеря живой силы, что обратное дѣйствіе, т. е. разложеніе элементовъ, потребовало бы примѣненія къ этимъ мельчайшимъ частичкамъ такого колосального количества энергіи, которымъ мы покамѣстъ не располагаемъ. Такое предположеніе ни мало не подрываетъ и не можетъ подрывать атомнаго представлениія химиковъ о химическомъ строеніи матеріи и вполнѣ согласно съ тѣмъ, что элементы являются какъ бы первымъ воплощеніемъ въ настоящую вѣсомую химическую матерію, а слѣдовательно никакъ не противорѣчить тому общепризнанному всѣми химиками факту, что химические процессы совершаются между атомами, которые, въ своемъ существѣ, въ своемъ вѣсѣ, вообще въ своей цѣлости, остаются неизмѣнными".

Можно было бы привести нѣкоторую аналогію съ извѣстными нынѣ явленіями. Напр., возьмемъ обыкновенный воздухъ, къ которому мы примѣшаемъ одинъ или два $\%$ водорода и введемъ въ этотъ воздухъ кусочекъ губчатой платины (даже и прямо чистый кусокъ платины)—мало-по-малу водородъ и кислородъ воздуха будутъ соединяться на поверхности платины и она немного нагрѣется и такое нагрѣваніе (т. е. отдѣленіе энергіи) можетъ продолжаться довольно долго, если запасъ воздуха (съ 1% водорода) достаточный или постоянно будетъ притекать. Это, конечно, отдаленная аналогія, но гипотеза возможная.

Что же касается до мѣста, которое слѣдуетъ отвести новымъ безразличнымъ элементамъ (неонъ, аргонъ, криptonъ и др.), то я полагаю, что они именно и должны находиться между концемъ горизонтальной строки и началомъ слѣдующей, напр., между *Fl* и *Na* (для аргона). Предложено считать ихъ нулевымъ (вертикальнымъ) рядомъ, съ котораго начинается система; но вѣдь если периодическую систему представить въ видѣ винта, то новые элементы и придется между электро-отрицательными и—положительными, чѣмъ бы объяснялась ихъ индифферентность.

СПИСОКЪ

научныхъ работъ Академика
Николая Николаевича Бекетова.

1853—1903.

Л. Клеман

— Конрадинъ дѣлъ одинъ при симъ въ садъ

Вопросъ о конрадинѣ. Въспомінаніе при бывшемъ
одиннадцати възрастѣ о мандаринской работе и объ-
манчивомъ послѣднѣмъ плодѣ, въсѣда засаженомъ
бывшими въсѣда чистиками — иссесомъ и синѣхъ
и чѣмъ ли не мандаринскими садѣрами.

Я обратилъ на конрадинъ вопросъ еще въ 1865^м годѣ,

Когда членъ Третьо вѣка изложилъ оправу о томъ, что

Тип. А. Дарре.

Докладъ Общ. физ.-хим. наукъ при Харьк. Унив. 20 Мая 1902 г.

Указатель журналовъ.

- Liebig's Annalen der Chemie (und Pharmacie).
- Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Academie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.
- Mélanges physiques et chimiques, tirés du Bulletin de l'Academie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.
- Mémoires de l'Academie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.
- Ізвѣстія Императорской Академіи Наукъ.
- Bulletin de la soci  t   chimique de Paris.
- Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.
- Chemisches Centralblatt.
- Comptes rendus de l'Academie des sciences de Paris.
- Jahresbericht   ber die Fortschritte der Chemie.
- Журналъ Русскаго Химическаго, съ 1873 года Физико-Химическаго, Общества.
- Протоколы Физико-химической секціи Общества опытныхъ Наукъ при Харьковскомъ Университетѣ; съ 1894 года: Труды Общества физико-химическихъ наукъ при Харьковскомъ Университетѣ.
- Химическій журналъ Соколова и Энгельгардта,
- Journal f  r praktische Chemie.



СПИСОКЪ

научныхъ работъ Академика Николая Николаевича Бекетова.

Составленъ Н. Валашко.

1853. О нѣкоторыхъ новыхъ случаяхъ химического сочетанія и общія замѣчанія обѣ этихъ явленіяхъ. Диссертациѣ. Петербургъ.
1854. Sur les phénomènes de copulation et les formules qui les expriment (Lu le 31 mars 1854). Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg T. XII, p. 369—378.—Mélanges phys. et chim. T. II, p. 94—106.—Journ. f. pr. Chem. LXII, 422.—Jahresb. 7, 374, (1854).
1859. О получениіи хлористаго бензоила. Bull. soc. chim. Paris, Séance du 11 Janvier 1859.—Ann. CIX, 256.—Chem. Centralb. 1859, 416.—Jahresb. 12, 312, (1859).
- Note sur l'action de l'hydrogène à différentes pressions sur quelques dissolutions métalliques. Compt. rend. XLVIII, 442.—Химич. Журн. Соколова и Энгельгардта I, 213.—Ann. CX, 312.—Journ. f. pr. Chem. LXXVIII, 315.—Chem. Centralb. 1859, 624.—Jahresb. 12, 66, (1859).
- О нѣкоторыхъ явленіяхъ восстановленія. Bull. soc. chim. Paris. Séance du 11 mars 1859, p. 22.—Химич. Журн. II, 24.—Repert. de chim. Avril 1859, 7 liv.—Ann. CX, 375.—Jahresb. 12, 131 и 196, (1859).
- Наблюденія надъ образованіемъ марганцовистой кислоты. Bull. soc. chim. Paris. Séance du 13 mai 1859.—Химич. Журн. II, 193.—Jahresb. 12, 179, (1859).

1864. Химическое изслѣдованіе Березовскихъ минеральныхъ водъ. Журн. Мин. Нар. Просв. 1864 г., (ч. 123), 873.
1865. Изслѣдованія надъ явленіями выг҃ененія однихъ элементовъ другими. Диссертациѣ. Харьковъ.—Jahresb. 18, 12, (1865).—Zeitschr. f. Chem. 1865, 376.—Phil. Mag. [4], XXXI, 306.
- Чѣмъ мы грѣемся зимою. Развитіе и современное состояніе свѣтописи. Два популярныхъ чтенія. Харьковъ.
1869. Образованіе муравьиной кислоты изъ угольной. Ж. Р. Х. Общ. I, 33.
- Снарядъ для сгущенія газовъ Ж. Р. Х. Общ. I, 34.
- Объ атомности элементовъ. Труды отдѣленія химіи II съѣзда естествоиспытателей въ Москвѣ.—Ж. Р. Х. Общ. I, 235.
- О новомъ случаѣ образования оксамида. Труды отдѣл. химіи II съѣзда естествоиспытателей въ Москвѣ.—Ж. Р. Х. Общ. I, 236.
- О состояніи атомовъ въ соединеніяхъ. Труды отдѣл. химіи II съѣзда естествоиспытателей въ Москвѣ. Ж. Р. Х. Общ. I, 242.
1870. О ціано-цианидѣ. Ж. Р. Х. Общ. II, 275. Berl. Ber. III, 872.
1871. Атомность хлора и фтора. Труды отдѣл. химіи III съѣзда естествоиспытателей въ Киевѣ. Ж. Р. Х. Общ. III, 249. Berl. Ber. IV, 933.
- съ Н. А. Чернаемъ. Наблюденія надъ диссоціаціей H_2Se и другихъ газовъ. Труды отдѣл. химіи III съѣзда естествоиспытателей въ Киевѣ. Ж. Р. Х. Общ. III, 253.
1873. Рефератъ объ изслѣдованіи Пьеира и Пиши надъ температурами кипѣнія не смѣшивающихся жидкостей. Прот. Физ.-Хим. Секц. Общ. оп. н. при Харьк. Унив. 1873 г., 9.
- съ Н. А. Чернаемъ. О диссоціаціи сѣрнистаго, селенистаго и теллуристаго водородовъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1873 г., 10. Ж. Р. Ф. Х. Общ. VII, (2), 16, (1875).

1873. О получении водородного спектра пропусканием тока черезъ палладиевые электроды въ струѣ водородного газа. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1873 г., 14.
- Демонстрація опыта Томсена надъ горѣнiemъ кислорода въ водородѣ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1873 г., 14.
- Объ огличіи элементовъ отъ сложныхъ соединеній. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1873 г., 26.—Ж. Р. Ф. Х. Общ. VII, (2), 13, (1875).
1874. Объ изслѣдованіи Гирна надъ прозрачностью пламени для свѣтовыхъ и тепловыхъ лучей. Прот. Ф. Х. Секціи О. оп. н. при Харьк. Ун. 1874 г., 1.
- О дѣйствіи водорода на растворъ азотнокислого серебра Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1874 г., 11.—Ж. Р. Ф. Х. Общ. VII, 34, (1875).—Berl. Ber. VII, 1795, (1874); VIII, 165, (1875).—Compt. rend. LXXIX, 1413.—Jahresb. 27, 290, (1874).
1875. О снарядахъ Менделѣева, употребляемыхъ для изученія законовъ сжимаемости газовъ (Рефератъ). Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1875 г., 1.
- О химической энергіи нѣкоторыхъ источниковъ свѣта Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. (Рефератъ) 1875 г., 7.
- О фотофонѣ Белля. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. Н. при Харьк. Ун. (Рефератъ).
- О теплотѣ соединенія угля съ водородомъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1875 г., 8.
- О вліяніи вѣсовыхъ массъ на реакціи замѣщенія и двойного обмѣна. Ж. Р. Ф. Х. Общ. VII, 93.—Bull. soc. chem. 23, 305.
- О присоединеніи элементовъ воды къ синероду. Ж. Р. Ф. Х. Общ. VII, 99. Bull. soc. chim. 23, 452.
1876. О нагрѣваніи соляныхъ растворовъ водянымъ паромъ при температурѣ 100° до температуры выше 100°. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1876 г., 9.

1876. О дѣйствіи окиси серебра на юдистый калій въ отсутствіи воды. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1876 г., 10.
1877. Объ отношеніи числа частицъ въ единицѣ объема къ температурѣ плавленія элементовъ въ группѣ щелочныхъ металловъ, а также и къ твердости ихъ. Прот. Ф. Х. Секц. О оп. н. при Харьк. Ун. 1877 г., 9.
1878. О растворимости окиси серебра въ водѣ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1878 г., 13.
- О теплотѣ соединенія безводной окиси натрія съ первой частицею воды. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1878 г., 21.
1879. О теплотѣ соединенія окиси натрія съ водой и кислородомъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1879 г., 5.
- Объ опредѣленіи удѣльного вѣса пара по способу Мейера. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1879 г., 10.
- О дѣйствіи ангидрида угольной кислоты на безводную окись натрія. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1879 г., 18.
- Опредѣленіе теплоемкости водорода въ его сплавѣ съ палладиемъ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XI, 4—Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1878 г.—Berl. Ber. XII, 686.—Bull. Soc. chim. [2], 31, 197.—Jahresb. 32, 91, (1879).
- Опредѣленіе теплоты гидратациіи безводной окиси натрія и объ отношеніи натрія къ Ѣдкому нагру и водорода къ безводной окиси натрія. (Предвар. сообщ.). Ж. Р. Ф. Х. Общ. XI, 130.—Berl. Ber. XII, 856.—Jahresb. 32, 128.
- Разложеніе окиси натрія водородомъ и соединеніе окиси натрія съ углекислотой. Прот. Химич. Секціи VI съѣзда русскихъ естествоиспыт. и врачей. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XII, (2), 7, (1880).—Berl. Ber. XIII, 2391, (1880).—Bull. Soc. chim. [2], 34, 328, (1880).—Jahresb. 33, 110, (1880).

1879. О возможности взаимной связи посредствомъ одноатомныхъ элементовъ. Прот. Химич. секції VI съѣзда русск. естествоиспыт. и врачей. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XII, [2], 23, (1880).
1880. Объясненіе процесса одновременного осажденія нѣсколькоихъ металловъ при употребленіи электродовъ, представляющіхъ сплавъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1880 г.
- Опытное изслѣдованіе дѣйствія угольного ангидрида на сѣрнистый кальцій въ присутствіи воды и обѣ искусственнымъ получениіи сѣры изъ гипса. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1880 г.
- О добываніи сѣры изъ гипса. Отдѣльн. брошюра.
- О соотношеніи между выдѣляющимся количествомъ теплоты и химическимъ сродствомъ при явленіяхъ взаимнаго вытѣсненія галоидовъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1880 г.
- Опытныя изслѣдованія по вопросу о взаимномъ вытѣсненіи галоидовъ въ соляхъ и обѣ отношеніи этого явленія къ явленіямъ диссоціаціи. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1880 г.
- Динамическая сторона химическихъ явлений. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XII, 1. Отдѣльн. брошюра.—Харьковъ. 1886 г.
1881. Къ вопросу о взаимномъ вытѣсненіи галоидовъ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XIII, 44.—Berl. Ber. XIV, II, 2052.—Jahresb. 34, 14.
- Обѣ окиси калія (предварит. сообщеніе) Ж. Р. Ф. Х. Общ. XIII, 394.—Berl. Ber. XIV, II, 2058.—Bull. Soc. chim. [2], 37, 491.—Jahresb. 34, 204; 35, 263 (1882).
- О дѣйствіи металлическаго калія на юдкое кали (предварит. сообщеніе). Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1881 г., 1.
- О содержаніи цинка въ водѣ харьковскихъ домовыхъ водопроводовъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1881 г., 18.
- О взаимномъ вытѣсненіи металловъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1881 г., 19.

1881. О приготовлениі и нѣкоторыхъ свойствахъ безводной окиси калія. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1881 г., 22.
- О дѣйствіи окиси углерода на безводную окись натрія. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1881 г., 38.
- О новомъ приборѣ для анализа газовъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1881 г., 42.
- Recherches sur la formation et les propriétés de l'oxyde de sodium anhydre. Mémoires de l'Academie de St.-Pétersbourg. VII-e Serie, T. XXX, № 2, 1—16.
1882. Дополненіе къ химической исторіи соединеній литія. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1882 г., 15.
- Объ элементахъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. Н. при Харьк. Ун. 1882 г., 32.
1883. Объ измѣненіи объема при образованіи металлическихъ окисей. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1883 г., 11.
- Объ окисяхъ щелочныхъ металловъ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1883 г., 22.
- Къ вопросу о предѣлѣ вытѣсненія металловъ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XV, 57.—Berl. Ber. XVI, I, 775.—Bull Soc. chim. [2], 40, 71.—Jahresb. 36, 12.
- Изслѣдованіе образованія и свойства безводной окиси натрія. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XV, 277.—Berl. Ber. XVI, II, 1854.—Jahresb. 36, 345.
- Объ окиси литія. Прот. химич. секціи VII съѣзда русскихъ естествоиспыт. и врачей. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XV, (2), 374.—Bull. Soc. chim. [2], 41, 311, Jahresb. 37, 210 (1884).
- Объ отношеніи температуры диссоціаціи къ теплотѣ образованія и относительному вѣсу соединенныхъ атомовъ. Прот. химич. секціи VII съѣзда русскихъ естествоиспыт. и врачей. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XV, (2), 383.—Bull. Soc. chim. [2], 41, 317.
1884. О растворахъ вообще. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1884 г., 6.

1884. Термохимическая изслѣдованія соединеній рубидія. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1884 г., 40.
1885. О получении металлическаго рубидія. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1885 г., 4.
- О вліяніи воды на явленія окисленія и горѣнія. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1885 г., 75 и 80.
- Объ аммоніи. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1885 г., 81.
1886. О вліяніи постороннихъ газовъ на взрывчатыя газовыя смѣси. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1886 г., 1.
- Памяти Александра Михайловича Бутлерова. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1886 г., 15.
- О германіи—новомъ элементѣ, открытомъ Винклеромъ. (Рефератъ). Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1886 г., 51.
- О фторѣ въ свободномъ состояніи. (Рефератъ). Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1886 г., 51.
1887. Объ измѣненіи объема при образованіи металлическихъ окисей. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XIX, 57.—Berl. Вег. XX, III, 189.—Chem. Centralb. 1887, 449.—Jahresb. 40, 80.
- Къ вопросу о теплотѣ замѣщенія однихъ элементовъ другими. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьков. Ун. 1887 г., 2.
- Объ избирательномъ химическомъ сродствѣ. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьков. Ун. 1887 г., 12.—Ж. Р. Ф. Х. Общ. XX, 525, (1888).
- О нѣкоторыхъ свойствахъ металлическаго рубидія. Прот. Ф. Х. Секц. О. оп. н. при Харьк. Ун. 1887 г., 15.
1888. О получении металлическаго рубидія и о теплотѣ его окисленія и гидратации. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XX, 363.—Berl. Вег. XXI, III, 424.—Jahresb. 41, 363.
- Recherches sur l'nergie de combinaison. Les oxydes de potassium et de lithium. Bull. de l'Acad. de St. Petersbourg.

XXXII, 186—193.—Mélanges phys. et chim. T. XII,
743—754.—Jahresb. 41, 323.

1889. Étude sur l'énergie de combinaison du rubidium, premier article, le préparation du métal. Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg XXXIII (Nouvelle série I), 117.—Mélanges phys. et chim. XIII, 25—26.
- Sur l'énergie de l'oxydation du rubidium (2^{me} article). Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg. XXXIII (N. sér. I), 173.—Mélanges phys. et chim XIII, 67—69.—Jahresb. 42, 238.
- О теорії диссоціації електролітівъ Арреніуса. Прот. Физ. Хим. Коммісії Імп. Общ. любителей естествознанія и проч. 1889 г., 28 сенг.—Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXI, (2), 175.
- съ А. Д. Чирковымъ. О возстановлениі кремнезема магніемъ съ образованіемъ кремнистаго магнія. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXI, 88.
1890. О возстановлениі магніемъ окисей литія, натрія, калія, рубидія и цезія (по поводу ст. Вінклера). Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXII, 75.
- Нѣкоторыя физическая данныя о цезіи. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXII, 364.
- Sur le réduction du césium. Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg XXXIV (N. sér. II), 169.—Mélanges phys. et chim. XIII, 163—164.
- Des propriétés physico-chimiques du césium et son hydrate. Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg. XXXIV (N. sér. II) 171.—Mélanges phys. et chim. XIII, 165—166.
- Expériences sur l'influence de la vapeur d'eau et de différents de gaz sur la combustion d'un mélange d'oxyde de carbone et d'hydrogène. Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg XXXIV (N. sér. II), 175—Mélanges phys. et chim. XIII, 169—171.
- Основныя начала термохимії. 4 лекції. Москва.
1891. Note sur la chaleur de combinaison du brome et de l'iode avec le magnésium. Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg.

XXXIV (N. sér. II), 291.—*Mélanges phys. et chim.* XIII, 219—220.

1891. О теплотѣ растворенія безводныхъ бромистаго и юдистаго литія. *Ж. Р. Ф. Х. Общ.* XXIII, 261.
1892. Détermination thermochimique de l'action du césium métallique et de son oxyde anhydre sur l'eau. *Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg.* XXXV (N. sér. III) 541—544. *Mélanges phys. et chim.* XIII, 259—262.—*Jahresb.* 1894, 560.
1893. De l'action de l'hydrogène sur l'oxyde de césium anhydre. *Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg.* XXXVI (N. sér. IV), 247—249.—*Mélanges phys. et chim.* XIII, 325—327.—*Jahresb.* 1894, 561.
- De quelques propriétés physico-chimiques de sels haloïdes du césium. *Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg.* XXXVI, (N. sér. IV), 197—199.—*Mélanges phys. et chim.* XIII, 321—323.—*Jahresb.* 1894, 562.
- О дѣйствіи водорода на безводную окись цезія. *Ж. Р. Ф. Х. Общ.* XXV, 433.
1894. Химическая энергія въ природѣ. *Дневникъ IX Съѣзда русскихъ естествоиспыт. и врачей.*
- съ А. А. Щербачевымъ. О новомъ способѣ приготовленія щелочныхъ металловъ. *Изв. Имп. Акад. наукъ* (V серія) Т. I, № 1, 61—63.—*Jahresb.* 1894, 559.
- Объ одной изъ вѣроятныхъ причинъ возрастанія молекулярной электропроводности по мѣрѣ разжиженія соляныхъ растворовъ. *Ж. Р. Ф. Х. Общ.* XXVI, 65.
- Памяти А. П. Эльтекова. *Ж. Р. Ф. Х. Общ.* XXVI, 385.
- О значеніи атомныхъ и молекулярныхъ объемовъ жидкихъ и твердыхъ тѣлъ. *Труды О. Ф. Х. наукъ при Харк. Ун.* 1894 г., 23.
- съ А. А. Щербачевымъ. О новомъ способѣ приготовленія металлическаго цезія. *Ж. Р. Ф. Х. Общ.* XXVI, 145.
- Физическая химія и Русское Химическое Общество. *Ж. Р. Ф. Х. Общ.* XXVI, приможеніе, стр. 16.

1895. Памяти Пастера. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXVII, 436.
1896. Объ измѣненіи объема при образованіи юдистаго серебра изъ элементовъ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXVIII, 212.—Bull. soc. chim. 16, (3 sér.), 1498.
- Изслѣдованіе измѣненія объема при образованіи юдистаго серебра изъ элементовъ и удѣльный вѣсъ жидкаго юда. Изв. Имп. Акад. Наукъ, Т. IV, № 4, апрѣль.
1897. Объ окисяхъ и перекисяхъ щелочныхъ металловъ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXIX, 74.
- О непосредственномъ окислениіи металлическаго калія. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXIX, 143.
- Памяти А. А. Щербачева. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXIX, 350.
1898. Прямое опредѣленіе теплоты образованія галоидныхъ соединеній. Бромистый алюминий. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXX, 874.—Изв. Имп. Акад. Наукъ Т. X, № 1 (1899 г., январь).
- Атмосфера земли во времени. Проток. засѣданій секціи химіи X Съѣзда русскихъ естествоиспыт. и врачей въ Кіевѣ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXX, (2), 218.
1899. Памяти М. Д. Львова. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXXI, 395.
- Опредѣленіе теплоты соединеній галоидовъ съ металлами прямымъ путемъ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXXI, 399.
- О сплавленіи изоморфныхъ и неизоморфныхъ солей. Замѣчаніе по поводу сообщенія г. Курнакова. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXXI, 976.
1901. Исторія Химической Лабораторіи при Академіи Наукъ. Ломоносовскій сборникъ. Москва 1901 г., стр. 33.
- Воспоминанія химика о прожитомъ науково въ XIX столѣтіи. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXXIII, 163.
1902. О физическихъ наукахъ. Прот. засѣд. секціи химіи XI Съѣзда естествоиспыт. и врачей въ Петербургѣ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXXIV (2), 16.
- О періодической системѣ Д. И. Менделѣева по отношенію къ новымъ газамъ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXXIV, 432.

1902. О значеніи періодичної системи Д. И. Мендел'єва. Научн.
обозр. 1902, II.
- Къ вопросу о направлении двойного обмѣна при сплавленіи
солей. Труды О. Ф. Х. наукъ при Харьк. Ун. 1902 г., 17.
1903. О химической энергіи въ связи съ явленіями, предста-
вляемыми радиемъ. Ж. Р. Ф. Х. Общ. XXXV, 189.
- О взаимномъ обмѣнѣ галоидныхъ солей въ расплавленномъ
состояніи. Изв. Имп. Акад. Наукъ Т. XVIII, № 5.