

болѣвшей матки или ея придатковъ, всюду гдѣ было возможно, отдавалось предпочтеніе влагалищному пути передъ операціями проникающими въ брюшную полость, черезъ переднюю брюшную стѣнку, какъ приему болѣе опасному для больныхъ.

ОТЧЕТЪ

о леченіи больныхъ въ венерическомъ отдѣленіи Харьковской Городской Александровской больницы въ 1899 году ординатора Д. А. Кононенко, завѣдующаго венерическими палатами, кромѣ 6-й венерической мужской палаты, которою завѣдывалъ ординаторъ Э. К. Крижевичъ.

Въ венерическомъ отдѣленіи движеніе больныхъ въ 1899 году было слѣдующее:

Состояло къ 1 Января 1899 года 68.

Прибыло въ теченіи 1899 года . (1011+51)=1062.

Выздоровѣло (1010+68)=1078.

Умерло 1.

Состоить къ 1 Января 1900 года 51.

Въ теченіе отчетнаго года больныхъ венерическими болѣзнями и сифилисомъ лечилось, за исключеніемъ 51 больного, оставшихся къ 1 Января 1900 года всего 1079 человекъ. Изъ нихъ мужчинъ 789 и женщинъ 290. Изъ 789 мужчинъ 137 лѣчилось у ординатора Э. К. Крижевича. Изъ мужскаго пола умеръ одинъ младенецъ, 3½ мѣсяцевъ, больной сифилисомъ, отъ скарлатины.

Сифилисъ и венерическая болѣзнь проявлялись въ слѣдующихъ формахъ:

I. Сифилисъ.

	муж.	жен.
1. Сифилисъ первичный (Ulcus indur)	105	12
2. Сифилисъ кондиломатозный	recens 193 recediva 19 не указано —	143 5 —
3. Сифилисъ гуммозный		
4. Форма не показана		
	324	168
Итого	492	

Въ томъ числѣ:

Половое зараженіе	321	163
Наслѣдственный сифилисъ	3	5
Внѣполовое зараженіе	—	—
Путь зараженія неизвѣстенъ	—	—

II. Мягкій шанкръ и его осложненія.

a) Мягкій шанкръ (<i>Ulcus molle</i>)	223	60
b) Гангренозный и фугаденический шанкръ <i>Ulcus phagadaenicum</i> u ulcus gangraenosum)	4	—
c) Пораженіе лимфатическихъ сосудовъ и железъ (<i>Lymphangioitis</i> u <i>adenitis</i>) вслѣдствіе мягкаго шанкра	81	7
	308	67
Итого	375	

III. Перелой и его осложненія.

		МУЖ.	ЖЕН.
Безъ ослож- неній.	{ Острый	53	—
	{ Хроническій	17	—
	{ a) Съ пораженіемъ яичка или придатка (<i>Orchitis</i> , <i>Epidi-</i> <i>dimitis</i>)	47	—
	{ b) Съ пораженіемъ крайней плоти (<i>Balano-postitis</i> , <i>phimosi</i> , <i>paraphimosi</i>)	32	—
	{ c) Съ остроконечными кондиломами (<i>Condilomata accumi-</i> <i>nata</i>)	8	12
	{ d) Съ пораженіемъ влагалища и матки (<i>Colpitis</i> , <i>Endome-</i> <i>tritis gonorrhoeica</i>)	—	43
		157	55
	Итого	212	

Оперативное пособіе подавалось въ 111 случаяхъ, а именно:

a) удаленіе кондиломъ	5	10
b) Операция фимоза и парафимоза	10	—
c) Вскрытіе бубоновъ	74	5
d) Вскрытіе <i>Bartolonitis</i>	—	5
e) Вскрытіе нарывовъ	2	—
	91	20
Итого	111	

Лечение больных венерического отдѣленія состояло въ слѣдующемъ:

При леченіи уретритовъ примѣнялись вяжущія и дезинфицирующія вещества и изъ нихъ чаще всего употреблялись: *Kali hypermanganicum*, *Zincum Sulfuricum*, *Hydrargyrum Sublimatum corrosivum* и *resorcin*; Изъ внутреннихъ лекарствъ съ успѣхомъ употреблялась *Salol* и *methylenblau*. При леченіи орхита и эпидидимита лучший успѣхъ достигался отъ смазыванія мошонки іодной настойкой съ послѣдовательнымъ смазываніемъ *Collodio risinoso*. Фимозы и парафимозы, не поддававшіеся обыкновенному леченію, устранялись оперативнымъ путемъ. Остроконечныя кондиломы лечились оперативнымъ путемъ, а также съ хорошимъ успѣхомъ примѣнялся резорцинъ въ видѣ присыпки. Язвы какъ мягкаго, такъ и твердаго шанкра скорѣе всего заживали отъ примочки изъ *Cuprum aceticum*, а также отъ мази изъ *Xeroform'a* изъ 8,0 на 30,0 вазелина. Фагаденический и Гангренозный шанкры хорошо заживали при леченіи ихъ *resorcin'омъ* въ видѣ присыпки и въ видѣ мази. При упорно не заживавшихъ язвахъ твердаго шанкра прибѣгали къ внутреннему леченію іодистымъ калиемъ и тогда заживленіе шло быстрѣе. При леченіи сифилиса чаще всего прибѣгали къ методическимъ втираніямъ ртутнаго мыла (*Sapo mercurialis*). Кромѣ того прибѣгали къ подкожнымъ впрыскиваньямъ 1% раствора *Hydrargyrum bichloratum carbamdatum crystalisatum*, а также къ подкожнымъ впрыскиваньямъ *Hydrargyrum Salicyl. Subtilissim pulv* съ *paraphinum Liquid. opt. Sterillizat.* Мокнувшія папулы половыхъ органовъ и промежности скорѣе всего проходили отъ смазыванія ихъ *Ung. Hydrargyri oxyd. rubr.* изъ 2, 0 на 30, 0 вазелина.

ОТЧЕТЪ

завѣдывающаго дезинфекціонной камерой и стерилизаціонными аппаратами ординатора Э. Н. Крижевича.

На ряду со многими другими полезными нововведеніями въ улучшеніи больничной дѣятельности нужно несомнѣнно привѣтствовать устройство при нашей больницѣ городской дезинфекціонной камеры, существованіе которой хотя еще и не санкціо-