

№ 7.

ПРОТОКОЛЬ ЗАСѢДАНІЯ

21 октября 1870 года.

1. Секретарь прочелъ письмо предсѣдателя, въ которомъ онъ, увѣдомляя о немѣннѣи возможности присутствовать въ засѣданіи, просить А. В. Черная принять предсѣдательство въ настоящемъ засѣданіи.

2. Доложено извѣщеніе о смерти почетнаго члена общества академика Ф. И. Рупрехта и дѣйствительнаго члена Г. Ф. Шперка, при чемъ А. С. Питра прочелъ некрологъ Г. Ф. Шперка, который опредѣлено напечатать въ «Трудахъ общества».

3. Доложено извѣщеніе правленія харьковскаго университета о полученіи перваго тома «Трудовъ общества», соч. И. О. Леваковскаго «Способъ и время образованія долинъ на югѣ Россіи» и протоколовъ засѣданій въ 1870 году.

4. Доложено извѣщеніе совѣта харьковскаго университета о полученіи отъ харьковскаго управленія государственными имуществами билетовъ на право постоянной и бесплатной охоты по лѣснымъ дачамъ, подвѣдомственнымъ означенному управленію, на птицъ и звѣрей, для научной цѣли, слѣдующимъ членамъ общества: Степанову, Чернявскому, Ярошевскому и Пенгб.

5. Доложено отношеніе правленія харьковскаго университета о предоставленіи обществу испытателей природы права рѣшенія вопроса «О допущеніи постороннихъ лицъ въ засѣданія

общества». Постановлено: разрѣшить членамъ общества вводить постороннихъ лицъ, чрезъ посредство секретаря общества, съ тѣмъ, чтобы число всѣхъ имѣющихъ присутствовать не превышало 40, такъ-какъ большаго числа допустить нельзя, въ виду ограниченности помѣщенія.

6. Доложено письмо К. К. Пенго на имя предсѣдателя о пожертвованіи Н. А. Сочава двухъ экземпляровъ отпечатка рыбъ. Определено: выразить Н. А. Сочава благодарность общества за означенное пожертвованіе.

7. А. В. Чернай заявилъ о доставленіи ему г. Ивановымъ перечня¹ родовъ и видовъ жуковъ, встрѣчающихся въ окрестностяхъ г. Купянска, и, находя полезнымъ напечатаніе означеннаго перечня въ протоколахъ общества, предложилъ совместно съ симъ избрать г. Иванова (учителя въ купянскомъ уѣздномъ училищѣ) въ члены-сотрудники харьковского общества испытателей природы. Определено: списокъ жуковъ, составленный г. Ивановымъ, напечатать въ протоколахъ засѣданій общества, г-на же Иванова подвергнуть баллотировкѣ въ слѣдующемъ засѣданіи общаго собранія.

Въ списокѣ г. Иванова перечислены слѣдующія формы жуковъ:

I. Cicindelides.

II. Carabides.

1. Cicindela.

2. Notiophilus.

a) campestris.

a) aquaticus.

b) hybrida.

3. Elaphrus.

d) germanica.

a) riparius.

e) sylvatica.

b) cupreus.

¹ Перечень составленъ П. В. Ивановымъ, по собранной имъ коллекціи; опредѣленія сдѣланы по таблицамъ Редтенбахера, изданнымъ на русск. языкѣ въ Москвѣ, 1862 г., проф. А. П. Богдановымъ.

- c) *uliginosus*. a) *anthracina*.
4. *Procerus*. 18. *Pelar*.
5. *Calosoma*. 19. *Harpalus*.
6. *Carabus*. a) *ruficornis*.
a) *violaceus*. b) *aeneus*.
b) *cancellatus*. 20. *Agonum*.
c) *excellens*. a) *sexpunctatus*.
7. *Polystichus*. b) *marginatus*.
8. *Lebia*. 21. *Bembidium*.
a) *chlorocephala*. a) *flavipes*.
9. *Dromius*. b) *quadrimaculatus*.
10. *Brachinus*. c) *articulatus*.
a) *crepitans*. III. *Dytiscides*.
11. *Clivinia*. 22. *Dytiscus*.
a) *fossor*. a) *marginalis*.
12. *Badister*. 23. *Cybister*.
a) *bipustulatus*. a) *Roeselli*.
13. *Chlaenius*. 24. *Agabus*.
a) *nigricornis*. a) *agilis*.
b) *Schrankii*. 25. *Colymbetes*.
c) *vestitus*. a) *fuscus*.
14. *Anchonemus*. b) *pulverosus*.
a) *angusticollis*. 26. *Acilius*.
b) *prasinus*. a) *sulcatus*.
15. *Poecilus*. 27. *Hydaticus*.
a) *cupreus*. a) *transversalis*.
16. *Amara*. 28. *Laccophilus*.
a) *vulgaris*. a) *hyalinus*.
17. *Feronia*. b) *minutus*.

29. *Noterus*.
 a) *crassicornis*.
30. *Hyphidrus*.
31. *Hydroporus*.
 a) *pisipes*.
32. *Haliphus*.
 a) *elevatus*.
33. *Cnemidotus*.
 a) *caesius*.
- IV. *Gyrinides*.
34. *Gyrinus*.
 a) *natator*.
- V. *Hydrophilides*.
35. *Sperches*.
36. *Hydrophilus*.
 a) *piceus*.
37. *Hydrous*.
 a) *caraboides*.
38. *Hydrobius*.
 a) *fuscipes*.
39. *Sphaeridium*.
 a) *scarabaeoides*.
- VI. *Staphylinides*.
40. *Emus*.
41. *Leistotrophus*.
42. *Staphylinus*.
 a) *pubescens*.
 b) *caesarius*.
43. *Oxyporus*.
 a) *rufus*.
44. *Paederus*.
 a) *riparius*.
45. *Stenus*.
 a) *buphtalmus*.
- VII. *Silphides*.
46. *Necrophorus*.
 a) *vespilla*.
47. *Silpha*.
 a) *4-punctata*.
 b) *sinuata*.
 c) *obscura*.
- VIII. *Scaphidiides*.
48. *Scaphidium*.
 a) *4-maculatum*.
- IX. *Histerides*.
49. *Hister*.
 a) *unicolor*.
 b) *4-maculatus*.
 c) *bimaculatus*.
 d) *fimetarius*.
 e) *stercorarius*.
- X. *Phalacrides*.
50. *Olibrus*.
 a) *bicolor*.
- XI. *Nitidulides*.
51. *Nitidula*.
 a) *obscura*.
52. *Meligethes*.

- a) viridescens.
53. Ips.
- a) 4-pustulata.
54. Brachypterus.
- a) urticae.
- XII. Cryptophagides.
55. Engis.
- a) humeralis.
- XIII. Lathridiides.
56. Corticaria.
- XIV. Dermestides.
57. Attagenus.
58. Anthrenus.
- a) muscarum.
59. Dermestes.
- a) lardarius.
- b) murinus.
60. Byturus.
- a) fumatus.
- XV. Parnides.
61. Pomatinus.
- XVI. Lucanides.
62. Platycerus.
- a) caraboides.
63. Lucanus.
- a) cervus.
64. Doreus.
- a) parallelepipedus.
- XVII. Scarabaeides.
65. Ateuchus.
- a) sacer.
66. Sisyphus.
67. Gymnopleurus.
68. Onthophagus.
- a) vacca.
- b) nuchicornis.
- c) taurus.
- d) ovatus.
- e) Schreberi.
69. Psammodius.
- a) sulcicollis.
70. Aphodius.
- a) fimetarius.
- b) foetens.
- c) prodromus.
- d) inquinatus.
- e) fossor.
71. Lethrus.
- a) cephalotes.
72. Cerathophyus.
- a) typhoeus.
73. Geotrupes.
- a) stercorarius.
- b) sylvaticus.
- c) vernalis.
74. Trox.
- a) sabulosus.

75. Anthypna.
 76. Melolontha.
 a) vulgaris.
 b) hippocastani.
 c) fullo.
 77. Rhizothrogus.
 a) solstitialis.
 78. Aplidia.
 79. Hoplia.
 80. Anisoplia.
 a) agricola.
 b) fruticola.
 81. Anomala.
 a) Julii.
 82. Oryctes.
 a) nasicornis.
 83. Valgus.
 a) hemipterus.
 84. Oxythyrea.
 85. Cetonia.
 a) metallica.
 b) aurata.
 86. Epicometis.
 XVIII. Buprestides.
 87. Eurythyrea.
 88. Poecilonota.
 89. Anthaxia.
 90. Trachys.
 91. Chrysobothris.
92. Agrilus.
 a) biguttatus.
 XIX. Elaterides.
 93. Synoptus.
 94. Lacon.
 a) murinus.
 95. Cratonychus.
 a) rufipes.
 96. Athous.
 a) hirtus.
 b) haemorrhoidalis.
 97. Limonius.
 98. Cardiophorus.
 a) thoracicus.
 99. Ampedus.
 a) sanguineus.
 b) balteatus.
 c) pomorum.
 d) ephippium.
 100. Ludius.
 101. Corymbites.
 a) pectinicornis.
 102. Pristilophus.
 103. Agriotes.
 a) linearis.
 b) obscurus.
 XX. Telephorides.
 104. Homalisus.
 105. Silis.

106. *Cantaris*.

- a) *rustica*.
- b) *fusca*.

107. *Ragonycha*.

- a) *testaceus*.

108. *Maltinus*.

- a) *minimus*.

XXI. *Melyrides*.

109. *Malacogaster*.

110. *Malachius*.

- a) *viridis*.
- b) *2-punctulatus*.
- c) *marginellus*.
- d) *aeneus*.

111. *Dasytes*.

- a) *niger*.
- b) *flavipes*.

112. *Enicopus*.

XXII. *Clerides*.

113. *Tillus*.

- a) *unifasciatus*.

114. *Trichodes*.

- a) *apiarius*.

115. *Corynetes*.

- a) *coeruleus*.

XXIII. *Ptinides*.

116. *Hedobia*.

117. *Ptinus*.

- a) *fur*.

XXIV. *Anobiides*.

118. *Ptilinus*.

- a) *costatus*.

119. *Oligomerus*.

120. *Anobium*.

- a) *tesselatum*.

121. *Psoa*.

122. *Apate*.

- a) *capucina*.

123. *Synoxylon*.

XXV. *Pimeliides*.

124. *Tenthyrina*.

125. *Asida*.

- a) *sabulosa*.

126. *Platyscelis*.

127. *Blaps*.

- a) *mortisaga*.
- b) *fatidica*.

128. *Nyctipates*.

129. *Pedinus*.

- a) *femoralis*.

130. *Opatrum*.

- a) *sabulosum*.

131. *Crypticus*.

- a) *glaber*.

XXVI. *Diaperides*.

132. *Diaperis*.

- a) *boleti*.

XXVII. Tenebrionides.

133. Bius.

134. Tenebrio.

a) molitor.

XXVIII. Helopides.

135. Helops.

XXIX. Cistelides.

136. Cistela.

a) nigrita.

b) fulvipes.

137. Megischia.

138. Omophlus.

a) lepturoides.

XXX. Lagriides.

139. Lagria.

a) hirta.

XXXI. Anthicides.

140. Steropes.

141. Notoxus.

a) monocerus.

b) cornutus.

142. Formicomus.

XXXII. Mordellides.

143. Mordella.

a) fasciata.

b) aculeata.

144. Anaspis.

a) ruficollis.

XXXIII. Meloides.

145. Apalus.

146. Lydus.

147. Meloë.

a) violaceus.

b) variegatus.

148. Cerocoma.

149. Lytta.

a) vesicatoria.

b) syriaca.

c) colaris.

150. Epicanta.

151. Mylabris.

a) minuta.

XXXIV. Oedemerides.

152. Sparedrus.

153. Oedemera.

a) lurida.

b) virescens.

c) podagrariae.

d) flavescens.

154. Chrysanthia.

XXXV. Bruchides.

155. Bruchus.

a) pisi.

156. Anthribus.

a) albinus.

157. Tropidères.

XXXVI. Curculionides.

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 158. Apoderes. | a) faber. |
| a) coryli. | 170. Scytropus. |
| 159. Attelabus. | 171. Polydrusus. |
| a) curculionides. | a) micans. |
| 160. Rhynchites. | 172. Cleonus. |
| a) aequatus. | a) sulcirostris. |
| b) populi. | b) glaucus. |
| c) cupreus. | c) obliquus. |
| d) alliariae. | 173. Minyops. |
| e) bacchus. | 174. Lepyrus. |
| f) conicus. | a) colon. |
| 161. Apion. | 175. Hylobius. |
| a) subulatum. | a) pini. |
| b) carduorum. | 176. Molytes. |
| c) aeneum. | a) germanus. |
| d) rufirostre. | 177. Phytonomus. |
| e) fagi. | a) plantaginis. |
| f) trifolii. | 178. Coniatus. |
| 162. Psallidium. | 179. Phyllobius. |
| 163. Thylacites. | a) calcaratus. |
| 164. Tanymecus. | b) argentatus. |
| a) palliatus. | c) oblongus. |
| 165. Sitones. | 180. Peritelus. |
| a) lineatus. | 181. Laporocerus. |
| 166. Eusomus. | 182. Chiloneus. |
| 167. Brachyderes. | 183. Coenopsis. |
| 168. Cneorhinus. | 184. Meira. |
| 169. Strophosomus. | 185. Otiorthynchus. |
| | a) Ligustici. |

186. *Tyloderes*.
 - b) *graminis*.
 187. *Lixus*.
 - a) *paraplecticus*.
 - b) *turbatus*.
 188. *Larinus*.
 - a) *planus*.
 189. *Pissodes*.
 - a) *notatus*.
 190. *Dorytomus*.
 - a) *vorax*.
 191. *Brachyonyx*.
 192. *Balaninus*.
 - a) *nucum*.
 - b) *turbatus*.
 193. *Baridius*.
 - a) *Artemisiae*.
 - b) *chloris*.
 194. *Manonychus*.
 195. *Coeliodes*.
 - a) *exiguus*.
 196. *Rhinoncus*.
 - a) *pericarpii*.
 - b) *castor*.
 197. *Centhorrhynchus*.
 - a) *Echii*.
 - b) *asperifoliarum*.
 - c) *floralis*.
 198. *Gymnetron*.
 - a) *Linariae*.
 199. *Cionus*.
 - a) *blatariae*.
- XXXVII. *Bostrychides*.
200. *Scolytus*.
 - a) *destructor*.
 201. *Dendroctonus*.
 202. *Hylesinus*.
 - a) *Fraxini*.
 203. *Crypalus*.
 - a) *Tiliae*.
- XXXVIII. *Cerambycides*.
204. *Spondylis*.
 - a) *buprestoides*.
 205. *Prionus*.
 - a) *coriarius*.
 206. *Aromia*.
 - a) *moschata*.
 207. *Purpuricenus*.
 - a) *Koehlerii*.
 208. *Leptidea*.
 209. *Clytus*.
 - a) *detritus*.
 - b) *arcuatus*.
 - c) *arictis*.
 210. *Rhopalopus*.
 211. *Hylotrupes*.
 - a) *bajulus*.
 212. *Callidium*.

- a) variabile.
- b) violaceum.
- c) sanguineum.

213. Deilus.

214. Astynomus.

- a) aedilis.

215. Stenidea.

216. Exocentrus.

217. Monochamus.

- a) sutor.

218. Dorcadion.

- a) ater.

219. Lamia.

- a) curculionides.

220. Anaesthetis.

221. Saperda.

- a) carcharias.

222. Oberea.

- a) oculata.

- b) linearis.

223. Phytoecia

224. Agapanthia.

- a) angusticollis.

225. Toxotus.

- a) meridianus.

226. Strangalia.

- a) armata.

- b) attenuata.

- c) bifasciata.

- d) melanura.

227. Leptura.

- a) sanguinolenta.

228. Pachita.

- a) 6 - maculata.

- b) colaris.

229. Grammoptera.

- a) livida.

XXXIX. Chrysomelides.

230. Cassida.

- a) equestris.

- b) nebulosa.

- c) nobilis.

231. Donacia.

- a) crassipes.

- b) dentata.

- e) discolor.

- f) simplex.

- e) Sagittariae.

- d) impressa.

232. Lema.

- a) melanopa.

233. Crioceris.

- a) merdigera.

- b) 12 - punctata.

234. Labidostomis.

- a) longimana.

- b) tridentata.

235. Clythra.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a) 4-punctata. | b) limbata. |
| b) leviusecula. | c) graminis. |
| 236. Cyaniris. | d) fastuosa. |
| a) cyanea. | e) goettingensis. |
| b) affinis. | 246. Helodes. |
| 237. Chrysochus. | a) phellandrii. |
| 238. Pratora. | b) aucta. |
| a) vulgatissima. | 247. Timarcha. |
| 239. Pachybrachis. | a) coriaria. |
| 240. Cryptocephalus. | 248. Ademonia. |
| a) variabilis. | a) rustica. |
| b) bipunctatus. | b) tanacetii. |
| c) violaceus. | 249. Galeruca. |
| d) sericeus. | a) viburni. |
| e) flavipes. | b) nymphaeae. |
| f) geminus. | 250. Agelastica. |
| g) bipustulatus. | a) alni. |
| h) moraci. | 251. Luperus. |
| 241. Prasocuris. | a) rufipes. |
| 242. Phaedon. | 252. Phyllobrotica. |
| a) betulae. | a) 4-maculata. |
| 243. Colaphus. | 253. Psylliodes. |
| a) Sophiae. | a) chrysocephala. |
| 244. Lina. | 254. Graptodera. |
| a) populi. | a) oleracea. |
| b) tremulae. | 255. Crepidodera. |
| c) euprea. | a) helixes. |
| 245. Chrysomela. | b) nitidula. |
| a) sanguinolenta. | 256. Plectroscelis. |

a) dentipes.

257. *Haltica*.

a) armoraciae.

XL. *Coccinellides*.

258. *Chilocorus*.

a) renipustulatus.

259. *Exochomus*.

a) 4-pustulatus.

260. *Micraspis*.

a) 14-(pustulata)

-punctata.

261. *Coccinella*.

a) 7-maculata.

b) 7-punctata.

c) dispar.

262. *Halyzia*.

a) 14-guttata.

263. *Scymnus*.

a) frontalis.

8. Доложено письменное предложение И. Θ. Леваковского объ избраніи Е. И. Макарова въ сотрудники общества. Такъ какъ означенное предложение заявлено было въ повѣсткѣ о засѣданіи, то избраніе г. Макарова было подвергнуто баллотировкѣ въ настоящемъ засѣданіи; причеъ г. Макаровъ оказался избраннымъ въ число членовъ-сотрудниковъ общества.

9. Доложено предложение В. М. Чернаева—избрать въ сотрудники общества И. Ф. Крамсакова. Опреѣлено: подвергнуть г. Крамсакова баллотировкѣ въ слѣдующемъ засѣданіи общества.

10. Л. В. Рейнгардъ прочелъ нижеслѣдующій предварительный «Отчетъ объ экскурсіи, совершенной имъ въ восточной части харьковской губерніи лѣтомъ 1870 года»:

«Совершивъ на средства общества экскурсію по теченію рѣкъ Донца, Оскола, Мжи, Удѣ и Лопани, честь имѣю представить на разсмотрѣніе общества отчетъ объ этой поѣздкѣ. Но я прошу смотрѣть на этотъ отчетъ какъ на краткое, предварительное свѣдѣніе: какъ ни (однообразна, какъ ни бѣдна (разумѣется, сравнительно) природа нашей мѣстности, тѣмъ не менѣе

собранный мною матеріалъ на-столько великъ, что не могъ быть окончательно обработанъ въ столь короткое время. Вотъ почему я долженъ теперь ограничиться одними только общими и притѣмъ весьма краткими указаніями на то, что успѣлъ сдѣлать во время своего путешествія; сочиненіе же, въ которомъ будутъ подробно изложены результаты моихъ изслѣдованій и которое будетъ озаглавлено «Матеріалы для альгологической флоры харьковской губерніи», представлю на разсмотрѣніе общества не раньше конца декабря, а можетъ быть и значительно позже.

«Во время своей поѣздки, я старался обращать особенное вниманіе на условія нахожденія водорослей, думая, что изслѣдованія въ этомъ направленіи могутъ доставить нѣкоторые полезные матеріалы для совершенно неразработанной еще географіи этихъ низшихъ растительныхъ организмовъ, тѣмъ болѣе, что законы ихъ распространенія на земной поверхности, повидимому, зависятъ главнымъ образомъ отъ физическихъ и химическихъ условій мѣстности, вліяніе же географической широты и долготы обнаруживается, какъ справедливо замѣчаетъ проф. Cohn, только въ немногихъ случаяхъ. Причину послѣдняго обстоятельства Cohn приписываетъ впрочемъ еще и неточному ограниченію многихъ видовъ, равно какъ и недостаточной изслѣдованности большинства земель¹. Этому извѣстному изслѣдователю обязаны мы первыми, болѣе или менѣе обстоятельными, указаніями на законы географическаго распространенія водорослей; къ сожалѣнію, его размысканія ограничиваются почти исключительно одними морскими альгами, пре-

¹ Flora, 1863, № 13, pag. 205.

имущественно видами европейскихъ морей. Сообразно сказанному, сочиненіе мое будетъ состоять изъ двухъ частей. Въ первой части я сдѣлаю ботанико-топографическое описаніе главныхъ посѣщенныхъ мною пунктовъ, укажу на распредѣленіе водорослей въ изслѣдованной мѣстности, на условія ихъ нахождения, зависящія отъ формы и состава береговъ и дна рѣкъ и озеръ, постараюсь указать на нѣкоторые замѣченныя мною соотношенія между водорослями различныхъ бассейновъ и ихъ фанерогамическою прибрежною и водною растительностію. Вторая часть будетъ заключать описаніе найденныхъ формъ.

Въ настоящее время я могу обозначить число собранныхъ мною видовъ только приблизительно, такъ-какъ многіе еще совершенно не опредѣлены, другіе же хотя уже опредѣлены, но требуютъ еще сравненія съ коллекціями. Какъ-бы то ни было, но собранныхъ мною водорослей, по приблизительному вычисленію, должно быть гораздо болѣе 200 видовъ, а именно: болѣе 80 видовъ *Diatomophyceae*, около 32 видовъ *Phycochlorophyceae*, около 104 видовъ *Chlorophyllophyceae* и одинъ видъ изъ *Rhodophyceae*, именно — *Porphyridium cruentum* Naeg. Между собранными водорослями есть нѣсколько новыхъ видовъ и одинъ новый родъ. Описанія и изображенія этихъ новыхъ формъ будутъ представлены въ моемъ подробномъ сочиненіи; теперь же я позволю себѣ обратить вниманіе общества только на болѣе интересныя изъ нихъ.

«Наибольшій интересъ представляетъ новый родъ діатомы, по строенію сходной съ открытою Rabenhorst'омъ въ 1859 году *Cylindrotheca*, а по формѣ или, лучше сказать, по внѣшнему виду—съ видами изъ рода *Nitzchiella*.

«Новый видъ *Chroococcus*'а, который по величинѣ прибли-

жается къ *Chr. macrococcus Rabenh.*, а по виду къ *Chr. rufescens Naeg.* Этотъ видъ способенъ произростать въ водѣ чрезвычайно различной солености. Такъ, я нашелъ его въ оз. Лиманѣ изюмскаго уѣзда (гдѣ присутствіе соли въ водѣ, по-крайней-мѣрѣ на-вкусъ, не замѣтно) и въ Славянскѣ — въ Репномъ озерѣ и въ лужахъ соленыхъ возлѣ градиренъ.

«Наконецъ, я упомяну еще объ одномъ видѣ изъ рода *Polycystis*. Я нашелъ его во множествѣ въ совершенно прѣсномъ озерѣ «Боровомъ» (близъ деревни Лиманъ змѣевского уѣзда) и въ озерѣ Лиманъ изюмскаго уѣзда; а К. К. Пенго собралъ эту водоросль въ Азовскомъ морѣ.

«Изъ большинства собранныхъ мною водорослей, мнѣ удалось приготовить и препараты, такъ-что я представляю обществу коллекцію, содержащую около 150 номеровъ.

«Кромѣ водорослей, я собиралъ и другія растенія, интересныя въ какомъ-нибудь отношеніи. Между прочимъ мною найдено 2 вида *Chara*, 1 видъ *Nitella* и собрано небольшое число лишайниковъ (*Lichenes*), микроскопическихъ грибовъ, мховъ и явнобрачныхъ растений. Всѣ эти коллекціи растеній, равно какъ и небольшое число животныхъ, преимущественно водяныхъ, которыя мнѣ удалось собрать во время поѣздки, я представляю обществу вмѣстѣ съ сочиненіемъ».

11. Г. М. Радкевичъ прочелъ слѣдующій предварительный отчетъ о своихъ экскурсіяхъ.

«Порученныя мнѣ обществомъ испытателей природы при Императорскомъ харьковскомъ университетѣ зоологическія экскурсіи, для изслѣдованія озерной фауны харьковской губерніи, я совершилъ въ іюнѣ и въ іюль мѣсяцахъ. Во время этихъ экскурсій я посѣтилъ слѣдующія озера: 1) Лиманъ, 2) Чайки,

13. Доложено о пожертвованіи А. В. Гуровымъ четырехъ образцовъ каменнаго угля и сочиненія «Геологическія изслѣдованія въ южной части харьковской губерніи». Определено: выразить благодарность общества за означенное пожертвованіе.

14. Проф. Н. Д. Борисякъ пожертвовалъ обществу образецъ метеорнаго желѣза, неизвѣстнаго мѣстонахожденія, присовокупивъ, что свѣдѣнія о послѣднемъ могутъ быть получены отъ Траутшольда. Определено: выразить проф. Н. Д. Борисяку благодарность общества, а секретарю поручить снестись съ Траутшольдомъ.

15. Проф. Н. Н. Бекетовъ представилъ обществу семь образцовъ селенита изъ бахмутскаго уѣзда, обнаруживающаго весьма интересныя генетическія соотношенія къ окружающему его сѣрному колчедену и водной окиси желѣза; образцы эти собраны и переданы для общества землевладѣльцемъ А. А. Щербачевымъ. Определено: выразить благодарность общества А. А. Щербачеву.

16. Доложено о полученіи отъ московскаго общества любителей естествознанія третьяго выпуска матеріаловъ для энтомологіи. Определено: благодарить моск. общ. люб. естеств.

17. Поступили въ даръ обществу слѣдующія сочиненія: 1) отъ дѣйств. член. общ. И. О. Калениченко «Notes sur la propylamine», 2) отъ дѣйств. член. общ. М. С. Ганина «Исторія развитія сложныхъ асцидій», 3) отъ проф. И. П. Лазаревича «Паразиты женскихъ половыхъ органовъ» (въ пятидесяти экземплярахъ). Определено: выразить благодарность общества гг. Калениченко, Ганину и Лазаревичу за означенное пожертвованіе.

18. К. К. Пенго прочелъ часть предварительнаго отчета объ экскурси, совершенной имъ, по порученію общества, лѣтомъ 1870 года по низовьямъ рѣки Днѣстра и смежнымъ съ нимъ прѣсноводнымъ (озерамъ) и морскимъ лиманамъ. Опре-дѣлено: принять къ свѣдѣнію.

19. Членъ-сотрудникъ общества И. П. Лазаревичъ сдѣ-лалъ слѣдующее сообщеніе:

«Представляя обществу въ печати нѣкоторые результаты моихъ микроскопическихъ изслѣдованій паразитовъ женскихъ половыхъ органовъ, я позволяю себѣ указать на нѣкоторые сдѣланные мною выводы, подтвержденные недавними новыми наблюденіями.

«Что для развитія паразитовъ женскихъ половыхъ органовъ необходимъ доступъ воздуха—это подтверждается слѣдующимъ клиническимъ наблюденіемъ. У одной молодой женщины наруж-ная половая щель была плотно закрыта, и между тѣмъ стѣн-ки рукава были обложены тонкимъ сплошнымъ слоемъ бѣлой слизи, кислой реакціи; у свода же рукава было обильное скоп-леніе густой слабо-кислой слизи. Какъ въ той, такъ и въ дру-гой слизи паразиты не были найдены. У нѣсколькихъ боль-ныхъ, то-же недавно изслѣдованныхъ въ клиникѣ, при рых-лости стѣнокъ рукава и полураскрытой половой щели, были находимы во множествѣ паразиты—или животные, или расти-тельные. У одной больной слизистая оболочка входа въ ру-кавъ была покрыта тонкимъ слоемъ густоватой бѣлой слизи, кислой реакціи. Въ ней найдено множество толстыхъ члени-стыхъ нитей грибовъ. Между ними нѣкоторые дѣлились на двѣ вѣтви, которыя держались на колбовидно-утолщенномъ концѣ членика (рис. I на прилагаемой таблицѣ). Въ одномъ мѣстѣ

изелѣдуемаго препарата слизи я замѣтилъ на одной изъ раздвоенныхъ вѣтвей опять раздвоеніе на болѣе тонкія нити (рис. 2). Я представляю обществу этотъ препаратъ хорошо сохранившимся между стеклышекъ и вѣрно срисованнымъ съ натуры.

Наконецъ, я обращаю вниманіе общества на снятое съ натуры изображеніе трихомона съ тремя жгутиками (рис. 3). Всѣ они или двигались, сложенные вмѣстѣ, въ одну сторону, или же расходились въ противоположныя стороны, какъ это показано на представленномъ мною рисункѣ. Я указываю на этого трихомона потому, что во всѣхъ другихъ описанныхъ мною случаяхъ я находилъ трихомоновъ только съ однимъ или двумя жгутиками, и существованіе двухъ жгутиковъ я объяснялъ результатомъ совершившагося сліянія двухъ недѣлимыхъ.

Въ нынѣшнемъ году вышло въ Берлинѣ—«Die Parasiten der weiblichen Geschlechtsorgane des Menschen und einiger Thiere. Nebst einem Beitrage zur Entstehung des Oidium albicans Rob. von Dr. D. Hausmann». Объ этомъ сочиненіи я узналъ уже послѣ напечатанія моей статьи».

По поводу сообщенія о трихомонахъ съ тремя жгутиками, проф. А. В. Чернай замѣтилъ, что Trichomas съ 3-мя жгутиками изображенъ въ сочиненіи Лейкарта «Die menschlichen Parasiten» (Bd. I, St. 145; Leipzig und Heidelberg. 1862). (Въ этой статьѣ прилагаются литографическіе рисунки).

Протоколъ подписали: за предсѣдателя Чернай; Ярошевскій, Пенб, Рейнгардъ, Степановъ, Питра 2-й, Масловскій и секретарь Бріо.

Въ засѣданіи, кромѣ означенныхъ членовъ, присутствовалъ М. С. Ганинъ, д. ч.

Рис. 1.




Рис. 2.



Рис. 3.

