

МЫШЦЕСЛОВІЕ
или
НАУКА О МЫШЦАХЪ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

А Н А Т О М И Й.

ЕФРЕМА МУХИНА.

М О С К В А.

Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1818.

Fibra, muscularis formatur ex materie fibrosa ciuore-
que sanguinis. Nervorum vis maximam potestatem
habet excitandi musculos. Qvi agunt velut funes
sev vectes, quorum hypomochilia in articulis sunt.
Prima rudimenta muscularium fibrarum apparent in
lente crystallina et utero.

Печатать позволяется съ тѣмъ, чтобы по
отпечатаніи; до выпуска въ продажу, пред-
ставлены были въ Цензурный Комитетъ одинъ
экземпляръ сей книги для Цензурнаго Коми-
тета, другой для Депаршаменша Министер-
ства просвѣщенія, два экземпляра для Им-
перашорской публичной Библіотеки и одинъ
для Имперашорской Академіи Наукъ. Москва,
Января 10 дня 1818 года. Ординарный Профес-
соръ и Кавалеръ Василій Котельницкій.



О ГЛАВЛЕНИЯ

тремъей Частей

Справа:

ОТДѢЛЕНИЕ I.

ГЛАВА I. О Мышцесловіи.	- - -	5
— II. О мышцахъ вообще.	- - -	5

ОТДѢЛЕНИЕ II.

О мышцахъ въ особенности, и впервыхъ
о мышцахъ головы.

ГЛАВА I. О мышцахъ головы и черепа.	18
— II. О мышцахъ уха. Musculi auris.	20
— III. О мышцахъ лица, носа и губъ. Musculi faciei, nasi et labiorum.	24
— IV. О мышцахъ глазныхъ. Muscu- li oculorum.	31
— V. О мышцахъ нижней челюсти. Musculi maxillae inferioris.	36
— VI. О мышцахъ переднихъ шей- ныхъ и впервыхъ о Мм. дужки. Musculi colli anteriores.	39
— VII. О мышцахъ языка. Musculi linguae.	41
— VIII. О Мм. головы.	43

ОТДѢЛЕНИЕ III.

О мышцахъ туловища. Musculi trunci.

ГЛАВА I. О мышцахъ горлани (la- rynx).	- - - -	49
— II. О мышцахъ глотки. Musculi pharyngis.	- - - -	52
— III. О мышцахъ всей спины и ребръ.	- - - -	56

II

Страт.

ГЛАВА IV. О мышцахъ брюха. Musculi
abdominis. - - - - - 65

— V. О мышцахъ между проход-
ныхъ. Musculi perinaei. - - - - - 77

ОТДѢЛЕНИЕ IV.

ГЛАВА V. О мышцахъ рукъ. Musculi
manus. - - - - - 82

ОТДѢЛЕНИЕ V.

ГЛАВА I. О мышцахъ ногъ. - - - - - 105

Списокъ предметамъ сей Частии,
Оглавленія сей Частии,



ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

о

Мышцесловій.

Мышцесловіе есть та часть Анатоміи, которая заключаетъ въ себѣ познаніе о мышцахъ. Оно предлагаетъ наименование, положеніе, прикрепленіе, очертаніе, раздѣленіе, устройеніе, ощущительные качества, употребленіе и пользу мышца вообще и каждой порознь.

Оно раздѣляется: 1^о на *мышцесловіе практическое*, 2^о *умозрительное*, 3^о *общее и 4^о частное.*

1^о. *Мышцесловіе практическое* или *точное* есть то, которое научаетъ при самомъ прупоразылтіи познавать человѣческія мышцы, отдаленные съ излежащими анатомическими, или прогекторскими искусствомъ отъ прочихъ частей тѣла человѣка.

ческаго, присовокупляя къ тому надлежащія свѣденія обѣ оныхъ.

2 е. М. умозрительное есть то, которое предлагаетъ въ надлежащей связи словесно правила и средства, нужныя къ познанію вообще, и каждой мышцы порознь. Но таковое учение безъ практическаго упражненія есть душа безъ тѣла; оно совершенно неудовлетворительно, и рождаешь только сбивчивыя понятія о мышцахъ.

3 е. М. общее есть то, которое предлагаетъ полное свѣденіе о всѣхъ мышцахъ тѣла человѣческаго.

4 е. М. частное, которое преподаетъ знанія мышецъ одной какой-либо части тѣла человѣческаго, какъ то: лица, глаза, горшани, груди, брюха и проч.

Предметъ сей науки суть мышцы.

Пособія сверхъ орудій, руководствующія въ точнѣшему познанію мышецъ, суть:

1 е. *Мышцесловіе сравнительное или примѣнляемое*, которое предлагаетъ свѣденіе о мышцахъ, выключая человѣческія, прочихъ живошныхъ а особливо домашнихъ, сравни-

вяя оныя во всякомъ отпношении [съ мышца-
ми человѣческими.

2е. Рисунки мышецъ человѣческихъ,
изображающія наружный видъ оныхъ.

3е. Сюда же отнесши можно *отлѣтки*
мышецъ, которыя представляюшъ наруж-
ный видъ оныхъ, какъ бы отпечатки на
воскѣ, сургучѣ, алебасѣрѣ и проч., или ис-
кусственно выстѣченные или вырѣзанные виды
оныхъ на деревѣ, мраморѣ и проч., или ош-
лифы изъ мѣди и прочихъ мешалловъ.

4е. Къ сему же роду пособій отнесши
можно *высушеннѣя* человѣческия *мышцы*
многія вмѣстѣ или по одной порознь въ воз-
можномъ естественномъ ихъ положеніи и
видѣ.



ГЛАВА II.

О

Мышцахъ вообще.

Мышцы состоятъ изъ пучковъ, пучки изъ
волоконъ, а сіи суть полыя нити влажныя, маг-
кія, не сколько упругія, полуопрозрачныя, желто-

красноватыя, кльшашкою между собою соединеныя; онѣ спащены множествомъ кровеносныхъ, всасывающихъ сосудовъ, и чувственныхъ жилъ. Сии волокна въ дѣйствія сущь мягки, будучи же въ дѣйствіи, въ живомъ тѣлѣ тверды. Онѣ живыя имѣютъ такую способность, что, волею и вліяніемъ мозга и чувственныхъ жилъ будучи возбуждены, исполняютъ естественныя движения; будучи же чрезвычайно раздражены, подвергаются судорогамъ или корчамъ; и сие свойство, общее всѣмъ мышечнымъ волокнамъ, въ человѣкѣ продолжается иногда послѣ смерти около часа, иногда же болѣе, а въ животныхъ хладнокровныхъ иногда даже чрезъ цѣлой день послѣ смерти. Одѣлъ, учиненные мною надъ дѣйствиемъ Гальванической силы надъ трупами человѣческими и малыхъ животныхъ, а особливо хладнокровныхъ, какъ то: зимоспящихъ, людей находившихся въ глубокихъ обморокахъ, ушопшихъ, задохшихся, надъ членами человѣческими недавно ощипанными (*amputatus*), какъ то: надъ рукою, ногою и надъ сердцемъ прочихъ животныхъ, а особенно лѣ-

гушекъ, для изслѣдованія бытія жизненной силы и мышечныхъ побужденій, ясно сіе доказываютъ.

Наружный видъ мышечныхъ волоконъ, по причинѣ различныхъ обстоятельствъ, весьма различенъ. Въ младенческомъ шѣлѣ, по рожденіи ихъ на свѣтѣ, а особенно у совершиеннолѣтнихъ, находятся мышцы въ тѣхъ мѣстахъ, въ коихъ въ недоноскахъ отыскать оныхъ вовсе не возможно было, не говоря о болѣзненномъ оныхъ состояніи.

Мм. выжатыя, вареная, жареная или моченая въ винѣ, содѣлавшия грубыми и плошными, служающія и удобно раздѣляются, безъ помощи ножа, на пучки и волоконца, которыхъ, размашриваемы будучи помощью микроскопа, суть ниши продолговатыя, ровныя или цилиндрическія, короткія, съ боковъ тонкими волоконцами между собою соединенные и какъ бы шариками наполненныя.

Влажность мышечныхъ волоконъ есть причиною, что онѣ суть красны или полу-прозначны, мягки и отличны отъ волоконъ

сухихъ жилъ, лишившися же сей влажности, дѣлаются тонкѣ и легче сихъ послѣдніхъ и блѣдающи.

Краска мышечныхъ волоконъ бываетъ различна; разность ея зависитъ отъ возрасла, пола, сложенія, множества волоконъ, упражненія, здоровья, отъ жидкости и воздуха, по смерти на волокна имѣющихъ вліяніе: чѣмъ человѣкъ моложе, тѣмъ волокна мышечныя блѣдающи; у спариковъ они блѣдны, а въ упробныхъ младенцахъ даже желтоваты. Чѣмъ менѣе здоровъ человѣкъ, чѣмъ меньшее число волоконъ находиться вмѣстѣ соединенныхъ; тѣмъ цвѣтъ оныхъ блѣдеющи, а чѣмъ болѣе оныхъ соединено, тѣмъ онѣ краснѣе и багровѣе. Отъ великаго движенія, а особенно въ чистомъ воздухѣ, мышцы дѣлаются темнѣе и краснѣе; доказательствомъ сему супрь мышцы деревенскихъ рабочихъ жителей по смерти. Обнаженные мышцы, осыпаны будучи солью, селишрою, или положены въ чистой атмосферной воздухѣ, а особенно жизненный, краснѣютъ: сверхъ сего различная качества крови и количество, а особенно кровя-

ныхъ шариковъ ея дѣлаютъ ония различными по цвѣту.

Всѣ мышечныя проспныя волокна, соединившияся между собою посредствомъ клѣпчатой пlevы, составляютъ сложныя; а сіи сложныя пучечки, пучечки же составляютъ цѣлыя мышцы, покрытыя мокрошною оболочкою, а особливо Мм: подлежащія воли.

Мышцы соединяются сокровеннымъ и весьма плотнымъ образомъ съ костью, хранящемъ, сочленяющими сумочками, съ костною, сухожильною оболочками и проч., а съ своими сухими жилами, еще неопределеннымъ образомъ; во, кажется, онъ только переходя въ нихъ блѣднѣюшъ.

Ошдѣляются мышцы ошь прочихъ частей клѣпчатою плевою, жиромъ и другими посредствами. —

Микроскопическія изслѣдованія доказываютъ, что мышцы, разсматриваемы будучи, по удачномъ искусственномъ налишіи кровеносныхъ сосудовъ цвѣтынъ или окрашеннымъ воскомъ, состоящіе по большой части изъ кровеносныхъ сосудовъ, сообразно съ направленіемъ мышечныхъ жилъ распо-

ложенныхъ. Мышцы имѣютъ сосуды больше всѣхъ прочихъ частей тѣла человѣческаго. — Сie количество сосудовъ есть относительное къ величинѣ мышцы: ибо чѣмъ мышца больше, тѣмъ болѣе имѣетъ она сосудовъ.

Анатомическія изслѣдованія очевидно доказываютъ, что всасывающіе сосуды существующіе въ сердцѣ, груднобрюшной преградѣ, въ мышцахъ лица, языка и проч., имѣя свое положеніе на поверхности, или между волокнами ихъ въ клѣпчаткѣ; то имѣютъ ли они свое начало въ мышечныхъ волокнахъ, сie еще не довольно доказано.

Мышцы, выключая сердце, снабжены по большой части чувственными жилами, относительно къ величинѣ ихъ. Ибо великія мышцы имѣютъ большія чувственныя жилы, а малыя гораздо менѣе; нѣкоторыи же мышцы, какъ то: глазные, будучи сами малы, имѣютъ великія чувственныя жилы, почему сила сихъ весьма велика. Въ совершеннѣйшихъ людяхъ мышечныя волокна тверже, толще, многочисленнѣе, или сложнѣе.

Изъ чего заключишь можно, что мышцы все по существу устроенія своего суть

одинаковы; и что первое образованіе ихъ есть премѣненіе сосудовъ въ мышечныя волокна, что подтверждаешь образованіе сердца, а различаются оаѣ по большой части по виду, мѣсту и проч. Почему получающъ *наименование* свое отъ употребленія, какъ то: разгибающія, и проч.; отъ части, къ коей прикрепляются; отъ положенія, вида, числа, сложности, величины, начала сухихъ жиль и оныхъ вида, пола, вліянія на оныя воли и проч.

Описываемыя мышцы но большой части, начиная отъ начала ихъ до прикрепленія къ подвижной, или по крайней мѣрѣ къ малоподвижной части.

Одинъ конецъ ихъ называется головкою, или началомъ, и другой концомъ или окончаніемъ или сухою жилою, а прочая часть срединою.

Всѣ вообще Мм. раздѣляются почти какъ коспакъ, а именно на Мм. головы, шуловища, рукъ и ногъ, а дальнѣйшее подраздѣленіе Мм. имѣетъ основаніемъ своимъ прочія части тѣла, а особенно на которыхъ Мм. оказываютъ свое вліяніе и проч.

О

Сухихъ жилахъ.

Сухожильные волокна суть плевы, верви или нити, плотные, твердые, удобораспагиваемыя и весьма упругія, влажныя, бѣлыя, блестящія, нечувствительныя, неразрывною связью съ мышцами соединенныя.

Сухія жилы такъ сходны съ связками, что отличаются отъ сихъ послѣднихъ одинимъ почти соединенiemъ съ мышцами; будучи же отдѣлены отъ оныхъ и сложены вмѣстѣ съ связками, съ великою трудностью могутъ быть различены самыми опытнейшими Анатомиками.

Сухія жилы моченые и вареные до известной степени раздѣляются на мягкия нити или кѣпчатую плеву. Онь покрыты особыною оболочкою; весьма мало имѣютъ кровеносныхъ и чувственныхъ жилъ, чрезъ оныхъ проходящихъ, а болѣе пасочныхъ сосудовъ. —

Безчисленные опыты, учиненные надъ живыми животными и при операціяхъ надъ людьми, совершенно увѣрили меня, что сухія жилы суть нечувствительны: онь живыя, будучи уколоты, разсѣчены, или дру-

тамъ чѣмъ нибудь раздражены, не сжимаються; при сжатіи же мышецъ дѣйствуютъ на подобіе веревки, но въ болѣнномъ состояніи, а особенно будучи воспалены, дѣлаются иногда сполъ чувствительными, что слабое прикосновеніе къ онымъ производить несносное чувство боли.

Волокна всей мышцы такъ непримѣтно соединены съ волокнами сухой жилы, что, кажется, концы ихъ переплещены между собою на подобіе концовъ вишокъ. Сія связь иногда, послѣ надлежащаго варенія мышецъ, кажется уничтожающеюся, и показываетъ сіи границы сухихъ жилъ.

Достовѣрныя наблюденія учненныхъ научаютъ, что мышечныя волокна въ людяхъ мясистыхъ, сильныхъ, здоровыхъ, скопощико умершихъ, кажущаяся привѣтлены, или приклѣены снаружи къ концамъ волоконъ сухихъ жилъ, и не входяще въ составъ оныхъ, а въ соединеніи ихъ находятся бугорокъ, каплю отвердѣвшаго клѣя изображающій. Посредствомъ сего онъ такъ соединены, что вполнѣ видны концы между мышцами и сухими жилами. Бугорокъ сей въ

людскихъ трупахъ предъ смертию , долго и
тяжело страдавшихъ болѣзнию , не примѣ-
щені. — Потеря сухихъ жилъ по причинѣ
сжимательности мышечъ не возобновляется.
Мышцы лишася своей сухой жилы , напр.
надглазочной (Achilles), прикрепля-
ются къ кожѣ и , сжимаясь , разгибаютъ по-
средствомъ овой ступень , какъ собственный
мои , наблюденія то подтверждаютъ надъ сею
и другими сухими жилами .

Сухія жилы человѣческія и животныхъ
тѣ же почти имѣютъ составныя Химическія
начала , какъ и мышцы ; онѣ состоятъ изъ
лещучей соли , сахару , угла , масла и проч.

Сухія жилы прикрепляются къ хрящной
и костной пlevѣ . — Онѣ у взрослыхъ людей
споль тѣсно соединены съ kostями , а наи-
луче съ выпуклостями оныхъ , что внѣдря-
ются въ оныя , и въ томъ мѣстѣ , где онѣ
прикрепляются , составляютъ совмѣстно съ
сосудами костную оболочку ; и отъ точекъ
прикрепленія своего не могутъ быть отде-
лены безъ поврежденія . Сверхъ сего соеди-
няются онѣ съ пивердою глазною оболочкою ,
съ сочленовыми связками , съ мокрошными
сумочками , съ кожею , съ клѣпчаткою и проч.

Что принадлежит до вида сухихъ жилъ (*forma tendinum*) ; то сухожильные волокна , соединенные въ видѣ продолговатыхъ , или цилиндрическихъ нитей , или канатиковъ , называются *сухими жилами* (*tendines*), а тонкія и широкія пластиинки или концы оныхъ называются *сухожильными плевами* (*aponeuroses sive membranae tendineae*). Таковыя плевы , покрывающія мышцы , называются *оболочками* (*vaginae s. membranae pituitariae, s. tunicae mucosae*) ихъ : тѣ сухія жилы , которыя проходяще сквозь другія , называются *проходящими* ; а тѣ , которыя пропускаютъ оныя , имѣнующіяся *проходными* . Нѣкоторыя изъ сухихъ жилъ суть одивокія , другія парные , нѣкоторыя же раздѣлены , иные прямо проходяще , нѣкоторыя же изъ оныхъ въ особенныхъ мѣстахъ опираються облаки , какъ то : сухая жила косой мышцы глаза , основной язычковой , грудной большой , широкой спинной , двуначальной лопатко-лучевой и многихъ ручныхъ и ножныхъ Мм.

Сухія жилы , лежащія подлѣ самой кожи , всегда почши облечены , или по крайней мѣре имѣющія при себѣ мокротыя сумочки ,

и соединены съ костью особыми сухожильными прищепочками (*tenacula*), перечинами или держальдами.

Мышцы состоятъ изъ сухожильного и мясистаго вещества. Въ послѣднемъ находятся множество кровеносныхъ, пасочныхъ сосудовъ и чувственныхъ жилъ, сверхъ чего въ живыхъ животныхъ жизненной мышечной силы.

Сухія жилы, по большой части предопределены для прикреплениія мышцъ къ прочимъ частямъ тѣла; почему она по большой части находится на концахъ мышцъ, и соединяющъ оныя съ смежными частями. Волокна сердца имѣютъ окончаніе свое въ заслоночкахъ и кольцахъ ихъ. Желудочная, кишечная и симъ подобныя мышечные части не имѣютъ окончанія сего. Сухія жилы находятся иногда на срединѣ мышцы, и раздѣляютъ ее на два мышечныхъ конца или многія мясныя отдѣленія.

Клѣпчатая пleva не только соединяетъ всѣ мышечные волокна, но составляетъ еще для каждой мышцы особенную оболочку, одѣвающую есю мышцу.

П о л ь з а м ы ш е ц ъ .

Мышцы, будучи предопределены для движений, суть орудия всѣхъ живошныхъ движений и дѣйствій. Онъ находятся вездѣ, гдѣ только нужно движение костей или другихъ частей. Онъ движутъ кровь и, кажется, усовершенствуяще ее въ сущес-твѣ своемъ: онъ суть орудія глотанія, со-санія, жеванія, пищеваренія, дыханія, пѣ-нія, кашля, испражненія низа, мочи и ро-дотворенія; такжѣ споянія, хожденія, бѣ-ганія, плясанія, плаванія, сидѣнія, лежанія, подниманія, ношевія, толканія, бросанія, сги-банія, разгибанія, круженія, и проч. Помощью мышцъ дѣйствуетъ горшанъ, ротъ, образуеш-ся голосъ, слова и внутреннее дѣйствіе срастшей душевныхъ извѣсняется явленія-ми на лицѣ и проч. Дѣйствиемъ нѣкоторыхъ мышцъ сохраняется жизнь наша и здравіе, какъ то: дѣйствиемъ сердца, грудобрюшной преграды, пищепріимнаго канала и проч.



О Т ДѢЛЕНИЕ II.

О мышцахъ въ особенностяхъ, и во-
первыхъ

О мышцахъ головы.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О мышцахъ головы и черепа.

Мышца надчерепная.

Musculus epicranius.

Она состоитъ изъ четырехъ маточеч-
ныхъ широкихъ плевъ или частей, двухъ
лобныхъ и двухъ затылочныхъ, изъ коихъ

M. лобные,

Mt. frontales.

Начинаются отъ корня носа, и удѣ-
ливши нѣсколько выходящихъ волоконъ
хребту его, концы оканчиваются въ
мышцахъ сжимающей носъ, также подъ-
емлющей ноздрю и губу, пошомъ соединив-
шихся началомъ съ мышцею вѣковою, каждая
изъ нихъ идуща ковечно въ верхъ къ виску

чрезъ бровную дугу и бровную мышцу, и оканчивается у вѣнчнаго шва въ кожѣ и надчерепникѣ (*galea aponevrotica*).

Сила сей мышцы. Она тянетъ кожу головы къ носу или въ верхѣ, сморщиваетъ лобъ поперечно при неудовольствіи, удивленіи, скрѣ, страхѣ, грусти и симъ подобныхъ обстоятельствахъ, или поднимаетъ брови.

Mm. Затылочные.

Mm. occipitales.

Объ начинаются отъ затылочной верхней дуги и, покрывши выше оной часть затылочной kostи, идутъ вверхъ косвенно къ виску, гдѣ оканчиваются въ надчерепникѣ и кожѣ.

Сила. Тянутъ кожу и надчерепникъ къ затылку, дѣйствуя же поперемѣнно съ лобными мышцами, движущъ головные волосы назадъ и напередъ.

Примѣч. Надчерепникъ есть сухожильная плева (*aponevrosis*), которая покрываетъ черепъ спереди до верхнихъ концовъ лобныхъ Мм., корень носа и верхнія края глазницы (*orbita*), сзади до затылочныхъ Мм., а съ боковъ до скловыхъ полукруговыхъ и мы-

шецъ височныхъ. Онъ соединенъ плотно съ кожею головы, покрытою волосами.



ГЛАВА II.

O

Мышцахъ уха.

Musculi auris.

Мм. сіи раздѣляются на вѣшнія и внутреннія. Ко вѣшнимъ принадлежать: Мм. надвушная, предвушная, заушная, козелковая, прошиво - козелковая, завишковая и попечечная ушная; ко внутреннимъ же: основно-молотковая, трубо - молотковая и стремянная. Наружные изъ нихъ держатъ ухо и кожу головы.

M. надвушная или височно-ушная,
M. attollens auris s. superior.

Начавшияся широкою пlevою отъ надчертепника выше уха и влагалища височной мышцы и, идучи внизъ къ оному, сбуживаются, а оканчиваются снаружи въ спинкѣ завишка въ ладьевобразной выпуклости, находящейся между вѣшнями противузавишка.

Сила. Ухо подымаетъ въ верхъ.

M. предъушная или скullo-ушная.

M. attrahens s. anterior auris.

Начавшия спереди уха отъ влагалища височной мышцы и отъ корня скудоваго опроешка , оканчиваются спереди въ осми завитка , гдѣ конецъ его сгибаюся идетъ въ раковину.

Сила. Тянетъ ухо впередъ.

M. заушная или соско-ушная.

M. retrahens s. posterior auris.

Два , три , а иногда четыре пучка , начавшия у корня сосковаго опроспка , оканчиваются сзади уха въ выпуклости (dorsum) ушной раковины.

Сила. Ухо тянетъ назадъ.

M. козелкова.

M. tragicus auris.

Начавшия отъ передняго козелка , гдѣ онъ соединяется съ хрящевымъ ходомъ уха , п. в. отъ корня козелка , оканчиваются на внутренней его поверхности .

Сила. Тянетъ передній козелокъ (tragum) и приводитъ къ раковинѣ и ушному ходу , а переднюю раковину дѣлаетъ плоскою.

M. противо - козелковал.

M. antitragicus auris.

Начавшия узкимъ концомъ отъ вил-
шей и передней части прошивузавишкы ,
оканчивается широкимъ въ корнѣ заднаго
козелка.

Сила. Противукозелокъ отводишъ ошъ
козелка и раковину дѣлаешъ глубже.

M. поперечная ушная или между -
завитковал.

M. transversus auris s. helicis.

Сушь мышечныя поперечныя волокна ,
которыя лежатъ сзади уха и покрываюшь
впадину между завишками до раковины.

Сила. Тянетъ край уха къ противу-
завишку.

M. завитновая.

M. helicis.

Начинается спереди отъ ости вил
переднаго края завишкы, лежитъ спереди уха
между завишкомъ и прошивузавишкомъ ,
оканчивается въ ости прошивузавишкы.

Сила. Тянетъ завишокъ къ ладъ и
промежутокъ или бразду , между ими нахо-
дящуюся , сбуживаетъ.

M. основно - молотковая.

M. laxator maior tympani.

Начавшия отъ основного отростка основной кости, длинная сухая жила ея, прошедши чрезъ глазерову суставную височную трещину въ барабанную полость, оканчивается во всемъ длинномъ отросткѣ молотка.

Сила. Тянетъ молоточекъ впередъ, въ барабанной плавѣ, чрезъ что барабанную перегородку ослабляетъ.

M. барабанно - молотковая.

M. laxator minor tympani.

Начавшия отъ верхнаго края слухового вѣнчнаго хода, гдѣ прикрепляется барабанная разгородка, идеть външъ и оканчивается у корня меньшаго отростка молоточка.

Сила. Содѣйствуетъ предвидущей мышцѣ и тянетъ въ верхъ молотокъ.

M. трубо - молотковая.

M. tensor tympani s. Eustachianus.

Начавшия отъ верхней части хрящевой Евстахиевой шрубы и отчасти отъ основной кости, идеть чрезъ собственный каналъ въ барабанную полость чрезъ каналъ пирамидки, гдѣ, загнувшись у окончанія

Часть IV.

сего канала , прикрепляется по внутренней части длинного опросчка молошочка , у головки сухожилью плевою .


Сила. Тянетъ молошочекъ внутрь , а посредствомъ его барабанную перепонку такъ , что въ ней снаружи дѣлается владива .

M. стремянная.

M. stapedius.

Лежитъ въ собственномъ каналѣ , изъ коего вышедши сухая жила ея чрезъ дырочку пирамидной выпуклости , прикрепляется къ задней части шейки и головки спремяна .

Сила. Тянетъ спремянную косичку къ предверію , при чемъ заднюю часть основанія ея прижимаетъ къ яйцеобразной дырѣ и тѣмъ помогаетъ переходить звуку въ барабанчикъ меньшой , а переднюю отводить отъ оной и помогаетъ нашагивашь барабанную плеву .



ГЛАВА III.

О

Мышцахъ лица , носа и губъ .

Musculi faciei , nasi et labiorum .

M. подкожная предшайная или грудно-личная.

M. subcutaneus s. latissimus colli, s. platismotyodes.

Она есть тонкая и широкая мышца, которая, начавшия подъ кожею груди, предъ М. грудино-плечною, предъ 2 мѣ и 3 мѣ ребромъ, идучи въ верхъ покрываетъ ее, ключицу и шею спереди и съ боку, а оканчивается въ кожѣ лица. Пучокъ сей мышцы, которой, начавшия у нижняго конца предъ-ушной железы, лежитъ поперечно на лицѣ и оканчивающемся въ углѣ рта, называется *Санториновою мышцею* (*musculus risorius Santorini*), отводящую уголь рта.

Сила. Тянешь уголь рта, нижнюю губу, кожу щеки и шею внизъ, прижимаешь подъ-челюстную и предъушную железы; также содействуетъ мышцамъ, отводящимъ нижнюю губу и челюсть отъ верхней.

M. Устная или губиал.

M. orbicularis oris s. constrictor labiorum.

М. сіа состоитъ изъ двухъ слоевъ, наружного и внутреннего; наружный состоитъ изъ концовъ мышецъ: ланцетныхъ,

скуловыхъ, поднимающихъ, также осаждающихъ губы и углы рта, а внутренний слой состоитъ изъ собственныхъ волоконъ. Часть мышцы сей, составляющая верхнюю губу, даетъ пучокъ, который оканчивается спереди во внешнемъ краѣ ноздряной разгородки и можетъ называться мышцею подъемлющею губу или осаждающею (*musculus depressor septi narium*) овую или разгородко-губною подъемлющей.

Сила. Сжимая губы, закрываетъ ротъ и осаждаетъ ноздряную разгородку.

M. поднимающая верхнюю губу и ноздрю.

*M. levator labii superioris alaeque nasi,
s. dilatator naris.*

Начавшися отъ верхушки носового отростка верхней челюсти, где соединившися съ корнемъ лобной мышцы, идетъ съ боку хребта носа въ низъ, и оканчивается съ боку ноздри и въ верхней губѣ.

Сила. Поднимаетъ верхнюю губу и ноздрю, разширяетъ сю и сморщиваетъ кожу носа.

M. скуло-губная.

M. zygomaticus minor.

Начавшия отъ передней поверхности скуловой кости подъ наружнымъ угломъ глазницы и вековою мышцею, идетъ ко-
свенно въ низъ, а оканчивается въ верхней
губѣ подъ угла рта.

Сила. Поднимаетъ конецъ верхней губы,

M. скуло-угловая

M. zygomaticus maior.

Начавшия отъ средины передней по-
верхности скуловой кости, ниже скуло-губ-
ной мышцы, оканчивается въ углу рта.

Сила. Поднимаетъ уголъ рта и смор-
щиваетъ щеку.

M. подглазничная губная.

M. levator labii superioris proprius.

Начавшия отъ нижняго края глазни-
цы, надъ переднимъ отверстиемъ подъ-глаз-
ничного канала, оканчивается въ верхней
губѣ,

Сила. Верхнюю губу поднимаетъ на-
сколько въ глазной впадинѣ,

M. подъ-глазничная угловая рта.

M. levator anguli oris.

Начавшия отъ ямочки , находящейся подъ переднимъ отверстиемъ подъ-глазничаго канала , оканчивается въ угѣ рта.

Сила. Уголъ поднимающъ и вспучивающъ щеку.

M. пониждающая верхнюю губу.

M. depressor labii superioris.

Начавшия отъ корня ячейки переднаго верхнаго зuba , оканчивается на внушенной поверхности верхней губы съ боку губной прицѣочки (*fraenulum labii*).

Сила. Верхнюю губу тянетъ внизъ.

M. сжимающая ноздрю.

M. compressor naris.

Начавшия съ боку корня бокового ноздрянаго храца (*ala nasi*) и соединившия съ мышцею , поднимающею верхнюю губу и бокъ ноздри , также съ осаждающею оный , лежатъ поперечъ на хребтѣ у конца носа , гдѣ опять соединившия сухожильного пленкою съ таковою же своей дружки и съ волосами лобной мышцы , на хребтѣ носа лежащими , оканчивающейся.

Сила. Прижимая бокъ конца носа къ преградѣ суживающъ ноздрю.

M. понижающая ноздрю или предчелюстная носовая.

M. depressor alae nasi.

Начавшися отъ корня носового отростка верхней челюсти у корня ячейки угловаго зуба, оканчивается въ нижнемъ краю боковаго хряща ноздри и въ смѣжныя мышцы.

Сила. Свуживаетъ ноздрю, осаждая бокъ ея.

M. нижне-челюстная угловая.

M. depressor anguli s. triangularis oris.

Начавшися снаружи отъ нижняго края съ боку подбородка нижней челюсти, оканчивается въ углѣ рта.

Сила Уголъ рта тянетъ внизъ.

M. подбородковая губная.

M. depressor labii inferioris, s. quadratus menti s. quadrangularis.

Начавшися отъ нижняго подбородка края, оканчивается въ нижней губѣ.

Сила. Тянетъ внизъ нижнюю губу.

M. поднимающая нижнюю губу.

M. elevator labii inferioris.

Начавшися отъ корней ячекъ переднихъ двухъ зубовъ съ боку вѣшней ости нижней челюсти, оканчивается на внутренней поверхности нижней губы съ боку приступочки ея.

Сила. Поднимаетъ нижнюю губу, если она чрезвычайно понижена; а если она находится въ естественномъ положеніи, то она понижаетъ ее.

M. поднимающая подбородокъ.

M. levator s. transversus menti.

Начавшися у корня ячейки угловаго зуба нижней челюсти, идетъ поперечно по срединѣ подбородка, дѣлаясь шире и, соединившися съ концомъ дружки своей, оканчивается. Она предствляетъ видъ полукруга, который лежитъ поперечно на внутренней поверхности нижней губы съ боку приступочки.

Сила. Поднимаетъ нижнюю губу и подбородокъ, а болѣе тянетъ ее ѿ приступочки къ углу рта.

M. Laniplna.

M. Buccinator.

Начавшия отъ корня ячейки заднаго
жоренаго зуба около переднаго отверстія
внѣ-челюстнаго канала, отъ крючка небнаго
отростка основной кости, отъ косой вѣшней
черты нижней челюсти, лежитъ поперечъ
щеки и оканчивается въ углѣ рта и концахъ
тубъ.

Сила. Тянетъ уголъ рта къ уху,
сморщиваетъ средину щеки (бисса), или
лазиту, движетъ воздухъ и другія тѣла, на-
ходящіяся между ланишами и зубами во рту
и выгнояетъ оныя. Дѣйствуетъ при плева-
ніи, при надуваніи трубныхъ орудій, при
жеваніи, глошаніи, сосавіи, при свистѣ и
пѣніи.

ГЛАВА IV.

O

Мышцахъ глазныхъ.

Musculi oculorum.

M. вековая.

M. orbicularis palpebrorum.

Она раздѣляется на два слоя: *большой*
и малой наружной и меньшей, или сосущ-

вляющій веки. *Наружный слой*, начавшися внутреннею вековою связкою (*ligamentum palpebrale*), у верхушки носового отростка верхней челюсти, по срединѣ внутренняго угла глазницы (*orbita*) и, обходя оную, покрываешь края ея, а оканчиваешь въ скованной связкѣ. Внутренний слой начинается и оканчивается вмѣстѣ съ наружнымъ, а отличается отъ него, что лежа подъ кожею вековъ, составляетъ ихъ.

Сила. Сближая края и углы вековъ; закрываешь глазъ, прогоняешь слезы въ внутреннему углу его, отвращаешь излишнее падение въ него лучей свѣща и проч. и симъ способствуешь зрѣнію.

M. нособровная.

M. corrugator supercilii.

Начавшися отъ носового конца бровной дуги у надпереносца, идешь косвенно подъ корнемъ лобной мышцы, и оканчиваешь по срединѣ брови въ кожѣ въ лобной *M.*

Сила. Тянетъ одну бровь къ другой, приподнимаетъ волосы ихъ, для наведенія глазамъ щеки и отведенія влагъ, текущихъ со лба и удаленія излишнихъ лучей свѣща.

M. поднимающее веко.

M. levator palpebrae superioris.

Начавшися общимъ сухожильнымъ на чадомъ съ надъ-очными мышцами, косою и прямою отъ верхней части сухожильного кольца зрительной дыры, лежитъ надъ глазомъ и оканчивается въ краѣ верхнаго века сухожильною плеовою.

Сила: Верхнее веко поднимаетъ и открываетъ глазъ.

M. прямой глазницы.

M. recti oculi.

Всѣ чѣтыре мышцы сіи, начавшися вмѣстѣ съ мышцею, поднимающею веко, и косою надглазной отъ сухожильного связочнаго ихъ кольца, окружающаго дно глазницы или зрительную дыру, оканчиваются въ переднемъ краѣ плотной, наружной или непрозрачной оболочки глаза сухожильною бѣлочною плеовою. Одна изъ прямыхъ мышецъ лежитъ надъ шаромъ глазнымъ, почему называется *надглазною* (*rectus superior, s. attollens*); другая подъ шаромъ, и называется *подглазною* (*r. inferior, s. deprimens*); 3я на выпущенней сторонѣ глаза, и называется

прямюю внутреннею (г. *internus*, с. *adductor*), а 4я лежитъ на вѣшней сторонѣ глаза, и называется прямюю наружною (г. *externus*, с. *abductor*).

Сила. 1я Прямая надѣглазная, дѣйствующа одна, направляетъ глазъ зрачкомъ, или зеницу глаза къ верху, чѣмъ обнаруживаетъ гордость и удивленіе; 2я направляетъ зеницу внизъ и обнаруживаетъ снисхожденіе, заботу и уваженіе; 3я обращаетъ зрачокъ къ носу, обнаруживаетъ удовольствіе, любовь и радость, а 4я или виѣшилия направляетъ глазъ зрачкомъ въ наружному углу глаза или векъ, обнаруживаетъ неудовольствіе, негодованіе и гнѣвъ. Всѣ прямые мышцы сіи, дѣйствующа совокупно, піянуть шаръ глазной ко дну глазницы и сжимаютъ, а особенно заднюю половину шара его. При чѣмъ передняя половина вынуживается отъ влагъ, подающихихъ въ передѣ.

M. косая надглазная.

M. obliquus superior oculi s. trochlearis.

Начавшия надѣ прямую верхнюю мышцу глаза, лежишъ надѣ овымъ, и пе-

ремънившися въ сухую жилу, проходитъ блокъ, лежащій въ носовомъ углѣ глазницы, потомъ идетъ подъ концомъ мышцы, поднимающей веко, а оканчивается у конца M. верхней прямой сверху и посрединѣ вѣшней оболочки шара глаза.

Сила. Глазъ поворачиваетъ къ носу и направляетъ зеницу въ верхъ.

M. косая подъ-глазная.

M. obliquus oculi inferior.

Начавшияся отъ внуширенней поверхности средины нижняго края глазницы, надъ переднимъ отверстіемъ подглазничнаго канала, оканчивающейся въ наружной оболочкѣ съ наружной стороны глаза, подъ концомъ мышцы вѣшней прямой.

Сила. Поворачиваетъ глазъ наружу и внизъ, чѣмъ зрачокъ направляетъ къ верху и къ виску.

ГЛАВА V.

О

*Мышцахъ нижней челюсти.**Musculi maxillae inferioris.**M. височно-челюстная.**M. temporalis s. crotaphites.*

Начавшися отъ полукружной черты костей: лобной, верхушечной и чешуйной, покрываетъ всю полукружную плоскость тѣхъ же костей, внутреннюю поверхность скуловой кости и боковыхъ отростковъ основной кости, гдѣ соединившися въ сухожильную широкую пластиинку, проходитъ скуловую ямину подъ дугою ея и оканчивается въ верхушкѣ вѣнчнаго или переднаго отростка нижней челюсти.

Мышца сія выше дуги покрыта плечевымъ влагалищемъ, которое начинается отъ надчертепника, а прикрѣпляется оба къ верхнему краю и ко внутренней поверхности скуловой дуги.

Сила. Тянетъ въ верхъ нижнюю челюсть и прижимаетъ къ верхней при разгрызываніи ореховъ, поднимая челюсть, закрываетъ ротъ и проч.

M., *кусательная или скучальная, челюстная.*

M. masseter.

Начавшися отъ нижняго края скучовой kostи и дуги, оканчиваетя во всей наружной поверхности угла нижней челюсти.

Сила. Прижимаєшъ нижнюю челюсть къ верхней прикусії, разгрызываніи тѣль и скреежаніи.

M. жевательная наружная или прыло-челюстная мышечковая.

M. pterygoideus externus.

Начавшися отъ мышечной оспи, находящейся снаружи у корня височнаго отростка основной kostи, и отъ всей наружной поверхности вѣшней пластиинки вѣнчаго отростка ея, идешь наружу нѣсколько и назадъ, а оканчиваетя въ яминѣ, находящейся на передней поверхности шейки суставнаго отростка нижней челюсти.

Сила. Прижимаетъ нижнюю челюсть къ височной, тянетъ ее въ верхъ и на противоположную сторону.

M. внутренняя жевательная или прыло-челюстная угловая.

M. pterygoideus internus.

Начавшися отъ ямки, находящейся между пластиинками небнаго отросшка основной кости, оканчивающейся на внутренней поверхности угла нижней челюсти.

Сила. Нижнюю челюсть движешь, внутрь на прошивную сторону дружишъ своей и прижимаешь къ верхней.

M. подбородно - сосковая.

M. digastricus s. biventer maxillae inferioris.

Начавшися отъ большой вырезки сосцевиднаго отросшка височной кости, идеть впередъ и внутрь, прошедши сухожильную своею срединою сквозь конецъ мышцы шилодужковой и сдѣлавшися опять мясною, оканчивающейся съ боку нижнаго конца внутренней подбородочной ости.

Сила. Тянемъ нижнюю челюсть въ низъ, открывашъ ротъ, прижимаешь подъ-челюстную слюнную железу и способствуешь испражненію ея слюны.



ГЛАВА VI.

О

*Мышцахъ переднихъ шейныхъ
и волервыхъ о Мн. дужки.*

Musculi colli anteriores.

M. грудино - дужковая.

M. sternо - hyoideus.

Начавшися отъ внутренней поверхности верхнего края рукоятки, грудинного конца нагрудника и сустава ихъ, лежащихъ съ боку дыхательного горла, а оканчивающихся въ нижнемъ краю тѣла дужки.

Сила. Тянетъ дужку внизъ и соединяется съ нею части.

M. лопатно - дужковая.

M. отоплato - hyiodeus.

Начавшися отъ верхняго края лопатки у верхней вырезки и отъ вырезковой связки лопатки, оканчивается съ боку дужки у корня большаго ея конца. М. сія по срединѣ сухожильная.

Сила. Тянетъ дужку и съ нею соединяется части внизъ и на бокъ.

M. челюстно-дужковая.

M. mylo-hyoideus s. transversus mandibulae,

Начавшися отъ средины вдоль внутренней поверхности нижней челюсти, оканчивающейся въ срединѣ всей внешней поверхности основания дужки,

Сила. Поднимаетъ дужку и языкъ къ небу и выжимаетъ слону изъ подъ-язычной слюнной железы,

M. подбородко-дужковая

M. genio-hyoideus.

Начавшися отъ средины оси подбородка выше подбородко-сосковой и челюстно-дужковой Мм., оканчивается снаружи въ верхнемъ краѣ тѣла дужки.

Сила. Тянетъ въ верхъ и въ передъ дужку, осаждаетъ нижнюю челюсть и высовываетъ языкъ,

M. шило-дужковая,

M. stylo-hyoideus.

Начавшися снаружи отъ корня шиловидного отростка височной кости, пропущаетъ сквозь конецъ свой мышцу подбород-

ко-сосковую, а оканчивается въ тѣль дужки
у корня большихъ ея вѣтвей.

Сила. Тянетъ дужку и горшань назадъ
и вверхъ.

M. щито-дужковая.

M. thyreo - hyoideus.

Начавшися отъ боковой вѣшней косой
перты щитного хряща, оканчивающейся сна-
ружи въ большихъ концахъ (cornua) дужки.

Сила. Тянетъ дужку внизъ и приво-
дитъ къ щитному хрящу.

ГЛАВА VII.

О

Мышцахъ языка,

Musculi linguae.

M. подбородко-язычная.

M. gonio - glossus.

Начавшися отъ средины внутренней
подбородковой ости выше подбородка,
оканчиваются въ корень языка снизу пря-
мостоящими волокнами. Нѣкоторыя изъ

сихъ волоконъ идутъ къ хребтику надгортанника и называются мышцею **язычно-надгортаническою** (*glosso-epiglotteus*), а другія соединяются съ смежными мышцами.

Сила. Тянетъ языкъ впередъ, высовываетъ его изъ открытаго рта и прижимаетъ подъязычную железу и языкъ къ небу.

M. шило-язычная.

M. stylo-glossus.

Начавшися отъ верхушки шиловиднаго отростка, оканчивается съ боку языка.

Сила. Тянетъ языкъ вверхъ и на бокъ.

M. дужно-язычная.

M. hyo-glossus.

Начавшися снаружи съ боку основания, также большихъ и меньшихъ концовъ дужки, оканчивается въ бокъ языка. Первая часть ея по началу названа была (*M. basioglossus*, за *chondro-glossus*, а 3я *cerato-glossus* Albini).

Сила. Тянетъ бокъ языка въ низъ.

M. язычная.

M. lingualis.

Мышца сія составляетъ весь бокъ языка. Начавшия отъ корня его, оканчивающиа въ верхушкѣ языка; вѣкоторыя водокны ея имѣютъ прямое, а прочія разнообразное направление и соединяются съ мышцами, оканчивающимися въ языке.

Сила. Сокращаетъ языкъ, загибаетъ конецъ его вверхъ или внизъ къ прицѣпочкѣ (*fraenulum*).



ГЛАВА VIII.

Мышца грудино-сосковая.

Musculus sterno-cleido-mastoideus.

Начавшия двумя началами: однимъ отъ наружной поверхности верхнаго края рукоятки грудины, а другимъ отъ верхней поверхности грудинного конца надгрудника, вѣкоторыя, соединившия посрединѣ М., всходяще съ боку шеи и оканчивающиа въ корнѣ сосцевиднаго отростка основной кости.

Сила. Голову наклоняетъ впередъ и на бокъ, а иногда дѣйствуетъ превращно.

M. треугольная зашейная или налетная.

M. splenius s. triangularis.

Начавшися однимъ началомъ отъ зашылочно-зашейной связки, отъ остныхъ отростковъ: зго нижняго шейнаго и почти отъ 5ти верхнихъ хребетныхъ позвонковъ, восходя косвенно вверхъ, раздѣляется на двѣ части, изъ коихъ одна оканчивается въ верхней затылочной дугѣ, а другая въ поперечныхъ отросткахъ всегда почти двухъ верхнихъ шейныхъ позвонковъ.

Первая часть по паковому окончанию ея называется *M. налетною головы*, а вторая *шеи*. Объ онѣ лежатъ, начинаются и оканчиваются подъ мышцею *зашейною подножною*.

Сила. Верхнюю часть шеи и голову наклоняетъ назадъ и на бокъ, словомъ склонить, разгибаешь шею.

M. поднаметная или головная двубрюшная.

M. digastricus capitis et complexus.

Начинается сухими жилами отъ поперечныхъ отростковъ 1, 2, 3, 4, 5, 6,

и хребетного позвонка, лежитъ подъ М. на-
мечиною или треугольною головою, средина
задней части ея сухожильная и овальная.
М. сія идетъ нѣсколько косвенно вверхъ и
оканчивается вмѣстѣ подъ верхнею заты-
лочною дугою.

Сила. Тянетъ голову назадъ и на
бокъ; дѣйствуетъ же съ дружкою вмѣстѣ, на-
клоняетъ голову назадъ и разгибаешь шею.

M. зашейно-сосковая.

M. trachelo-mastoideus.

Лежитъ подъ передняго края поднаме-
точной М., начавшия отъ поперечныхъ от-
ростковъ нижняго 1го выйнаго и трехъ
верхнихъ хребетныхъ позвонковъ, идеть
косвенно вверхъ, оканчиваешься въ меньшей
выемкѣ сосковаго отростка. Она соединяется
съ хребтовою длинною.

Сила. Наклоняетъ голову и шею на
бокъ и назадъ, дѣйствуя же съ дружкою
свою, разгибаешь шею.

*M. прямая зашейная большая или
зубатико-затылочная.*

M. rectus posticus maior capitis.

Начавшия съ боку верхушки оспнаго отростка зубатика, т. е. 2го шейнаго позвонка, идеть вверхъ и оканчивается въ нижней дугѣ запылочной кости.

Сила. Тянетъ голову назадъ и разгибаетъ шею.

M. прямая зашейная меньшая или подзатыльниковая - затылочная.

M. rectus posticus minor capitidis.

Начавшия отъ бугорка заднаго полукруга первого шейнаго позвонка, или подзатыльника, оканчивается сзади подъ края запылочной дыры.

Сила. Наклоняетъ голову назадъ.

M. подзатыльниковая яремная.

M. rectus lateralis capitidis.

Начавшия отъ поперечнаго отростка подзатыльника, оканчивается въ яремномъ (*jugularis*) отросткѣ запылочной кости.

Сила. Тянетъ голову на бокъ и на передъ.

M. подзатыльниковая затылочная носая.

M. obliquus superior sive minor capitidis.

Начавшия отъ верхней и задней поверхности поперечного отростка подзатыльника, лежитъ косвенно, а оканчивается въ наружномъ концѣ нижней запылочной дуги.

Сила. Поворачиваетъ голову назадъ и на бокъ.

M. зубатниковая подзатыльниковая носая.

M. obliquus inferior sive maior capitii.

Начавшия съ боку верхушки оспинаго отростка зубатика, оканчивается въ задней и нижней поверхности поперечного отростка подзатыльника.

Сила. Поворачиваетъ первый шейный позвонокъ и голову на бокъ и назадъ; мышцы сіи, дѣйствуя поперемѣнно съ дружкою, движущій голову въ полукругѣ.

M. предъ-шейная длинная.

M. longus colli.

Начавшия отъ средины передней поверхности пѣль 3-хъ верхнихъ реберныхъ и отъ 5 верхнихъ шейныхъ позвонковъ, оканчивается въ поперечныхъ отросткахъ пятнадцати верхнихъ шейныхъ и въ переднемъ

буторкъ подзатыльника, также въ бугоркѣ основнаго отростка затылочной кости. Ко-
сые волокна сей послѣдней части досель называемы были *M. прямю большою пе-
реднею головы.*

Сила. Наклоняешь шею на бокъ.

M. прямая предшейная.

M. rectus anticus capitis.

Начавшияся отъ передней дуги подза-
тыльника (*atlas*), оканчивается снаружи и
съ боку основнаго отростка затылочной ко-
сти предъ суставнымъ отросткомъ.

Сила. Наклоняешь голову въ передъ и
на бокъ.

О Т Д Ё Л Е Н И Е Ш.

о

Мышцахъ туловища.

Musculi trunci.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

о

Мышцахъ горлани (*larynx*).

M. грудино-щитнаг.

M. sterno-thyreoideus.

Начавшися отъ внутренней поверхности верхняго края рукоятки грудины и отъ хряща перваго ребра, восходитъ по передней и боковой частии дыхательного горла подъ мышцею грудино-дужковою, а оканчивается въ нижней поверхности косой черпмы щитнаго хряща, гдѣ даешь пучокъ предщипной железы.

Сила. Тянетъ горшанъ внизъ и разширяетъ ее.

Г

M. грудино-щитник.

M. crico-thyreoideus.

Начавшися снаружи, съ боку и отъ передней поверхности перстневаго хряща, восходитъ косвенно спереди наружу, оканчивается въ нижнемъ краѣ щитнаго хряща.

Сила. Щитный хрящъ тянется внизъ и разширяется гортани.

M. кольце-пирамидная задняя.

M. crico-arytaenoideus posticus.

Начавшися отъ наружной поверхности широкаго или задняго полукруга перстневаго хряща, идетъ косвенно вверхъ, а оканчивается въ бугоркѣ, находящемся сзади и снаружи у корня пирамиднаго хряща.

Сила. Тянется пирамидный хрящъ назадъ и наружу. При чемъ отводя онъ отъ его дружки, разширяется гортансое отверстіе (*rima glottidis*).

M. боковая кольце-пирамидная.

M. crico-arytaenoideus lateralis.

Начавшися съ боку задней части перстневаго хряща, восходитъ косвенно и оканчивается въ наружномъ углѣ у корня пирамиднаго хряща.

Сила. Тянетъ пирамидный хрящъ наружу , отводитъ его отъ дружки , при чемъ разширяешь горшанъ.

M. щито - пирамидная.

M. thyreο - arytaenoides.

Начавшияся отъ шероховатой черпты на внутренней поверхности щитного хряща , оканчивается въ наружномъ углѣ корня пирамидного хряща и на верхнемъ краю , и въ корнѣ надгоршанника (*M. thygoeο - piglotteus*).

Сила. Отводитъ пирамидный хрящъ отъ другого , при чемъ разширяешь горшанъ.

M. носая пирамидная.

M. arytaenoides obliquus.

Начавшияся отъ задней и наружной части пирамидного хряща , восходитъ косвенно , проходя херообразно свою дружку , оканчивается на задней части другого пирамидного хряща .

Сила. Приводитъ одинъ пирамидный хрящъ къ другому , при чемъ служиваешь горшанное отверстіе .

M. полеречная пирамидная или между - пирамидная.

M. arytaenoides transversus.

Сія мышца есть одивакая; она лежицъ предъ косыми мышцами ближе къ отверсшию горшани, начавшися отъ наружнаго угла пирамиднаго одного хряща, оканчивается въ шакомъ же мѣстѣ дружки его.

Сила. Сближаетъ хрящи сіи и съуживаетъ отверсшие горшани.



ГЛАВА II.

О

Мѣшцахъ глопки.

Musculi pharyngis.

Мѣшца шило - глопочна.

Musculus stylo - pharyngeus s. levator, s. dilatator pharyngis.

Начавшися отъ внутренней спороны мория шиловиднаго отростка, оканчивается съ боку глопки между мышцами надглопочкою и дужко - глопочною.

Сила. Тянетъ назадъ, въ верхъ и наружу глопку, при чемъ дѣйствуя съ дружкою, разширяетъ глопку.

*M. надъ - глоточная или челюстно -
глоточная.*

M. constrictor pharyngis superior.

Начавшия ошъ ланишной мышцы, отъ корней заднихъ ячеекъ жевательныхъ зубовъ, отъ крючка небнаго ошростка основной кости и другихъ многихъ смежныхъ чашей, соспавляешь бокъ и заднюю часть глошки и, сзади ея соединившия съ дружкою, оканчиваєшъ въ бѣлой полосѣ (*linea alba*).

Сила. Сжимаешь и поднимаешь верхнюю часть глошки.

M. дужно - глоточная.

M. constrictor pharyngis medius s. hyo-pharyngeus.

Начавшия отъ зерновидныхъ и большихъ концовъ дужки, идешь косвенно въ верхъ въ средней и задней части глошки и покрываешь нѣсколько надъ - глоточную мышцу, гдѣ соединившия съ концомъ дужки своей, оканчивается въ бѣлой полосѣ.

Сила. Среднюю часть глошки сжимаешь.

M. гортаниая глоточная.

M. constrictor pharyngis inferior s. laryngo-pharyngeus.

Начавшися съ боку переднего полукруга перопиневидного хряща, отъ косой черты щипнаго хряща и отъ щипо-дужковой боковой связки, идетъ косвенно назадъ вверхъ и, покрывши нижнюю часть дужко-глощевой мышцы, оканчивается, соединившися съ концомъ дружки своей въ бѣлой полосѣ, въ нижней части глошки.

Сила. Сжимаетъ нижнюю часть глошки и осаждаєтъ ее.

M. языко-небная.

M. glosso-palatinus, glosso-staphylinus s. constrictor isthmi faucium.

Начавшися съ боку корня языка, идетъ вверхъ по переднему полукругу зева и оканчивается въ концѣ небной ости.

Сила. Тянетъ переднюю дугу зева и небную занавѣску въ низъ къ языку,

M. глотко-язычновая или небная.

M. pharyngeo-palatinus s. pharyngeo-staphylinus.

Начавшия отъ верхней передней и боковой части глошки, восходиаъ по передней дугѣ зева и въ немъ оканчиваеца.

Сила. Тянетъ вверхъ и внизъ небную завѣску, дѣйствуя же совокупно съ мышцами язычно-иглоточного - небною, сокращаеца зевъ, прижимаетъ миндалевидныя железы и выпѣсняетъ изъ нихъ слезъ.

M. пирамидно-язычковая.

M. petro-salpingo-staphylinus.

Начавшия снаружи отъ пирамидной (*petrosus*) части височной кости, составляющей бокъ слуховой или Евспахиевой трубы, и отъ хряща ея, сошедши внизъ, оканчиваеца въ корнѣ язычка, а некоторые пучки ея въ концѣ небной ости, гдѣ называются онѣ *одинокою* или *неларнкою язычковою мышцею* (*M. azygos uvalae*).

Сила. Растягиваетъ небную завѣску, поднимаетъ ее вверхъ и назадъ, при чемъ, закрываетъ заднія отверстія ноздрей, шакже слуховыхъ трубъ и сокращая, подни- маеца язычокъ.

M. основно-язычковая.

M. circumflexus palati s. spheno-salpingo-staphylinus.

Начавшися отъ оспи основной кости и отъ хряща слуховой трубы, идеть ко-
свенно внизъ и, перемѣнившись въ сухую
тонкую жилу, зацѣпляется за крючекъ неб-
ного опростка основной кости, а оканчиваеть-
ся въ заднемъ краѣ небной кости, соединив-
шися съ своею дружкою.

Сила. Разтягивающа небную завѣсу.

~~~~~

### ГЛАВА III.

О

*Мышцахъ всей спины и ребръ.*

*M. четыре - зубал спино - ребернай.*

*M. serratus posticus superior.*

Начавшися отъ нижняго конца зашей-  
но - запылочной связки, съ боку верхушки  
оспистаго опростка 7го шейнаго и 3хъ  
хребетныхъ верхнихъ позвонковъ, лежитъ  
косвенно, и оканчивается 4ми зубцами въ  
верхнемъ крае, по большой часши 2, 3, 4  
и 5го ребра.

*Сила.* Поднимающа ребра.

*M. четвъре-зубая пояснице-реберная.*

*M. serratus posticus inferior.*

Начавшися отъ вѣшней пластинки влагалища поясничной или длинной спинной и проч. мышцѣ, или отъ корня косой брюшной, широкой спинной сухожильною плевою (*aponevrosis intermuscularis serratorum*), находящейся между нижнимъ краемъ верхней и верхнимъ нижней четырехзубыхъ мышцѣ, а оканчивающейся въ нижнемъ краѣ четырехъ нижнихъ ребръ 4 зубцами.

*M. шейно-реберная передняя.*

*M. scalenus anticus.*

Начавшися отъ вѣрхней поверхности 1го ребра, оканчивающейся спереди въ попечныхъ отросткахъ 5, 6го, а иногда и 7го шейнаго позвонка.

*M. шейно-реберная средняя.*

*M. scalenus medius.*

Начавшися сзади предъ-идущей м. отъ 1го ребра, оканчивающейся въ попечныхъ отросткахъ всѣхъ шейныхъ позвонковъ.

*M. шейно-реберная задняя.*

*M. scalenus posterior.*

Начавшися отъ наружной поверхности 2го ребра, сзади предыдущей м. оканчи-

вается въ поперечныхъ отросткахъ прерхъ нижнихъ позвонковъ шейныхъ.

*Сила.* Три мышцы сіи имѣюшъ одинакое дѣйствіе, поднимающъ ребра или ваклоняющъ шею на бокъ,

*M. лонгissимус-реберная лучковая.*

*M. lumbo-costalis, s, sacro-lumbalis et longissimus dorsi,*

Имѣющъ одно начало съ М. длиною хребтною, отъ остныхъ отростковъ крестцовой кости, отъ всѣхъ поясничныхъ или брюшныхъ позвонковъ, отъ верхней задней связки шаза и задней оси подвздошной кости, и опадлившися отъ означенной М. при 12 ребрѣ, сопутствуетъ ей со вѣнчанаго боку, или лежитъ далѣе ея отъ позвонковъ, а оканчивается 13 наружными восходящими или передними сухими жилами въ нижнихъ краяхъ по большей части угловъ всѣхъ ребръ и въ поперечномъ отросткѣ седьмаго шейнаго позвонка, а 12 задними нисходящими въ верхнемъ краю 12 нижнихъ ребръ. Она соединяется въ верху съ М. нисходящею шейною (*cervicalis descendens*).

*Сила.* Тянетъ ребра внизъ, осаждаеть грудь, можетъ дѣйствовать восходящими

осаждая, нисходящими поднимая ребра, и разгибаетъ спину.

*M. хребтовая длинная.*

*M. longissimus dorsi.*

Начавшися вмѣстѣ съ М. пояснице-реберною, лежитъ ближе къ позвонкамъ, оканчивающіяся 10 сухими восходящими или передними жилами въ нижнемъ краю шестикихъ же ребръ, а 12 таковыми же концами восходящими, или же задними въ поперечныхъ опросникахъ всѣхъ реберныхъ позвонковъ.

*Сила.* Тянетъ внизъ ребра и позвонки, къ коимъ прикрепляется и разгибаетъ спину.

*M. разгибающая шею наружная.*

*M. erector cervicis superficialis.*

Начавшися двумя сухими жилами отъ поперечныхъ опросниковъ 5 и 6 го шейнаго позвонка, идеть къ боку спины, оканчивающіяся, соединившися съ мышцею пояснице-реберною пучковою въ верхнемъ краю 2, 3 и 4 го ребра.

*Сила.* Тянетъ шею внизъ и на бокъ, действуя же съ дружкою, разгибающія шею.

*M. разгибающая шею глубокая.*

*M. erector cervicis profundus.*

Начавшися отъ поперечныхъ отростковъ 5 верхнихъ реберныхъ позвонковъ, оканчивающія въ поперечныхъ отросткахъ всѣхъ шейныхъ позвонковъ.

*Сила.* Тянетъ внизъ шею и на бокъ, дѣйствую же съ другою, разгибающа ея.

*M. спино-хребтовая.*

*M. erector s. spinalis dorsi.*

Начавшися отъ спинныхъ отростковъ 2-хъ верхнихъ, а иногда болѣе, поясничныхъ позвонковъ, оканчивающія въ спинныхъ же отросткахъ 8 нижнихъ хребетныхъ позвонковъ, выключая одинъ или болѣе около десятаго спинного отростка, которые не привѣтиляются, а мимо проходятъ.

*Сила.* Разгибающа спину и содержимое ее въ прямомъ положеніи.

*M. разгибающая спину и шею по верхностямъ.*

*M. erector dorsi et cervicis.*

Начавшися отъ поперечныхъ отростковъ 9-ти верхнихъ реберныхъ позвонковъ, оканчивающія въ спинныхъ отросткахъ 2-хъ

верхнихъ хребетныхъ позвонковъ и бѣши  
нижнихъ шейныхъ.

**Сила.** Тянетъ шею и верхнюю часть  
спины назадъ, внизъ и на бокъ, дѣйствуя  
же съ дружкою, разгибаютъ спину.

*M. разгибающая позвоночной столбъ  
лучковая.*

*M. erector columnae vertebralis s. multi-  
fidus spinae.*

**M.** Сія состоишъ изъ 25 наруж-  
нихъ, и сполько же внутреннихъ частей  
или малыхъ мышцъ, изъ коихъ вѣщ-  
нія, начавшия отъ 4хъ боковыхъ бугорковъ  
крестца, отъ поперечныхъ отростковъ  
всѣхъ поясничныхъ, реберныхъ и 5ти ниж-  
нихъ шейныхъ позвонковъ, идущъ косвенно  
въ вѣрхъ, и соединившия съ своими внутр-  
енними пучками, оканчивающи въ 3хъ  
остныхъ бугоркахъ крестца и съ боку всѣхъ  
остныхъ же отростковъ всѣхъ позвонковъ,  
выключая зубчикъ и подзашыльникъ. Она  
заполняетъ бразду, находящуюся сзади  
между остными и поперечными отростками.

**Сила.** Тянетъ позвонки сіи внизъ, дѣй-  
ствуя же съ своею дружкою, разгибающъ

шею, спину и поясницу, и содержатъ ихъ въ прямомъ положеніи.

*M. между-оспныя шейныя.*

*M. interspinales colli.*

Малыхъ мышецъ сихъ находится пять паръ. Онъ лежатъ между оспными опросниками шести шейныхъ вижнихъ позвонковъ шакъ, что каждая изъ нихъ начинается отъ нижняго края одной верхушки раздвоенного опросника, а оканчивается въ верхнемъ краѣ смежной верхушки шакового же опросника.

*Сила.* Сближаетъ оспные опросники и разгибаетъ шею наклоненную впередь.

Таковыя же мыщцы всегда находятся между оспными опросниками поясничныхъ позвонковъ, а иногда между М. между-реберными, — дѣйствіе ихъ на спину сходно съ первыми.

*M. между-полоперечныя шейныя.*

*M. intertransversales colli.*

Сіи мыщцы суть шаковыя же, какъ между-оспныя шейныя. Онъ начинаются и оканчиваются, какъ между-оспныя. Ихъ находится по шести паръ на обѣихъ спо-

ронахъ шеи, а между прочими поперечными отростками по одной мышцѣ, но и то не всегда.

*Сила.* Онъ всѣ вообще сближающъ поперечные отростки и сгибающъ позвоночный столбъ.

*M. поднимающія ребра длинныя.*

*M. levatores costarum longi.*

Число сихъ мышецъ непостоянно: ихъ находятся отъ трехъ до четырехъ на каждой сторонѣ въ низу, а иногда и въ верху. Оне начинаются снаружи отъ верхушки поперечныхъ отростковъ реберныхъ позвонковъ, первая отъ 7го, вторая отъ 8го, а 3я отъ 9го, каждая изъ нихъ, перешедши одно, оканчивающа снаружи въ слѣдующемъ ребрѣ.

*Сила.* Поднимаетъ четыре нижнія ребра.

*M. поднимающія ребра короткія.*

*M. levatores costarum breves.*

Сихъ мышецъ находится на каждомъ боку груди по 12: первая изъ нихъ начинается отъ поперечного отростка 7го шейнаго позвонка, а прочія 11 отъ толстыхъ же верхушекъ поперечныхъ отростковъ реберныхъ позвонковъ, а оканчивающа

каждая изъ нихъ въ смежномъ ребрѣ, гдѣ соединяющія саѣ съ поперечными отросшками реберныхъ позвонковъ.

*Сила.* Поднимаешь ребра.

*M. между - реберныхъ.*

*M. intercostales.*

Мышецъ сихъ находится на каждомъ боку груди по 22. Онъ лежатъ въ 11 - реберныхъ межулкахъ. Наружный слой ихъ (*M. intercostales externi*), начавшися отъ верхушекъ поперечныхъ отросшковъ и отъ наружной поверхности ребръ, идетъ сзади внизъ и впередъ, а внутренний слой, отъ внутренней поверхности нижняго ребра, идетъ спереди назадъ косвенно вверхъ, оканчивающіяся наружный на наружной, а внутренний слой (*M. intercostales interni*) на внутренней поверхности края смежнаго ребра.

*Сила.* Поднимая ребра, разширяющія грудь.

*M. грудино - реберная.*

*M. sterno-costalis s. triangularis sterni.*

Начавшися отъ края внутренней поверхности средины и остроконечія грудины,

бкачивающемся въ хрящахъ 4, 5, 6 и 7 го ребра четырью зубцами.

*Сила.* Тянетъ передніе концы ребръ внизъ и на обратъ.



## ГЛАВА IV.

### О

#### *Мышцахъ брюха.*

#### *Musculi abdominis.*

Брюшныхъ мышецъ (*musculi abdominales*) находится на каждой сторонѣ брюха по 6 и одна въ верху полости онаго грудобрюшная преграда, а именно:

Две косыхъ наружныхъ или висходящихъ;

— — внутреннихъ или восходящихъ;

— поперечныхъ;

Две прямыхъ.

— пирамидальныхъ.

— пояснице-реберныхъ или четырехъ угловыхъ;

и одна мышца грудобрюшня.

*M. прямая брюха или грудино-лобновая.*

*M. rectus abdominis.*

Д

Начавшия двумя широкими сухими жалами, наружною или короткою, отъ ости предпазовой кости, а внутреннею или длинною отъ нисходящей вѣтви ея, оканчивающейся на наружной поверхности края остроконечія грудины и трехъ хрящевыхъ концовъ нижнихъ грудинныхъ ребръ.

Мышца сія, будучи тонка и длинна, имѣетъ для своего укрѣпленія двѣ или три сухожильныя перекладинки или перемычки (*inscriptio[n]es s. intersectiones tendineae*), изъ коихъ одна выше брюшнаго пупка, а двѣ по большей части ниже его находятся. Онѣ не всѣ совершенно пересѣкаютъ сію мышцу; вся мышца сія вмѣщающаяся въ собственномъ своемъ плевочномъ влагалищѣ, названномъ переднимъ брюшнѣмъ.

*Сила.* Тянетъ ребра и грудину внизъ и служитъ при дыханіи.

*M. пирамидальная.*

*M. pyramidalis abdominis.*

Начавшия отъ внутренней поверхности поперечной вѣтви предпазовой кости, оканчивается острою верхушкою въ наклонѣ концѣ бѣлой полосы.

*Сила.* Тянетъ влагалище прямой мышцы внизъ и способствуетъ дѣйствію ея.

*M. косая брюшная нисходящая подкожная.*

*M. obliquus abdominis externus.*

Начавши съ ю мышечными зубцами снаружи отъ поликаго же числа от части костяныхъ, а от части хрящевыхъ концовъ нижнихъ ребръ, между зубцами M. зубчатой ребро-лопаточной и отъ вѣшней пласшиаки задалго брюшного влагалища, оканчивается въ наружной поверхности или съ боку верхнаго края подвздошной кости, въ передней верхней оси ея, въ сухой паховой жилѣ, Фалlopіевою или Пупарціевою называемою, и въ полуунной полосѣ. Мышечные волокна ея идутъ сзади впередъ.

*Сила.* Сжимаетъ брюхо и его внутренности, тянетъ ребра внизъ и впередъ, наклоняетъ туловище на бокъ, дѣйствуетъ при испражненіи виза, мочи, при рвотѣ, родахъ, кашлѣ, крикѣ, смѣхѣ, плачѣ, икотѣ, чиханіи и при другихъ выдыханіяхъ.

*M. косая внутренняя или восходящая.*

*M. obliquus abdominis internus.*

Начавшия широкою сухожильною пле-  
вою отъ поясничаго влагалища, отъ сре-  
дины вдоль верхняго края подвздошной ко-  
сти до передней и верхней спинки ея, мы-  
шечныя волокна ея идутъ косвенно отъ гре-  
бешка вверхъ и внуtrъ и оканчиваются  
въ полуулунной полости, въ нижнемъ краѣ гру-  
ди, состоящемъ изъ концовъ шести ниж-  
нихъ ребръ и остроконечія грудины. Сія  
мышца, вмѣстѣ съ подкожною косою, обра-  
зуетъ паховую сухую жилу, а у пахового  
отверстія составляетъ съ поперечною мыш-  
цею мышцу, подъемлющую шулята.

*Сила* ея сходна съ силою мышцы ко-  
сой нисходящей, сверхъ сего она вокругъ  
объемля сѣмянную шевиву шулять мышеч-  
ными волокнами, образующими мышечную  
оболочку, поднимаетъ ихъ, ускоряетъ опаде-  
леніе сѣмени и течеыie изъ шулята.

*M. поперечная брюшная.*

*M. transversus abdominis.*

Начавшия отъ внутренней поверхности или съ боку гребешка подвздошной kostи, отъ внутренней пластинки задняго брюшного или поясничнаго влагалища, оканчивающеся во внутренней пластинкѣ влагалища прямыхъ мышецъ, также во внутренней поверхности всего нижняго края груди, изъ концовъ ребръ состоящаго. Мыщца сія даешь волокна подлѣ передней и верхней подвздошной осши, которыя, соединившия съ таковыми же волокнами востой внутренней мышцы, соспавляютъ *M. поднимашую шулята* (*M. cremaster s. elevator testiculi*), которая идешъ къ нимъ чрезъ паховое отверстіе, и оканчивается во влагалищѣ ихъ и вокругъ онаго.

*Сила.* Тянетъ ребра внизъ, сжимаетъ брюшныя внутренности, противодействуетъ грудобрюшнѣ и поднимаетъ шуляша.

*M. пояснице - реберная четырехугловая.*

*M. quadratus lumborum s. lumbalis exterior.*

Начавшия отъ средины внутренней поверхности задняго края подвздошной ко-

стя, отъ пояснично-подвздошной верхней связки паза и отъ 4-хъ нижнихъ поперечныхъ отростковъ поясничныхъ позвонковъ, оканчивается на внутренней поверхности нижнего края 12-го ребра.

*Сила.* Тянетъ ребра внизъ.

*M.* грудо-брюшн.

*M.* *diaphragmaticus* s. *diaphragma*, s. *septum transversum*.

Начавшися отъ обѣихъ сторонъ тѣлъ поясничныхъ позвонковъ (*pars lumbalis*), по большей части тремя мясисто-сухожильными пучками (*cirrga s. appendices*): *наружный*, *средний* и *внутренний*, изъ которыхъ правыя всегда начинаются нѣсколько ниже лѣвыхъ. *Наружный* пучокъ, начавшися съ боку отъ тѣлъ поясничныхъ позвонковъ 2-го и 3-го, средний спереди и съ боку 3-го и 4-го, а *внутренний* отъ средней части 2-го, 3-го и 4-го, попомъ всѣ три, подѣлѣ нижнихъ хребетныхъ позвонковъ, соединившися съ дружками своими другой стороны, образуютъ одну сводоподобную мышцу, которая оканчивается на внутренней поверхности нижняго всего грудного края, состоящаго изъ

шести нижнихъ ребръ и остроконечія грудны ( pars costalis s. muscularis ). Края сей мышцы мясистые называются крылами ( alae diaphragmatis ), а сухожильная средина , средоточиемъ которой боки восходящія сухожильныя части ( speculum Helmontii ). Въ сей мышцѣ находятся три отверстія : 1-е правое въ сухожильной ( quadrilaterum s. tendineum ) части , для полой жилы ; 2-е лѣвое переднее въ мягкой части ( muscularare ) , для пище-приемнаго канала , сочувственаго 3-го нерва ( plexus vagus ); 3-е лѣвое заднее между внутренними ручками обѣихъ половинъ преграды сей ( hiatus s. foramen venosum , oesophageum , s. aorticum ), для прохожденія біющейся большой и одинокой жилы , также для груднаго протока . Сверхъ сего между внутреннимъ и среднимъ начальномъ проходяще междуреберная большая и узкая чувственная жила , п. е. Н. сочувственный 4-й . Мышца сія покрыта сверху подреберною , а снизу брюциною ( superficies thoracica et abdominalis ). Видъ грудо-брюшни подобенъ листу трилистника ( trifolium ).

**Сила.** Тянетъ подвѣтныя ребра внизъ, а когда онъ суть неподвижны; то она сокращающа сѣть нимъ и поясница. Сводъ ея, опускаясь внизъ, увеличиваетъ длину грудной полости, а брюшную уменьшаетъ; при чёмъ прижимая брюшная внутренности, вспомогающа дыханію, кровообращенію пищеваренію, отдаленіямъ изпражненіямъ низа, мочи, кровавымъ изверженіямъ, потрясающа желудокъ, печень и селезенку, действуетъ при кашлѣ, чиханіи, голосѣ, свистѣ, крикѣ, пѣніи, икотѣ, рвотѣ, выхаркиваніи и при прочихъ усиливахъ тѣла. Сверхъ этого она отдаляетъ грудную полость отъ брюшной; на ней лежитъ сердце.

Брюшные мышцы составляютъ слѣдующія части брюха:

1. *Вѣлуя полосу* (*linea s. stria alba*), которая есть сухожильная плева, лежащая спереди по срединѣ брюха, между прямymi мышцами. Она вверху шире, нежели внизу; начинается отъ мечеобразнаго хряща грудины, а оканчивается въ соединеніи предплазовыхъ костей и въ концахъ пирамидо-видныхъ мышецъ. По срединѣ длины ея наход-

датся у младенцевъ отверстіе для пупови-  
ны, а по рожденіи ихъ только ямка (от-  
*phalus s. umbilicus.*)

Она есть соединеніе концовъ брюшныхъ  
мышцъ, косвенныхъ наружныхъ, внутрен-  
нихъ также пирамидальныхъ и поперечныхъ;  
прямые мышцы соединяются между собою  
боками посредствомъ оной.

2 е. *Полукружную полосу* (*linea se-  
milunaris spigellii*), которая есть сухожиль-  
ная пlevа. Она образуетъ почти полукружные  
боковые края передней поверхности брюха.  
Она покрываетъ переднюю часть брюха;  
начинается отъ переднаго края косой под-  
кожной мышцы, а оканчивается въ белой  
полосѣ, составивши переднюю пласдинку  
влагалища прямой брюшной мышцы.

3 е. *Паховую сухую жилу* (*ligamentum  
inguinale*), которая есть передній и нижній  
и плевочно-сухожильный или паховый край  
косвенной наружной мышцы. Ова, начавши-  
ся однимъ концомъ отъ передней и верхней  
подвздошной ости, идетъ косвенно къ соеди-  
ненію предпазовыхъ костей, гдѣ раздѣляюща-  
ся на двѣ вѣтви (*cruiga*), изъ коихъ вѣтвь-

тившия къ поперечнымъ отросткамъ всѣхъ поясничныхъ или брюшныхъ позвонковъ, со-  
сшавляюща переднюю или внутреннюю часть поясничнаго влагалища, или брюшнаго задняго; вѣшняя же пластинка сего влагалища состоя-  
ть изъ всего сухожильнаго плевочнаго начала мышцы поясничной плечевой широкой, зубчатой, и изъ вѣшней пластинки задня-  
го началы косой внутренней мышцы. Вѣш-  
няя пластинка сего поясничнаго влагалища начинается отъ бугорковъ крестцовой ко-  
сти и всѣхъ остнныхъ отростковъ пояс-  
ничныхъ и реберныхъ позвонковъ, а оканчи-  
вается въ мышцахъ поясничной плечевой широкой, въ чешыре - зубчатой задней и въ заднемъ началѣ внутренней брюшной. А  
внутренняя часть сего влагалища, начавши-  
ся отъ поперечныхъ отростковъ пояснич-  
ныхъ позвонковъ, оканчивается въ мышцахъ внутренней брюшной и поперечной. Влага-  
лище сіе заключаетъ въ себѣ мышцы: дли-  
ную хребтовую, поясницу - реберную, пуч-  
ковую, разгибающую хребетъ и спинно-хреб-  
товую.



## ГЛАВА V.

О

*Мышцахъ между - проходныихъ.**Musculi perinaei.*

Къ мышцамъ между - проходнымъ при-  
надлежатъ Мм. окончательной кишки и дѣ-  
шеводныхъ частей обоего пола.

*M. сжимающая подкожная или зад-  
не - проходная хвостцовая.*

*M. sphincter externus s. maior ani.*

Мышца сія окружная лежитъ подъ ко-  
жею, имѣетъ кольце - образный видъ, окру-  
жающій задній проходъ. Она имѣетъ два  
угла, задній и передній. Задній изъ нихъ  
прикрѣпляется къ верхушкѣ хвостца, а пе-  
редній соединяется при корнѣ моче - испу-  
скательного канала съ мышцами поперечными  
и извергающими.

*Сила.* Сжимаетъ задній проходъ и на-  
тягиваетъ извергающую мышцу.

*M. сжимающая кишечная, сжимаю-  
щая задній проходъ, внутрен-  
няя или задне - проходная.*

*M. sphincter internus. s. minor ani.*

Есть конецъ, где кольцеобразно лежатъ окружные мышечные волокна внутренней мышечной оболочки яички. Она лежитъ выше задне-проходной хвостцовой мышцы.

*Сила.* Сжимаетъ задній проходъ.

*M. разширюющая задницу поперечная или между-проходная подкожная.*

*M. transversus superficialis perinaei, s. dilatator ani.*

Начавшися отъ внутренней части съ-  
длищаго бугорка и отъ кожи, покрывающей  
оный, лежитъ поперечно, оканчивается въ  
извергающей мышцѣ у корня моче-испуска-  
щельного канала.

*M. разширюющая задницу попереч-  
ная внутренняя между-про-  
ходная.*

*M. transversus profundus perinaei s.  
dilatator profundus.*

Сія мышца начинается и оканчивается  
вмѣстѣ съ своею дружкою, но лежитъ глуб-  
же оной, какъ слой ея, почему и получила  
сіе название.

*Сила.* Объ сіі мышцы распягивають корень моче-испускательного канала.

*M. сжимающая предузырной же-лезы.*

*M. transversus s. compressor prostatae.*

Начавшия узкою и сухою жилою отъ внушенной части восходящей сѣдалищной вѣтви у соединенія съ предпазовою костью, идешъ поперечно къ предузырной железѣ (*prostata*), а оканчивается у боковой и задней части ея.

*Сила.* Сжимаетъ железу, способствуяеть изверженію ея жидкости и моче-испускательного канала.

*M. ускоряющая.*

*M. accelerator:*

Начавшия отъ концовъ мышечъ вѣтвей, сжимающей проходъ, и поперечныхъ между-проходныхъ, оканчивается въ нижней поверхности пещеристыхъ шѣль мочеиспускательного канала (*urethra*).

*Сила.* Извергаетъ мочу и сѣмя.

*M. поднимающая задницу или под-вздошная задне-проходная.*

*M. levator ani.*

Начавшия отъ внутренней косой черты (*linea mediana*) подвздошной kostи, оканчивается въ мыщѣ внутренней, сжимающей задній проходъ.

*Сила.* Поднимаетъ задній проходъ, содержитъ его въ надлежащемъ положеніи, давитъ съмянные пузырьки и способствуетъ излиянию съмени.

*M. хвостцовъ.*

*M. coccygeus s. spinoso-sacro-coccygeus.*

Начавшия острый сухожильнымъ угломъ отъ сѣдалищной оси и отъ связки спинко-крестцовой, оканчивается съ боку верхушки крестца и всего хвостца.

*Сила.* Тянетъ хвостецъ на бокъ и въ передъ, действуя же обѣ вмѣстѣ, наклоняютъ хвостецъ впередъ и поддерживаютъ окончательную кишку.

*M. поднимающая узды или сѣдалищная лещерна.*

*M. erector s. sustentator penis, s. ischio-cavernosus.*

Начинается отъ внутренней поверхности восходящей вѣтви сѣдалищной kostи узкою сухою жилою, и обнявши зад-

нюю часть пещеристого шёла мочеиспускательного ствола, оканчивающейся в боковой части его.

*Сила.* Тянетъ внизъ назадъ и нѣсколько на бокъ корень пещеристаго шёла, давлѣетъ его и сокращаетъ, отъ чего наполняется оно кровью.

*M. сѣдалищная похорничковая.*

*M. erector clitoridis.*

Начавшися отъ нисходящей сѣдалищной вѣнцы и окруживши пещеристое шѣло похорничка, оканчивающееся въ немъ,

*Сила.* Сжимая пещеристое шѣло похорничка, напрягаетъ его.

*M. сжимающая маточный рукаевъ.*

*M. constrictor vaginae s. cinni.*

Начинается тонкою сухою жилою отъ задней части влагалища, у восходящей вѣнцы сѣдалищной кости, гдѣ получаетъ волокна отъ Мм. вѣнцей сжимающей и поднимающей проходъ, и идетъ съ боку отверстія маточнаго рукава вверхъ къ похорничку, гдѣ оканчивается сухою жилою въ пещеристомъ шѣль его.

*Сила.* Сокращаетъ рукаевъ матки.



## О Т Д Ъ Л Е Н И Е IV.

### ГЛАВА V. (\*).

О

*Мышцахъ руки.*

*Musculi manus.*

*M. груднай большая или грудно-  
плечевая.*

*M. pectoralis maior.*

Начинается четырьмя началами: 1е. надгрудниковымъ, отъ передней поверхности грудинного конца надгрудника; 2е. грудиннымъ, отъ вѣшней поверхности сбоку рукоятки и средины грудины; 3е. ребернымъ, снаружи отъ хрящей 4, 5 и 6 го ребра, и 4е. брюшнымъ, отъ грудного конца косой подкожной брюшной мышцы. Всѣ сіи начала, соединившия въ одинъ мышечный уголъ, а потомъ въ одну сухую жилу, оканчиваются въ ось, идущей отъ больша-

(\*) Я помѣшилъ всѣ Мм. рукъ въ одной главѣ, также какъ Мм. ногъ, для избѣжанія мелочныя отглавленій.

го бугорка надъ окончаниемъ треугольной плечевой мышцы , или вмѣстѣ съ нею.

*Сила.* Поднимаетъ плечо и приводитъ къ груди ; когда же поднятое плечо остается неподвижнымъ , то она, поднимая ребра , разширяетъ грудь .

*M. грудная меньшая или реберно-носовая.*

*M. pectoralis minor s. serratus anticus minor.*

Начавшися узкимъ началомъ отъ воска лопатки , идетъ косвенно въ низъ и въ передъ , и, сдѣлавшися постепенно ширѣ , оканчивается 3 мя зубцами снаружи въ верхнихъ краяхъ переднихъ концовъ подъ хрящѣй 2 , 3 и 4 го ребра .

*Сила.* Поднимая ребра , разширяетъ грудь и можетъ дѣйствовать противоположно .

*M. реберная подгрудниковая.*

*M. subclavius.*

Начавшися отъ хряща первого ребра , идетъ косвенно вверхъ , оканчиваясь въ нижней поверхности лопаточного конца надгрудника .

**Сила.** Тянетъ надгрудникъ внизъ къ первому ребру, и имъ соединяетъ плечо съ грудью; когда же надгрудникъ остается неподвижнымъ, то поднимаетъ ребро.

*M. zubchata* ребро - лопаточная.

*M. serratus anticus maior.*

Начавшия 10 зубцами, отъ каждого изъ 9 верхнихъ ребръ однимъ, а отъ этого ребра, по большой части, двумя начальами, концы зубцовъ сихъ лежатъ между зубцами подкожной косой брюшной мышцы. Мыщца сія оканчивается на внутренней поверхности всего заднаго края лопатки.

**Сила.** Тянетъ лопатку впередъ, или действуя обратно, поднимаетъ грудь.

*M. подкожная зашейная.*

*M. trapezius s. cucullaris.*

Лежитъ подъ кожею, начинается отъ верхней запылочной дуги, отъ всѣхъ остальныхъ оростковъ шейныхъ позвонковъ, посредствомъ затылочно - зашейной связки и отъ всѣхъ почти остальныхъ оростковъ спинныхъ позвонковъ, а оканчивается въ верхнемъ краю лопаточной ости, ея оростка и лопаточного конца надгрудника.

*Сила.* Дѣйствуя зашѣйными или верхними волокнами, поднимаетъ лопатку и надплечіе, или дѣйствуя превратно, тянеть голову назадъ, дѣйствуя же поперечными, тянеть надплечіе назадъ, или дѣйствуя нижними волокнами, тянеть оное внизъ.

*M. хребетная широкая или поясничная плечевая широкая.*

*M. latissimus s. maximus dorsi.*

Начинается сухожильюо плевою, отъ вѣнчай пластинки поясничнаго влагалища, отъ крестца, поясницы, спины и подвздошной кости, т. е. отъ осьми осьныхъ острошковъ реберныхъ позвонковъ, отъ вѣнчай края задней части гребенка подвздошной кости и 4 мышечными зубцами снаружи отъ толикаго же числа нижнихъ ребръ, идетъ чрезъ вижай уголъ лопатки, где иногда прикрепляется однимъ пучкомъ, а оканчивается вмѣстѣ съ концомъ *M. круглой* большой въ оспи, идущей отъ внушеняго или меньшаго бугорка плеча.

*Сила.* Тянетъ плечо внизъ и назадъ, и дѣйствуя обратно, поднимаетъ грудь.

*M. поднимающај лопатку или шейно-лопаточная угловая,*

*M. levator scapulae.*

Начавшия 3 или 4 мя сухими жилами отъ поперечныхъ остростковъ 3 или 4 хъ верхнихъ шейныхъ позвонковъ, оканчивающај въ верхнемъ углѣ лопатки.

**Сила.** Поднимаетъ лопатку, действуаје обратно, наклоняетъ шею на бокъ,

*M. треугловая плечная,*

*M. deltoideus.*

Начавшия отъ нижнаго края лопаточной ости, отъ переднихъ краевъ остина остростка лопатки и лопаточного конца надгрудника, покрывающај плечевой суставъ и оканчивающај сухото жилою въ оспи вѣшнаго или большаго бугорка ниже конца грудной плечевой мышцы, и во вѣшнюю плечевую между - мышечную связку, идущую отъ нея къ наружному мыщелку плеча.

**Сила.** Поднимаетъ плечо, и когда передняя часть ея одна действуетъ, то поворачиваетъ его впередъ и внутрь, а задняя назадъ и наружу.

*M.* четверо - угловая или спинолопаточная.

*M. romboideus.*

Начавшися отъ нижняго конца зашвочно - зашейной связки, отъ 5 оспинныхъ отростковъ : 1го нижняго шейнаго и отъ 4хъ грудныхъ позвонковъ, оканчивается въ заднемъ краю лопатки ; одна часть ея выше начала оспи , а другая ниже оной.

*M. надъ-остпо-бугорковаѧ.*

*M. supraspinatus.*

Начавшися отъ подъ-остпной поверхности задняго края лопатки, лежитъ подъ оспиннымъ отросткомъ и лопаточнымъ концомъ надгрудника , а оканчивается въ верхней яминкѣ большаго плечеваго бугорка.

*Сила.* Поднимаетъ плечо и поворачиваетъ его внуши.

*M. подъ-остпо-бугорковаѧ.*

*M. infraspinatus.*

Начавшися отъ подъ-остпной поверхности задняго края лопатки, покрываетъ всю подъ-остпную ея поверхность, а оканчивается въ средней яминкѣ большаго плечеваго бугорка.

*Сила.* Поднимаетъ плезо и поворачиваетъ его варужу.

*M. кругловатая лопатка - бугорковая.*

*M. teres minor.*

Начавшия отъ средней части наружной поверхности передняго края лопатки, оканчивается въ нижней, или задней ямкѣ большаго плечеваго бугорка.

*Сила.* Тянетъ плечо назадъ, нѣсколько внизъ, и поворачиваетъ наручу.

*M. кругловатая лопатка - плечная.*

*M. teres maior.*

Начавшия отъ наружной поверхности нижняго угла лопатки, идеть впередъ и нѣсколько вверхъ, а оканчивается вмѣстѣ съ сухою жилою широкой хребетной мышцы въ если меньшаго плечеваго бугорка.

*Сила.* Плечо поворачиваетъ внуць и назадъ, и сближаетъ его съ лопаткою.

*M. подъ - лопатка - бугорковая.*

*M. subscapularis s. submersus.*

Начавшия отъ подлопаточной поверхности нѣсколькими частями, а особливо отъ задняго края ея, покрываетъ всю поверх-

жность сю, а оканчиваєця на меньшомъ плечевомъ бугоркѣ.

*Сила.* Плечо сближаєшъ съ лопаткою, поворачиваєшъ его внустрь, или понижаетъ его.

*M. носко - плечевая.*

*M. coraco - brachialis.*

Начавши вмѣстѣ однимъ началомъ съ мышцею лопатко - лучевою отъ верхушки носка лопатки, идешъ внизъ по внутренней поверхности плеча, а оканчивается спереди и почти на срединѣ кости сей, и составляєтъ между - мышечную внутреннюю плечевую связку, идущую отъ нее до внутреннего мышелка.

*Сила.* Поднимаетъ плечо, действуя же обратно, понижаетъ лопатку.

*M. лопатко-лучевая дву - начальная.*

*M. biceps brachii s. coraco - radialis.*

Начинается одною сухою жилою вмѣстѣ съ мышцею носко - плечевойю, а другою отъ верхняго края суставной ямки лопатки, которая проходитъ сумочную связку плеча, гдѣ и прикрепляется сухожильюю прищепоч-

кою къ браздѣ; потомъ оба начала сїи соединившияся, составляютъ мышцу, оканчивающуюся одною частью въ шероховатой половинѣ двойчатаго бугорка, находящагося спереди луча на шейкѣ его, а другою образуетъ она предплечное влагалище (*vagina antibrachii*) на локотномъ сгибѣ.

*Сила.* Сгибающъ предплечіе и поворачиваетъ его такъ, что рука ложится навзничь, т. е. ладонью къ верху (*supinationem efficit*); дѣйствуя же обратно, можетъ осаждать лопашку.

*M. плече - локтевая бугорковая.*

*M. brachialis internus.*

Начавшияся отъ средней части спереди плеча, ниже прикрепленія треуголовой мышцы, лежитъ подъ *M. лопатко - лучевою*, а оканчивается въ бугоркѣ, находящемся у корня вѣнцевиднаго отростка локтной kostи.

*Сила.* Сгибающъ предплечіе.

*M. три - начальная плечная,*

*M. triceps.*

Начинается *тремя* особливыми начальными, изъ коихъ 1е. среднее лопаточное или длинное (*caput longum*), начавшияся

отъ верхней части переднаго края у шейки лопатки, лежащъ на задней поверхности плечевой кости; з.е. *наружное* (*caput externum*) начинается отъ наружной между-мышечной связки и отъ наружной поверхности плечевой кости, покрываешь оную; з.е. *внутреннее начало* (*caput internum*), начавшися отъ внутренней поверхности плечевой кости и отъ между-мышечной внутренней связки, покрываешь внутреннюю поверхность плеча; помимо всѣ три части сіи соединяются въ одну мышцу, которая, перемѣнившись въ крѣпкую, широкую сухую жилу, оканчивается въ локоткѣ. Отъ сухой жилы оей происходитъ сухожильная пlevа, которая покрываешь сумочную связку и мышцы, лежащія сзади предплечія.

Междумышечная внутренняя связка — (*ligam. intermusculare*) идетъ ко внутреннему мышелку, а наружная къ наружному.

*Сила.* Разгибаешь предплечіе.

*M. локотка.*

*M. anconaeus.*

Начавшися сзади отъ вѣшняго мышелка плеча и сумочной связки, лежащей

косвенно и, соединившися плотно съ сухою жилою мышцы при начальной плечевой, въ треуголовой плоскости, составляющей верхнюю и заднюю часть локотной поверхности, оканчивается на возвышенной косой чертѣ, которая отъ локотка идеть къ заднему углу его.

*Сила.* Разгибаешь предплечіе.

*M. наизничкова я длинна.*

*M. supinator longus sive brachio-radialis.*

Начавшия отъ корня наружной нижней ости плечевой kostи толстымъ концомъ, лежитъ на наружной поверхности луча, и перемѣнившись въ длинную сухую жилу, оканчивается на задней и наружной частіи нижняго конца луча, у корня маловиднаго отростка его.

*Сила.* Сгибая предплечіе, поворачиваешь руку ладонью къ верху.

*M. наизничкова я короткая.*

*M. supinator brevis.*

Начавшия отъ виѣшняго мыщелка плеча и отъ шейки локтя, лежитъ въ верху на передней поверхности луча, а оканчи-

вается спереди и снаружи подъ двойчаймъ бугоркомъ его.

*Сила.* Опрокидываешь руку ладонью къ верху.

*M.ничновая круглая.*

*M. pronator teres.*

Начавшися вмѣстѣ съ Мм. сгибающими отъ внутренняго мыщелка плеча, лежитъ косвенно спереди предплечія, а оканчивается спереди луча, подъ окончаніемъ наизничковой короткой.

*Сила.* Лучевую кость поворачивая въ кругъ внутрь къ локотной кости, опрокидываешь руку ладонью внизъ или ницомъ.

*M.ничновая четыреуголовая.*

*M. pronator quadratus.*

Покрываетъ спереди нижній конецъ предплечія; начавшися отъ конца передняго варужнаго угла локтя, оканчивается въ переднемъ варужномъ углу луча. Она имѣетъ видъ четвероугольника.

*Сила.* Поворачиваешь лучевую кость къ локотной и опрокидываешь руку ладонью внизъ или ницъ, и можешь действовать какъ наизничковая м.

*M. лучевая внутренняя.*

*M. radialis internus s. flexor carpi radialis.*

Начавшия вмѣстѣ съ Мм.ничковою круглою, ладонною длинною, локотною внутреннею и сгибающею сѣйшнєю отъ внутренняго мыщелка плеча, лежитъ спереди лука, проходитъ подъ собственою ладонною пястною связкою, а оканчивается въ угловатикѣ большомъ и у корня предпястной косточки указательного перстна.

*Сила.* Сгибаеть пясть.

*M. локотная внутренняя.*

*M. ulnaris internus s. flexor carpi ulnaris.*

Начавшия вмѣстѣ съ Мм. сгибающими, отъ внутренняго мыщелка плеча, гдѣ сближившия съ локотною наружною, оканчивается въ кругликѣ пястни.

*Сила.* Сгибаеть пясть.

*M. лучевая наружная или двуплечечная.*

*M. radialis externus s. bicornis, s. bitemineus.*

Начавшия отъ вѣшнаго угла плеча и ости его, лежитъ єзди лука, гдѣ раздѣ-

лившиися на двѣ части, идѣтъ подъ сухою жилою М., отводящей большой перстъ длинной, и подъ тыльною собственою связкою пясти, а оканчивается одною сухою жилою въ корнѣ предпястной косточки указательного перста, а другою въ тяжеломъ же мѣстѣ средняго.

*Сила.* Разгибаеть предпястіе.

*M. локотная наружная.*

*M. ulnaris extensus.*

Начавшиися вмѣстѣ съ смежными мышцами отъ вѣшняго мыщелка плеча сзади и снаружи верхняго конца локтя, сближающійся бокомъ съ локотною внутреннею, идетъ подъ тыльною связкою пясти, а оканчивается у корня предпястной косточки мизинца.

*Сила.* Разгибаеть предпястіе; рука та же и нога могутъ разгибаться, сгибаться, поворачиваться на бокѣ, разширяться и сжиматься пальцы.

*M. ладонная длинная или мыщелокладонная.*

*M. palmaris longus.*

Начавшия спереди отъ вѣтринного мыщелка плеча, оканчивается въ собственной ладонной связкѣ пясти и сухожильной ладонной плевѣ (*aropnevrosis palmaris*):

**Сила.** Натягиваетъ сухожильную ладонную плеву и сгибаетъ пясті.

Ладонная сухожильная плева лежитъ подъ ладонною кожею. Она начинается узкимъ концомъ отъ общей связки пясти, идетъ къ перстамъ, становится постепенно ширѣ, а по цомъ раздѣляется на четырѣ тройныя части, соединенныхъ поперечными волокнами, изъ коихъ каждая часть при началѣ перстовъ раздѣляется снова на три вѣтви, среднюю и двѣ боковыя.

Среднія изъ нихъ оканчиваются въ кожѣ, а боковыя въ бокахъ корня первого ряда костей перстныхъ: указательного, среднего, четвертаго и пятаго перста, имѣя между долями полу-лунный межупокъ для прохожденія сухихъ жилъ сгибающихъ мышцъ.

**Польза.** Сія плева защищаетъ отъ прижатія ладонныя части, подъ нею лежащія.

*M. ладонная подкожная.**M. palmaris brevis s. subcutaneus palmae.*

Есть мышечная четверо - угольная пле-  
ва, лежащая подъ кожею надъ внутреннимъ  
краемъ ладони. Она, начавшия ошъ средины  
сухожильной ладонной плевы, оканчивается  
въ кожѣ, покрывающей внутренній край  
ладони.

*Сила.* Тянетъ ладонную плеву и кожу  
къ мизинцевому краю ладони.

*M. сгибающая перстны (\*) подкожная.**M. flexor quatuor digitorum sublimis s.  
perforatus.*

Начинается съ Мм. лучевою внутреннею  
и проч. отъ внутренняго мышлка плеча,  
вверху и спереди локтевой кости, лежитъ  
подъ Мм. ладонною длиною и собственною  
ладонною связкою пястки, а оканчивается  
4 сухими жилами, пропустивши чрезъ нихъ  
4 же сухихъ жилы Мм. сгибающей глубокой  
на ладонной поверхности косточекъ впора-  
то ряда перстовъ. Сверхъ сего сии жилы  
прикрѣпляются сухожильными прицѣпочками

(\*) Я называю пальцы рукъ *перстами*, а ногъ  
*пальцами*, для избѣжанія сбивчиваго поддѣлія.

(tenacula) кѣ корневымъ косточкамъ всѣхъ перстовъ, кромѣ большаго.

*Сила.* Сгибаєтъ четыре перста руки.

*M. согибающая 4 перста глубокая.*

*M. flexor quatuor digitorum profundus s. perforans.*

Начавшися спереди вверху отъ локтя и отъ между - предплечной связочной пlevы, лежитъ подъ собственною ладонною связкою пясти, и раздѣлившия на 4 сухія жилы, кои проходятъ концы *M. согибающей 4 перста подкожной*, оканчивается сими 4 мя сухими жилами въ перстныхъ косточкахъ 3 го ряда, а прицѣпочками (*tenacula*) въ косточкахъ 2 го ряда.

*Сила.* Сгибаєтъ верхушки перстовъ.

*M. червеобразные или сухожильные перстниья.*

*M. lumbricales.*

Сихъ мышецъ находится четыре, кѣшорыя супъ длинны, круглы и тонки, какъ земляные черви; онъ начинается отъ сухихъ жиль *M. локшево-подперстной*, а оканчиваются въ лучевомъ боку коренныхъ косточекъ 2, 3, 4 и 5 го персца.

*Сила.* Сгибаешь персты.

*M. сгибающая большой перстъ длинная.*

*M. flexor pollicis longus.*

Начавшия спереди отъ средины луча, прошедши подъ связкою пястно-ладонною поперечною, лежишъ въ браздѣ много-угольной большой косточки и между супинами, а оканчивается на ладонной сторонѣ косточки 2го ряда большаго перста.

*Сила.* Сгибаешь большой перстъ.

*M. отводящая большой перстъ короткая.*

*M. abductor pollicis brevis.*

Начавшия отъ собственной связки пясти и отъ многоугольной большой косточки, оканчивающей въ основаніи средней косточки большаго перста.

*Сила.* Отводишь большой перстъ отъ прочихъ.

*M. сгибающая большой перстъ короткая.*

*M. flexor pollicis brevis.*

Начавшия отъ собственной связки пясти всѣхъ почти косточекъ 2го ряда ея, со-

спавляющихъ наружный бокъ пястной бразды, оканчивается на ладонной поверхности у корня косточки первого ряда большого перста.

*Сила.* Сгибаешь и приводишь къ ладони большой перстъ.

*M. пропливо - дѣйствующая.*

*M. orropens.*

Начинается и оканчивается тамъ же, гдѣ отводящая большой перстъ короткая, а лежитъ ближе оной къ ладони между Мм. сгибающею и приводящею большой перстъ.

*Сила.* Сгибаешь большой перстъ.

*M. приводящая большой перстъ.*

*M. adductor pollicis.*

Лежитъ поперечно подлѣ пропливовой ствующей ближе къ ладони, начавшися отъ ладонной части предпястныхъ косточекъ указательного и средняго перстовъ, оканчивается на ладонной поверхности корня большого перста.

*Сила.* Тянешь или приводишь къ ладони большой перстъ.

*M. отводящая мизинецъ.*

*M. abductor digiti minimi.*

Начавшия отъ пястной связки ладонной и круглика пясти, оканчивается на ладонной поверхности края мизинца.

*Сила.* Опводитъ мизинецъ.

*M. согбающаа мизинецъ.*

*M. flexor digiti auricularis.*

Начавшия отъ собственной связки пясти и крючка, оканчивается на ладонной поверхности косточки первого ряда мизинца.

*Сила.* Сгибаетъ мизинецъ.

*M. приводящаа мизинецъ.*

*M. adductor digiti minimi.*

Лежитъ между Мм. опводящею и сгибающею мизинецъ; начавшия отъ собственной ладонной связки пясти и крючка, оканчивается на вѣшней поверхности предплечной косточки мизинца.

*Сила.* Приводитъ мизинецъ къ прочимъ перстямъ.

*M. разгибающаа персты.*

*M. extensor 4 digitorum.*

Начавшия отъ вѣшнего мыщелка плеча, лежитъ сзади предплечия и раздѣлившия на 4 сухія жилы, соединенные попереч-

ными сухожильными нитями, идеть подъ тыльною связкою пясти, а оканчивающейся тройными сухими жилами, или раздѣленными на три вѣтви, среднею въ косточкахъ 2го ряда, а боковыми въ косточкахъ 3го ряда всѣхъ перстовъ, кроме большаго.

*Сила.* Разгибаеть сказанные четыре перста.

*M. разгибающая указательный перстъ.*

*M. extensor indicis s. indicator.*

Начавшияся сзади и снаружи отъ локтя и отъ между - предплечной связочной пlevы, прошедши подъ тыльною связкою пясти, оканчивающейся въ указательномъ перстѣ.

*Сила.* Разгибаеть указательный перстъ.

*M. разгибающая большой перстъ длинная.*

*M. extensor pollicis longus.*

Начавшияся сзади и снаружи отъ локтя и опѣ между - предплечной пlevы, оканчивающейся въ тыльной поверхности косточки 2го ряда большаго перстя.

*Сила.* Разгибаеть большой перстъ.

*M.* разгибающая большой перстъ короткая.

*M. extensor pollicis brevis s. minor.*

Начавшися отъ вѣщняго угла локтя, а отъ внуширенняго луча и между - предплечной плевы, оканчивается въ тыльной поверхности косточки 1 го ряда большаго перста.

*Сила.* Разгибаетъ большой перстъ.

*M. оправдывающая большой перстъ длинная.*

*M. abductor pollicis longus.*

Начавшися сзади луча и отъ между - предплечной плевы, оканчивается по большой части двумя сухими жилами на тыльной поверхности предпястной или коренной косточки большаго перста.

*Сила.* Отводитъ большой перстъ отъ прочихъ.

*M. между - предпястныхъ заднія.*

*M. interossei externi.*

Сихъ мышецъ находится четыре; онѣ лежатъ между всѣми костями и подлѣ тыльной поверхности предпястія, начинаются отъ смежныхъ боковыхъ поверхностей предпястныхъ косточекъ, а оканчиваются пер-

вия дѣвъ, щитая оиъ большаго перста къ наружному или лучевому боку косточки первого ряда перстовъ, указательного и среднего, а послѣднія дѣвъ мышцы также начинаются и оканчиваются во внутреннемъ бокъ таковыхъ же косточекъ.

*Сила.* Первая дѣвъ мышцы тянутъ персты къ большому, а послѣднія дѣвъ къ мизинцу.

*M. между-предплстиемъ ладони.*

*M. interossei interni s. palmares.*

Сихъ мышецъ находится три; онѣ лежатъ между предпластными косточками подъ ладонной поверхности. Первая изъ нихъ между косточкою указательного и среднаго перста, а прочія по порядку следуютъ за сею. Первая вачивается отъ локотной поверхности коренной косточки указательного; а прочія дѣвъ, какъ начинаются отъ лучевыхъ поверхностей костей предплости, такъ и оканчиваются въ таковыхъ же поверхностяхъ коренныхъ косточекъ перстовъ.

*Сила.* Тянутъ первая М. указательной, а прочія оспальныя персты къ среднему.



# О Т ДѢЛЕНИЕ V.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### О

#### Мышцахъ ногъ.

Все бедро и голень, выключая ступень, покрыты вокругъ сухожильною оболочкою, лежащею подъ общими покровами, которая на бедрѣ называется *бедренныемъ влагалищемъ* (*vagina femoris s. fascia lata*); а на голени *голенныемъ* (*fascis suralis s. cruralis*). Оболочка сія начинается спереди, отъ паховой связки, съ боку отъ нисходящей косой брюшной мышцы, отъ гребенка подвздошной кости, а сзади отъ поясничного влагалища у крестцовой kostи, а оканчивается непримѣннымъ почти образомъ у нижняго конца голени, въ связочную предложенную поперечную плеву, которая, начавшия спереди отъ нижняго конца берца, идетъ поперечно къ нижнему концу дудки,

гдѣ спереди оканчивається и покрываєтъ сухія жилы разгибающихъ мышецъ.

Оно состоитъ изъ прозякаго слоя, аособливо ва бедрѣ, бѣлыѣ и блестящихъ сухожильныхъ волоконъ, изъ коихъ наружнія и внутиреннія суть окружныя, а среднія, между ими лежащія, суть вдольныя. Оно крѣпче и плотнѣе снаружи или у большаго вертела, отъ присоединенія къ нему волоконъ Мм. подвздошныхъ, бедро - влагалищной и крестцово - бедренной; то же около колѣна на внутренней сторонѣ бедра и всей голени.

Польза сего влагалища есть та, что оно окружаетъ бедро и голень и, входя своими отростками въ промежутки мышецъ, содержитъ ихъ въ надлежащемъ положеніи, чѣмъ способствуетъ ихъ дѣйствію и предохраняетъ бедренные сосуды отъ разширѣнія, а Мм. отъ вытиха, сильно же прижимая оные, при стояніи причиняетъ онѣмѣніе на вѣнчнай сторонѣ бедра.

*M. подвздошная бедро-влагалищная*

*M. tensor fascia latae.*

Начавшия сухожилью плевою снаружи отъ передней и верхней ости подвздошной кости, оканчивается вверху влагалища, снаружи бедра у большаго вертела.

*Сила.* Тянетъ влагалище въ верхъ, чѣмъ сблизяя мышцы придаешь имъ силу и крѣость.

*M. подвздошно-крестцовая бедренная.*

*M. gluteus magnus.*

Начавшия отъ наружной поверхности задней части верхняго края подвздошной кости, снаружи и съ боку костей: крестцовой и хвостцовой, отъ вѣшней пластиинки поясничнаго влагалища, также отъ связокъ сихъ костей съ сѣдалищною, оканчивается въ корнѣ вертела, въ наружной вѣтви щерховатой черпы и въ бедренномъ влагалищѣ.

*Сила.* Отводитъ бедро отъ другаго, поворачиваетъ его наружу и тянетъ въ верхъ влагалище.

*M. подвздошно-вертелевая большая.*

*M. gluteus medius.*

Начавшия снаружи между верхнимъ краемъ и полукружию черпою отъ под-

вздошной kostи, оканчиваєця сухою жилою спереди въ верхушкѣ большаго вертела.

*M. подвздошно-вертелевая меньшая.*

*M. gluteus parvus.*

Начавши снаружи отъ всей поверхности между полукружною чертою и вертлюгомъ, оканчиваєця сухою жилою въ верхушкѣ большаго вертела.

*Сила.* сей мышцы и подвздошно-вертелевой большой отводитъ одно бедро отъ другаго.

*M. подвздошно-вертелевая ви́мпелевая.*

*M. iliacus internus.*

Начавши внутри брюха отъ поверхности подвздошной kostи, находящейся надъ среднею подвздошною чертою (linea mediana), выходитъ подъ паховою сухою жилою, а оканчиваєця въ верхушкѣ меньшаго вертела вместе съ *M. пояснично-вертелевою*.

*Сила.* Тянетъ бедро въ верхъ и въ передъ.

*M. пояснично-предтазовая.*

*M. lumbalis internus minor s. psoas minor.*

Она по большой части начавшия съ боку тѣла 1го поясничнаго или брюшнаго позвонка и 12го хребтнаго позвонка, оканчивающиа въ грбешкѣ предпазовой кости, или соединившия съ подвздошною мышцю, въ бедренномъ влагалищѣ.

*Сила.* Въ 1мъ случаѣ тянетъ лобковую kostь или поясницу, а во второмъ содѣйствуетъ подвздошной мышцѣ, и натягиваетъ бедренное влагалище.

*M. пояснично-вертелевая.*

*M. lumbalis internus maior s. psoas maior.*

Начавшия съ боку тѣлъ 12го хребтнаго и всѣхъ поясничныхъ позвонковъ, оканчивающиа, соединившия съ М. подвздошно-вертелевою внуширеннею.

*M. предпазовая вертелева.*

*M. pectinaeus s. lividus.*

Начавшия оишъ грбешка предпазовой кости подъ пригоркомъ, оканчивается на передней сторонѣ корня меньшаго вертѣля.

*Сила.* Тянетъ бедро въ верхъ и внуширь.

*M. подвздошная - предберцовая.*

*M. longus cruris s. sartorius.*

Начавшия опъ передней и верхней подвздошной ости, лежитъ на внутренней сторонѣ бедра подъ кожею, а оканчивается сухожильною плеовою на внутренней сторонѣ берца подъ оспнымъ его бугоркомъ.

*Сила.* Сгибаешь берцо и накладываешь его на другое.

*M. предпазовая предберцовая.*

*M. gracilis s. rectus internus.*

Начавшия спереди и въ низу отъ взаимнаго соединенія предпазовыхъ костей, лежитъ на внутренней поверхности бедра, и оканчивается сухожильною плеовою вмѣстѣ съ мышцею подвздошною предберцовою.

*Сила.* Содѣйствуешь оной мышцѣ.

*M. прямая двуначальная предколѣнная.*

*M. rectus cruris.*

Начавшия одною сухою жилою отъ нижней передней подвздошной ости, а другою опъ верхняго края вертлюжной впадины, лежитъ спереди бедра, а оканчивающ-

ся въ надколѣнниковую сухую жилу (*tendo suprapatellaris*).

*M. наружная бедровая предколѣнная.*

*M. vastus externus.*

Начавшися отъ конца подвздошно-крайней бедренной М. отъ корня большаго вертела, отъ наружной поверхности бедра и отъ верхней наружной вѣтви шероховатой черпры, оканчивается въ надколѣнную сухую жилу.

*M. внутренняя бедровая предколѣнная.*

*M. vastus internus.*

Начавшися отъ всей внутренней верхней вѣтви шероховатой черпры и отъ всей внутренней поверхности бедра, оканчивается въ надколѣнную сухую жилу.

*M. предбедровая.*

*M. cruralis s. crureus.*

Начавшися отъ передней междувертельной черпры и отъ передней поверхности бедра, оканчивается въ надколѣнную сухую жилу.

Сухая надколеннаа жила (*tendo suprapatellaris*), начавшаяся отъ 4-xъ сказанныхъ

мышецъ, идеть съ боковъ предколѣнника и чрезъ него, также чрезъ прямую ея предколѣнниковую бугорковую связку, а оканчивающіи ощастіи въ основаніи предколѣнника, ощастіи перешедши ону въ предберцовомъ бугоркѣ, а ощастіи во влагалищѣ голени.

*Сила.* Разгибающій берцо.

*M. triplacinalis* бедра или тройникъ.

*M. triceps femoris.*

Она лежитъ на внутренней сторонѣ бедра и состоитъ изъ трехъ частей: длинной, короткой и большой.

Короткая часть (*pubeo-subtrochanterica*) начинается вмѣстѣ съ *M.* предпазовою предберцовою отъ нисходящей вѣтви предпазовой kostи, подъ длинною частию тройничной выше оной оканчивающейся, а оканчивающіи подъ меньшимъ вертелемъ и *M. лобкого* - вертелевою въ шероховатой черепкѣ.

Средняя (*pubeo-femoralis*) или длинная начинается выше короткой отъ соединенія предпазовыхъ kostей ближе короткой къ оному, а оканчивается ниже ея, со внут-

длинной спиралью срединки шероховатой черты, где соединяется в большую часшку.

**Большат** (*Ischiius condylea*) тонкое прутье, начавшися у соединения концов предпазовой и седалищной кости и опиे седалищного бугорка, оканчивающееся во внутренней и нижней ветви шероховатой черты, плавно во внутреннем мышечном белре; через конец ее проходящий бедренные сосуды.

**Сила.** Приводящее одно бедро к другому и поднимает его впередь. Почему мы сюда называемся приводящими (*adductores*).

*M. седалищно-дудочная двуначальная.*

*M. biceps cruris.*

Начавшися одною сухою жилою ветвью с *M.*, полу-сухожильную отъ седалищного бугорка, другимъ началомъ отъ средины и всей нижней наружной ветви шероховатой черты, оканчивающейся въ верхушке трубы.

**Сила.** Сгибаетъ голень.

*M. седалищная пред-берцовая полу-сухожильная.*

*M. semitendinosus.*

Начавшия вмѣстѣ съ М. дву - началь-  
юю ошь сѣдалищнаго бугорка , лежитъ  
сзади бедра и внутренняго мышлка его , а  
оканчивается подъ внутреннимъ берцовыемъ  
мышлкомъ.

*Сила.* Сгибаєть берцо и приводить къ  
другому.

*M. сѣдалищная предберцосая полу-  
плевочная.*

*M. semitembranosus.*

Начавшия ошь сѣдалищнаго бугорка  
широкою сухожильною плеовою , лежитъ  
сзади бедра , а оканчивается сзади вну-  
тренняго берцового мышлка въ корнѣ его.

*Сила.* Сгибаєть берцо.

*M. крестцовая вертлева.*

*M. pyriformis.*

Начавшия внути , отъ края срединны  
крестцовой кости , или отъ 2 го , 3 и 4 го  
позвонка ея , выходитъ изъ таза чрезъ под-  
остинную сѣдалищную вырѣзку и , соединивши-  
ся въ одну сухую жилу съ Мм. двойничны-  
ми и заграждающею внутреннею болѣшою ,  
лежитъ выше двойничныхъ Мм. , а оканчи-

занята общего ихъ сухою жилою въ ямкѣ  
сзади верхушки большаго вершеля.

*M. двойничий съдалищно-вертелевыи.*

*M. genelli - femoris.*

Начавшияся; одна изъ нихъ снаружи  
отъ съдалищной ости, а другая сзади  
съдалищного бугорка, оканчивающаю обѣ, со-  
единившияся съ Мм. крестцовою вертелевою  
и заграждающаю внутреннюю въ одну сухую  
жилу, сзади верхушки большаго вершеля.

*M. заграждающая вертелевая вну-  
тренняя.*

*M. obturator internus.*

Начинается внутри таза отъ всей  
окружности яйце-образной дыры и связоч-  
ной пlevы ея, выходитъ чрезъ под-осинную  
или меньшую съдалищную вырѣзку, между  
Мм. двойничными, а оканчиваются вмѣсть  
съ ними и содѣйствуемъ имъ.

*M. заграждающая вертелевая нару-  
жная.*

*M. obturator externus.*

Лежитъ подъ съдалищною между-вертелевою  
четвероугольною. Начинается снаружи  
отъ окружности яйце-образной дыры и свя-

вичасій плавы яз., а оканчивается сзади верхушки большого вертела, где лежит подъ чешуевою сѣдалищно-вертелевою.

*M. четверо - угольная сѣдалищная между - вертелевая.*

*M. quadratus femoris.*

Начавшия отъ наружной поверхности сѣдалищного бугорка, оканчивается въ между-вертелевой задней чертѣ.

Всѣ сіи б. Мм., дѣйствуя вмѣстѣ, одновѣдно одно бедро отъ другаго и поворачивають его наружу.

*M. дву - начальная бедро - пленочная или лузатникъ ; или двойникъ.*

*M. gastrocnemius s. gemellus.*

Начавшия сзади одною сухою жилою сверху отъ вѣшней поверхности вѣшнего мышцелка, а другою отъ внутренней внутреннего мышцелка и корня его, воставляютъ мышечное брюхо, берцовыми пузомъ взвинтое, а оканчивается въ надъ - пленочную сухую жилу.

*M. бедро - пленочная.*

*M. so/ans s. calcis major.*

Начавши сзади отъ верхней части лодыжки, отъ средней части берцовой кости и отъ междуоленной связки, оканчивается въ надъ-пяточную сухую жилу, которая, будучи весьма толстая, прикрепляется сзади въ верхней части пяточной кости.

*M. бедро-пяточная однокожая.*

*M. plantaris s. calcis minor.*

Начавши сверху и сзади отъ впадиняго мышечка бедра, выше пузапика, оканчивается длинною и тонкою сухою жилою сзади пяточной кости.

*Сила.* Всѣ при Мм. сіи разгибаютъ ступень, или удерживающъ его въ надлежащемъ положеніи при спояніи, хожденіи, пляски и проч.

*M. заполненная.*

*M. popliteus.*

Начавши отъ задней поверхности и снизу впадинаго мышечка, а болѣе отъ суховатой связки, лежащей воскѣнно сзади колѣна, а оканчивается въ короткѣ внутренняго берцоваго мышечка.

*Сила.* Сгибаетъ и поворачиваетъ вънутрь голень, также наклоняющъ сухочную связку колѣна.

*M. разгибающей пред-берцовой длиной над-пальцевой.*

*M. extensor communis digitorum pedis longus.*

Начавшися вмѣстѣ съ пред-берцовою длинною въверху спереди дудки, проходиши подъ херообразною связкою къ верху ступени, гдѣ даетъ менѣшую вѣтвь *M. короткой трубко-надплюсневой*; а прочія 4 сухія жилы соединяются съ таковыми же *M. разгибающей над-пальцовой короткой*, изъ которыхъ каждая, раздѣливши-ся спома на три вѣтви, оканчивается среднею вѣтвию сверху въ косточки 2го ряда, а боковыми въ косточки 5го ряда или ноготь-наго всѣхъ пальцовъ, кроме большаго.

*Сила.* Разгибающіе сказанные 4 пальца.

*M. плоточная над-пальцевая короткая.*

*M. extensor communis brevis digitorum pedis.*

Начавшися отъ выѣзней поверхности бугорка патки и отъ надплечной кости, лежиши сверху ступени и оканчивающіе

4 ма сухими жилами, вмѣстѣ съ разгибаю-  
щимъ длиннаго въ 1, 2, 3 и 4 пальца.

*Сила.* Содѣйствуетъ разгибающей длин-  
ной М.

*M. разгибающая большой палецъ  
длинная.*

*M. extensor hallucis longus.*

Начавшися спереди отъ средины между-  
голеной плевы и трубки, оканчивается свер-  
ху въ косточекъ втораго ряда большаго пальца.

*Сила.* Содѣйствуетъ разгибающей длин-  
ной М.

*M. сгибающая пальцы короткая  
или подошвенная.*

*M. flexor communis 4 digitorum  
brevis, s. perforatus.*

Вся подошва ноги покрыта сухожиль-  
ной плевою (ароневрозис плантарис), кома-  
рая, начавшися снизу и спереди отъ пяточ-  
ной шероховатости и сдѣлавшися гораздо  
шире, раздѣляется на пять пройныхъ пуч-  
ковъ, изъ коихъ каждая средняя часть окан-  
чивается въ кожѣ, а прочія двѣ боковыя  
прикрѣпляются къ бокамъ косточекъ 2 го  
ряда всѣхъ пальцевъ.

Отъ сей плюсъ и отъ кончикихъ поверхности пальки, начавшия означенные мышцы и лучи квадратамъ, раздѣляются на три сухихъ жилы, кои пропускаютъ сквозь себя сухие жилы *M.* сгибающей пальца длинной и привѣпляющей подъ косточкамъ 2го ряда, а то 3 и 4го пальца сухими жилами, а притѣ почками (*tenacula*) къ косточкамъ 1го ряда.

*Сила.* Сгибающъ означенные пальцы.

*Польза.* Сия плека защищаетъ часы, выше ея лежащія, отъ трепета.

*M.* сгибающаго большої палецъ длиннамъ.

*M. flexor hallucis longus.*

Начавшия сзади отъ ордины дудки, жила ея проходитъ въ браздѣ сзади берцовой лодыжки и внутренней поверхности квадратной kostи къ подошвѣ, тѣ, во соединеніи съ длинною мышцею сгибающей пальцы, оканчиваются въ косточки 2го ряда большаго пальца.

*Сила.* Сгибающъ палецъ.

*M.* сгибающаго пальцы длиннамъ.

*M. flexor 4 digitorum communis longus, s. perforans.*

Начавши сзади отъ берца и между голеной и плечы, идетъ сзади внутренней лодыжки, въ бороздѣ пятки къ подошвѣ, тѣт., соединившися съ Сильвіевою подошвенной четырехугольною птицей (сага ассо-  
вогія), раздѣляется на 4 сухія жилы, кончи-  
рующіе пальцы меньшой, оканчивающей въ  
подошвенной поверхности еѣхъ косточекъ  
верхушечнаго ряда, кроме большаго пальца.

*Сила.* Сгибаешь пальцы.

*M. червеобразнаги сухожильныи под-пальцовыи.*

*M. lumbricales pedis.*

Онъ, начавши сють сухихъ жилъ длинной *M.* сгибающей персты, оканчивающейся тонкими сухими жилами во внутреннемъ боку косточекъ корневаго ряда 4хъ перстовъ, кроме большаго. Червообразныи *Mm.* (*lumbricales*) оканчиваются въ керновыхъ, сгибающая короткая въ срединъхъ, а длинная въ верхушечныхъ косточекахъ пальцовъ.

*Сила.* Сгибаешь пальцы.

*M. отводящая большой палецъ двумъ начальникамъ.*

*M. abductor hallucis biceps.*

М. сія имѣетъ два начала, изъ коихъ длинное (caput longum), начавшия ошь пяточной шероховатости, идетъ по внутренней сторонѣ ступени къ внутреннему клинку, тѣ, соединившия съ короткимъ началомъ (caput breve), идетъ къ большому пальцу и оканчивается сухою жилою во внутренней поверхности корня его.

*Сила.* Оптиводящъ большой палецъ отъ прочихъ.

*M. согибающая большой палецъ когортина.*

*M. flexor brevis hallucis.*

Начавшия отъ клинка эго, 3го и отъ корня предплюснерой kostочки большаго пальца, оканчивающъ сухою жилою въ корѣ kostочки большаго пальца.

*Сила.* Сгибающъ сей палецъ.

*M. приводящая большой палецъ длиннан.*

*M. adductor hallucis magnus.*

Начавшия снизу пяты, отъ предплюснерой kostи и клинка 5го сухожильною плеюю, соединяюща съ Мм. приводящемъ и

стягающею ко ошкимиц, а оканчивающейся въ суставной вѣнцѣ косточки большаго пальца.

*Сила.* Сближаетъ большой палецъ со смежнымъ ему.

*M. приводящая большой палецъ поперечная.*

*M. adductor hallucis minor s. transversus.*

Начавшия снизу отъ верхушекъ предплюсневыхъ косточекъ 4-й и 5-й, лежитъ поперечно и, соединившия съ *M. приводящую* большою, оканчивающейся во вѣнцѣ суставной косточки, у корня большаго пальца находящейся.

*Сила.* Приводящъ большой палецъ къ прочимъ.

*M. отводящая мизинецъ.*

*M. abductor digiti minimi.*

Начавшия снизу отъ пялки однимъ началомъ, а другимъ предпяточной кости, лежитъ подъ наружного края ступени, а оканчивается сухою жилою снаружи въ коренной косточки пятаго пальца.

*Сила.* Отводящъ опъ проющихъ и сгibtаетъ мизинецъ.

*M. сгибающий мизинец короткая.*

*M. flexor brevis digiti quinti.*

Начавшийся снизу отъ нереднаго конца бѣ предплосневой косточки, оканчивается снизу въ коренной косточкѣ ишина.

*Сила. Сгибаешь мизинецъ.*

*M. предберцовая клинная.*

*M. tibialis anticus.*

Начавшийся отъ вѣщняго берцоваго мышечка въ срединѣ берца, вѣтвѣть съ Ми. длинными разгибайющею перстна и лодыжкою, сухая жила ее идеть спереди берцовой лодыжки, а оканчивается въ большомъ клинѣ у корня тѣй предплосневой.

*Сила. Разгибаетъ ступень и тянетъ внутрь.*

*M. берцовая задняя или берцочистечная,*

*M. tibialis posterior.*

Начавшаяся сзади отъ трубки, отъ между голеной связки и отъ срединнаго берцовой кости, сухая жила ее идеть сзади берцовой лодыжки въ пѣдошвѣ, а окан-

чиваются въ пред-надпяничной и большомъ клинкѣ.

**Сила.** Разгибаешь ступень и приводишь его въ другому.

**M. длинная дудочная.**

**M. peronaeus longus.**

Начавшися въ суставѣ съ M. предберцовою длинною въ верху и снаружи дудки, сухая жила ея проходитъ къ подошвѣ, сзади вѣнчай лодыжки, въ браздѣ предпяничной kostи, а оканчивается снизу въ предплюсовой юж. косточки внутренними и въ клинкѣ.

**Сила.** Разгибаешь и тянемъ варужу ступень.

**M. короткая дудочная надпяничная.**

**M. peronaeus brevis.**

Начавшаяся спереди отъ средины дудки, сухая жила ея лежитъ въ браздѣ спереди вѣнчай лодыжки, оканчивается въ корне юж. предплюсовой косточки, где соединяется съ частью длинной M., разгибающей пальцы.

**Сила.** Сгибаешь ступень.

*M.* между - предплюсневыхъ серхнѣл  
и подошвенныя.

*M. interossei externi* 3: dorsales, et in-  
terni pedis s. plantares.

Первые лежатъ между всѣми предплюс-  
невыми косточками, подъ верхней ихъ по-  
верхности, начавшися двумя началами отъ  
двухъ смежныхъ боковъ сихъ косточекъ,  
оканчивающиеся 1 со внутренней стороны, а  
проч. съ наружной поверхности косточея въ  
перваго ряда пальцовъ.

*M.* между - предплюсневыхъ подошвен-  
ныхъ находится 3, онъ лежатъ ближе къ  
подошвенной поверхности предплюсії: на-  
чавшися всѣ отъ внутренней стороны пред-  
плюсневыхъ косточекъ, оканчивающиеся во  
внутреннемъ же бокѣ косточекъ 1 го ряда  
пальцовъ 3го, 4 и 5го.

*Сила.* *M.* между - предплюсневая тѣль-  
вая 1 я приходитъ 2 й палецъ къ большому,  
а прочія опровергаютъ одинъ отъ другаго къ ми-  
зинцу, а между - предплюсневая подошвен-  
ная приводящъ внутрь одинъ смежной па-  
лецъ къ другому, и то понижаютъ ихъ, то  
возвышаютъ.

КОНЕЦЪ.

## ПОГРЪШНОСТИ

въ третьей Части Анатоміи.

Налечатано :

Читай :

Стран. Строк.

|     |       |                              |                                     |
|-----|-------|------------------------------|-------------------------------------|
| 15  | 19    | облоки                       | о блоки                             |
| 25  | 16    | шею                          | щei                                 |
| 28  | 25    | съуживаются                  | съуживается                         |
| 55  | 4     | мышцами :                    | мышцами                             |
| —   | 15    | сухожильного                 | сухожильного , или                  |
| 38  | 14    | оканчиваются                 | оканчивается                        |
| —   | 19    | объ                          | объ                                 |
| 45  | 12    |                              | о мышцахъ головы<br>( m. capitis ). |
| —   | 15    | начавшихся                   | начинающейся                        |
| 60  | 16    | кожные непри-<br>крепляясь , | къ кожорымъ не при-<br>крепляется , |
| 61  | 10 25 |                              | 26                                  |
| 82  | 15    | брюшныхъ ,                   | брюшными ,                          |
| 91  | 18    | связа                        | связка .                            |
| 105 | 11    | fascis.                      | fascia .                            |

# С П И С О КЪ

*предметовъ, содержащихъ съ Мышцесловіи или Зѣй Части Анатоміи.*

| <b>Мышцесловіе.</b>                   | <b>Справ.</b> |
|---------------------------------------|---------------|
| — практическое,                       | 3             |
| — умственное.                         | 3             |
| — общее и                             | 4             |
| — чистое.                             | 4             |
| — сравнительное.                      | 4             |
| <b>Мышцы вообще,</b>                  | <b>5</b>      |
| — въ особенности,                     | 58            |
| <br><b>M. барабонно-молоніковая.</b>  |               |
| — laxator tympani minor.              | 55            |
| бедренное влагалище.                  |               |
| vagina femoris s. fascia lata.        | 106           |
| — берцовая задняя или берцо-чашечная. |               |
| tibialis posterior.                   | 124           |
| берцо - пятчная.                      |               |
| soleus s. calcis minor.               | 118           |
| — бедро - пятчная одиночная.          |               |
| plantaris s. calvis minor.            | 117           |
| — боковая колыча - пирамидная.        |               |
| strico-arytaenoideus lateralis.       | 56            |
| <br><b>Mm. брюха.</b>                 |               |
| — abdominis.                          | 65            |
| — белая полоса.                       |               |
| limea alba.                           | 70            |

|                                      |                                              |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| <b>М.</b>                            | <b>височно - челюстная.</b>                  |     |
| —                                    | temporalis s. crotaphites.                   | 56  |
| <b>—</b>                             | <b>вековая.</b>                              |     |
| —                                    | orbicularis palpebrarum , s. oculorum.       | 51  |
| Благалище брюшныхъ прямыхъ мышецъ —  |                                              |     |
| vagina tendinea muscularum rectorum. | 75                                           |     |
| <b>М.</b>                            | <b>внутренняя бедровая предколънная.</b>     |     |
| —                                    | vastus internus.                             | 111 |
| <hr/>                                |                                              |     |
| <b>Мм.</b>                           | <b>головы.</b>                               | 18  |
| —                                    | гортани — larynx.                            | 49  |
| <b>М.</b>                            | <b>гортанская глопочная.</b>                 |     |
| —                                    | constrictor pharyngis inferior s. laryngo-   |     |
|                                      | pharyngeus.                                  | 54  |
| <b>Мм.</b>                           | <b>глазная — oculorum.</b>                   | 51  |
| —                                    | глошки — pharyngis.                          | 52  |
| —                                    | глопко - язычная или небная.                 |     |
| —                                    | pharyngo-palatinus, s. pharyngo-staphylinus. | 54  |
| —                                    | грудная большая, или грудноплечевая.         |     |
|                                      | pectoralis major.                            | 82  |
| —                                    | меньшая, или реберно-носовая.                |     |
|                                      | pectoralis minor, s. serratus anticus        |     |
|                                      | minor.                                       | 83  |
| —                                    | головная дву - брюшная.                      |     |
| —                                    | digastricus cervicis s. capitis.             | 44  |
| —                                    | грудо - брюшная — diaphragmaticus,           |     |
|                                      | diaphragma , s. septum transversum.          | 70  |
| —                                    | грудино - дужковая.                          |     |
| —                                    | sterno - hyoideus.                           | 39  |
| —                                    | грудино - реберная — sterno - costalis , s.  |     |
|                                      | triangularis sterni.                         | 64  |
| —                                    | грудино - сосковая.                          |     |
| —                                    | sterno - cleido - mastoideus.                | 45  |
| —                                    | грудино - щипная.                            |     |
| —                                    | sterno - thyreoideus.                        | 49  |

|    |                                                                      |     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| M. | дужко - язычная.                                                     |     |
| —  | hyo - glossus.                                                       | 49  |
| —  | дружко - глоточная — constrictor pharyngis medius, s. hyopharyngeus. | 53  |
| —  | двойничная съдалищно - вершевая.                                     |     |
| —  | gemellus femoris.                                                    | 115 |
| —  | дву - начальная бедро - пяточная или пузапикъ.                       |     |
| —  | gastrocnemius s. gemellus.                                           | 118 |
| —  | длинная трубочная, или дудко - преднадищечная.                       |     |
| —  | peronaeus longus.                                                    | 125 |

---

|    |                                                      |    |
|----|------------------------------------------------------|----|
| M. | жевашельная наружная или крылочелюстная мышцелковая. |    |
| —  | pterygoideus externus.                               | 37 |
| —  | — — — внутренняя, или крылочелюстная угловая.        |    |
| —  | pterygoideus internus.                               |    |

---

|      |                                                        |     |
|------|--------------------------------------------------------|-----|
| M.   | завитковая.                                            |     |
| —    | helicis.                                               | 22  |
| —    | заграждающая вершевая внутренняя — obturator internus. | 115 |
| —    | — — — наружная.                                        |     |
| —    | — — — externus.                                        |     |
| —    | заколѣнная.                                            |     |
| —    | popliteus.                                             | 117 |
| M.m. | зашылочная — occipitales.                              | 19  |
| —    | зашейная сосковая.                                     |     |
| —    | trachelo - mastoideus.                                 | 45  |
| —    | зубашниковая подзашыльника косая.                      |     |
| —    | obliquus interior, s. major capitis.                   | 47  |

|                     |                                                               |     |   |   |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|
| M.                  | зубчатая ребро - лопаточная.                                  | -   | - | - |     |
| —                   | serratus anticus major.                                       | -   | - | - | 84  |
| —                   | заушная, или соско - ушная.                                   | -   | - | - |     |
| —                   | retrahens, s. posterior auris.                                | -   | - | - | 21  |
| <hr/>               |                                                               |     |   |   |     |
| M.                  | козелковая — tragicus auris.                                  | -   | - | - | 21  |
| —                   | косая надглазная — obliquus superior<br>oculi s. trochlearis. | -   | - | - | 34  |
| —                   | — подглазная — inferior.                                      | -   | - | - | 35  |
| —                   | — пирамидная — arythaenoideus obliquus.                       | 51  |   |   |     |
| —                   | — брюшная нисходящая, или под-<br>кожная.                     |     |   |   |     |
| —                   | obliquus abdominis externus.                                  | -   | - | - | 67  |
| —                   | косая внутренняя или восходящая.                              |     |   |   |     |
| —                   | — — — internus.                                               | -   | - | - | 68  |
| —                   | кольце - щипиняя.                                             |     |   |   |     |
| —                   | crico - thyreoideus.                                          | -   | - | - | 50  |
| —                   | кольце - пирамидная задняя.                                   |     |   |   |     |
| —                   | crico — arythaenoideus posticus.                              | -   | - | - |     |
| —                   | корошкая трубочная или дудко - над-<br>мизинцевая.            |     |   |   |     |
| —                   | peronaeus brevis.                                             | -   | - | - | 125 |
| —                   | кусательная, или сколовая челюстная.                          |     |   |   |     |
| —                   | masséter.                                                     | -   | - | - | 57  |
| —                   | крестцовая верхелевая — rugiformis.                           | 114 |   |   |     |
| —                   | кругловатая лопатко - бугорковая.                             |     |   |   |     |
| —                   | teres minor.                                                  | -   | - | - | 88  |
| —                   | — — — плечевая.                                               |     |   |   |     |
| —                   | — major.                                                      | -   | - | - |     |
| Крылья грудобрюшни. |                                                               |     |   |   |     |
| Alae diaphragmatis. | -                                                             | -   | - | - | 71  |
| <hr/>               |                                                               |     |   |   |     |
| M.                  | ладонная длинная или мыщелко - ладонная.                      |     |   |   |     |
| —                   | palmaris longus.                                              | -   | - | - | 95  |
| —                   | — — подкожная.                                                |     |   |   |     |
| —                   | — brevis sev subcutaneus palmae.                              | 97  |   |   |     |
| И з                 |                                                               |     |   |   |     |

## Мм. личные носа и губъ.

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Mm. faciei, nasi et labiorum.                                            | 24 |
| М. ланишная — m. buccinator.                                             | 50 |
| Мм. лобная — frontales.                                                  | 18 |
| — локотка.                                                               |    |
| — anconeus.                                                              | 91 |
| — локотная внутренняя.                                                   |    |
| — radialis internus, s. flexor carpi radialis.                           | 94 |
| — локотная наружная.                                                     |    |
| — ulnaris externus.                                                      | 95 |
| — лопатко - дужковая.                                                    |    |
| — omoplato - hyoideus.                                                   |    |
| — лопатко - лучевая дву - начальная — biceps brachii, s. coracoradialis. | 59 |
| — лучевая внутренняя — radialis internus, s. flexor carpi radialis.      | 89 |
| — наружная или дву-начальная.                                            |    |
| — radialis extenus s. bicornis, s. bitendineus.                          | 94 |

---

## Мм. между - осписные шейные.

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| — interspinales colli.                                                                       | 62  |
| — — — поперечный.                                                                            |     |
| — intertransversales.                                                                        |     |
| — предпяспиная задня.                                                                        |     |
| — — — interossei externi.                                                                    | 105 |
| — — — ладонный.                                                                              |     |
| — interossei interni s. palmares.                                                            | 104 |
| — между - пред - плюсневые верхнія и по- дошвенные — m. interossei externi et interni pedis. | 126 |
| — — — проходная — m. perinaei.                                                               | 77  |
| — — — реберная — intercostales.                                                              | 64  |
| — — — — наружная и внутренняя. externi et interni.                                           |     |

---

|                                                   |  |     |
|---------------------------------------------------|--|-----|
| <b>М. надглопочная, или челюстно - глопоч-</b>    |  |     |
| ная — <i>constrictor pharyngis superior.</i>      |  | 55  |
| — над - оспо - бугорковая.                        |  |     |
| — <i>supraspinatus.</i>                           |  | 87  |
| — над - ушная, или височно - ушная.               |  |     |
| — <i>attollens auris, s. superior.</i>            |  | 20  |
| — надчерепная — <i>m. epicranius.</i>             |  | 18  |
| — надчерепникъ — <i>galea aponevrotica apo-</i>   |  |     |
| — <i>neurosis.</i>                                |  | 19  |
| — наружная бедровая предколѣнная.                 |  |     |
| — <i>vastus externus.</i>                         |  | 111 |
| — навзничковая длинная — <i>supinator lon-</i>    |  |     |
| — <i>gus s. brachioradialis.</i>                  |  | 92  |
| — нижне - челюстная угловая.                      |  |     |
| — <i>depressor anguli, s. triangularis oris.</i>  |  | 29  |
| — — короткая — <i>brevis.</i>                     |  | 92  |
| — никовая круглая.                                |  |     |
| — <i>pronator teres.</i>                          |  | 93  |
| — — четвероугловая.                               |  |     |
| — — <i>quadratus.</i>                             |  | —   |
| — нижней челюсти.                                 |  |     |
| — <i>maxillae inferioris.</i>                     |  | 36  |
| — ногъ.                                           |  |     |
| — носо - бровная.                                 |  | 105 |
| — <i>cerrugator supercilii.</i>                   |  | 52  |
| — иоско - плечевая.                               |  |     |
| — <i>coraco - brachialis.</i>                     |  | 89  |
| — осаждающая разгородку носа.                     |  |     |
| — <i>depressor septi narium.</i>                  |  | 26  |
| — основно - молотковая.                           |  |     |
| — <i>laxator tympani.</i>                         |  | 25  |
| — основно - язычковая — <i>m. circumflexus</i>    |  |     |
| — <i>palati, s. spheno - salpingo - staphyli-</i> |  |     |
| — <i>nus.</i>                                     |  | 55  |
| — отводящая большой перстъ короткая.              |  |     |
| — <i>abductor pollicis brevis.</i>                |  | 99  |

## М. отводящая большой перстъ длинная.

|   |                       |     |
|---|-----------------------|-----|
| — | longus.               | 103 |
| — | мизинецъ.             |     |
| — | digiti minimi.        | 100 |
| — | палецъ дву-начальная, |     |
| — | halucis biceps.       |     |
| — | мизинецъ ноги,        | 121 |
| — | digiti minimi.        | 125 |

## Паховая сухая жила.

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ligamentum inguinale. | 75 |
|-----------------------|----|

## Паховая опверстія.

|                    |    |
|--------------------|----|
| annuli inguinales. | 74 |
|--------------------|----|

## Перемычки — intersectiones terdineae.

66

## Мм. переднія щейныя.

|   |                                             |                    |
|---|---------------------------------------------|--------------------|
| — | colli anteriores.                           | 59                 |
| — | пирамидальная.                              |                    |
| — | pyramidaſis abdominis.                      | 66                 |
| — | пирамидно - язычковая                       | petro - salpingo - |
|   | staphylinus.                                | 55                 |
| — | подбородко - дужковая,                      |                    |
| — | genio - hyoideus.                           | 40                 |
| — | подбородковая губная.                       |                    |
| — | depresor labii inferioris s. quadratus men- |                    |
|   | ti, s. quadrangularis.                      | 29                 |

## М. подбородко - язычная.

|   |                  |    |
|---|------------------|----|
| — | genio - glossus. | 41 |
|---|------------------|----|

## — сосковая.

|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| — | digastricus s. biveptер maxillae inferioris. | 53 |
|---|----------------------------------------------|----|

## — подвздошная бедро-влагалищная,

|   |                       |     |
|---|-----------------------|-----|
| — | tensor fasciae latae. | 106 |
|---|-----------------------|-----|

## — подвздошно - крестцовая бедрени.

|   |                 |     |
|---|-----------------|-----|
| — | gluteus magnus. | 107 |
|---|-----------------|-----|

## — вертллевая большая.

|   |         |   |
|---|---------|---|
| — | medius. | — |
|---|---------|---|

## — меньшая.

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| — | parvus. | 108 |
|---|---------|-----|

|    |                                                                                                          |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| M. | подвздошная предберцовая.                                                                                |     |
| —  | longus cruris, s. sartorius.                                                                             | 110 |
| —  | подвздошно-вертледевая в <sup>и</sup> упренияя.                                                          |     |
| —  | M. iliacus internus.                                                                                     | 108 |
| —  | подзатыльниковая яремная.                                                                                |     |
| —  | rectus capitis lateralis.                                                                                | 46  |
| —  | — — — запылочная косая.                                                                                  |     |
| —  | obliquus superior, s. minor capitis.                                                                     | —   |
| —  | подкожная предшнейная или груднолич-<br>ная — m. subcutaneus s. latissimus,<br>s. platismamyoides colli. | 25  |
| —  | подкожная зашейная.                                                                                      |     |
| —  | trapezius s. cucullaris.                                                                                 | 84  |
| —  | подлопатко-бугорковая.                                                                                   |     |
| —  | subscapularis, s. submersus.                                                                             | 88  |
| —  | поднаметочная или шеи запылочная.                                                                        |     |
| —  | complexus.                                                                                               | 44  |
| —  | поднимающая лопатку, или шейно-ло-<br>пашочная угловая.                                                  |     |
| —  | levator scapulae.                                                                                        | 86  |
| —  | — верхнюю губу и ноздрю.                                                                                 |     |
| —  | levator labii superioris alaeque nasi,<br>s. dilatator naris.                                            | 26  |
| —  | подглазная губная.                                                                                       |     |
| —  | levator labii superioris proprius.                                                                       | 27  |
| —  | уголь рта коронка, или под-<br>глазная угловая рта.                                                      |     |
| —  | anguli oris.                                                                                             | 27  |
| —  | нижнюю губу.                                                                                             |     |
| —  | levator labii inferioris.                                                                                | 29  |
| —  | подбородокъ.                                                                                             |     |
| —  | levator menti.                                                                                           | 50  |
| —  | веко — levator palpebrae superioris.                                                                     | 35  |
| —  | задний проходъ, или подвздош-<br>ная задне-проходная.                                                    |     |
| —  | ani.                                                                                                     | 79  |

|                                           |                                                                       |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| M.                                        | поднимающая спволь, или съдалищная<br>пещерная.                       |     |
| —                                         | erector s. sustentator penis, s. ischiocan-<br>vernosus.              | 80  |
| —                                         | поднимающія ребра длинныя.                                            |     |
| —                                         | elevatores costarum longi.                                            | 65  |
| —                                         | — короткія.                                                           |     |
| —                                         | — breves.                                                             | —   |
| —                                         | поднимающая шуляша — m. cremaster<br>s. elevator testiculi.           | 69  |
| —                                         | под-остро-буторковая — m. infraspinatus.                              | 57  |
| Польза мышецъ.                            | —                                                                     | 17  |
| Полулунная полоса.                        | linea semilunaris.                                                    | 75  |
| M.                                        | поникающая верхнюю губу.                                              |     |
| —                                         | depressor labii superioris.                                           | 28  |
| —                                         | ноздрю, или предчелюстная<br>носовая — alae nasi.                     | 29  |
| —                                         | поперечная ушная,                                                     |     |
| —                                         | transversus auris s. helicis.                                         | 22  |
| —                                         | дирамидальная или между-пи-<br>рамидная.                              |     |
| —                                         | arytaenoideus transversus.                                            | 51  |
| —                                         | поперечная брюшная.                                                   |     |
| —                                         | transversus abdominis.                                                | 68  |
| —                                         | плече-локтевая бугорковая,                                            |     |
| —                                         | brachialis intermus.                                                  | 100 |
| —                                         | пояснице-реберная пучковая.                                           |     |
| —                                         | lumbo-costalis, s. sacro-lumbalis.                                    | 58  |
| —                                         | чешверо-угловая,                                                      |     |
| —                                         | lumbalis externus, s. quadratus lumborum.                             | 69  |
| —                                         | пояснично-лобковая — m. lumbalis inter-<br>nus minor, s. psoas minor. | 108 |
| —                                         | вертелевая — m. lumbalis inter-<br>nus major, s. psoas major.         | 109 |
| —                                         | пяточная над-пальцевая короткая.                                      |     |
| extensor communis brevis digitorum pedis. |                                                                       | 118 |

|                                            |   |   |   |   |     |
|--------------------------------------------|---|---|---|---|-----|
| M. плечно - локтевая.                      | - | - | - | - | 90  |
| m. brachialis internus.                    | - | - | - | - |     |
| Предплечное влагалище.                     | - | - | - | - | 90  |
| vagina antibrachii.                        | - | - | - | - |     |
| M. предбедерцовая клинная.                 | - | - | - | - | 124 |
| — tibialis anticus.                        | - | - | - | - |     |
| — предбедерцовая — m. cruralis s. crureus. | - | - | - | - | 111 |
| — предпаховая вершевая.                    | - | - | - | - |     |
| — pectineus s. lividus.                    | - | - | - | - | 109 |
| — — предбедерцовая.                        | - | - | - | - |     |
| — gracilis s. rectus cruris.               | - | - | - | - | 110 |
| — пред-ушная , или скуло-ушная.            | - | - | - | - |     |
| — attrahens , s. anterior auris.           | - | - | - | - | 21  |
| — предшнейная длинная,                     | - | - | - | - |     |
| — longus colli.                            | - | - | - | - | 47  |
| — приводящая большой перстъ.               | - | - | - | - |     |
| — adductor pollicis.                       | - | - | - | - | 100 |
| — — мизинецъ.                              | - | - | - | - |     |
| — — digitii minimi.                        | - | - | - | - | 101 |
| — — большой палецъ длинная.                | - | - | - | - |     |
| — — halucis magnus.                        | - | - | - | - | 122 |
| — — — — попечная.                          | - | - | - | - |     |
| — — — — minor.                             | - | - | - | - | 125 |
| — — противо-дѣйствующая.                   | - | - | - | - |     |
| — — opponens.                              | - | - | - | - | 100 |
| — — противо-козелковая,                    | - | - | - | - |     |
| — — antitragicus auris.                    | - | - | - | - | 22  |
| — — прямая глазная — recti oculi.          | - | - | - | - | 33  |
| — — прямая зашейная большая , или зуба-    | - | - | - | - |     |
| — — нико-запылочная,                       | - | - | - | - |     |
| — — rectus posticus capitis major.         | - | - | - | - | 45  |
| — — — — меньшая или подзапыль-             | - | - | - | - |     |
| — — никовая запылочная.                    | - | - | - | - |     |
| — — — — minor.                             | - | - | - | - | 46  |
| — — предшнейная.                           | - | - | - | - |     |
| — — anticus capitis.                       | - | - | - | - | 43  |

|    |                                                                                                                                   |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| M. | прямая брюха.                                                                                                                     |     |
| —  | rectus abdominis.                                                                                                                 | 65  |
| —  | — предколенная дву - начальная.                                                                                                   |     |
| —  | — cruris.                                                                                                                         | 110 |
|    |                                                                                                                                   |     |
| M. | разгибающая шею наружная.                                                                                                         |     |
| —  | erector cervicis superficialis,                                                                                                   | 59  |
| —  | — глубокая.                                                                                                                       |     |
| —  | — profundus.                                                                                                                      | 60  |
| —  | спину и шею поверхностная.                                                                                                        |     |
| —  | dorsi et cervicis.                                                                                                                |     |
| —  | позвоночной столбъ.                                                                                                               |     |
| —  | columnae vertebralis, s. multifidus                                                                                               |     |
| —  | spinae.                                                                                                                           | 61  |
| —  | персты.                                                                                                                           |     |
| —  | digitorum.                                                                                                                        | 101 |
| —  | указательной персть, или лок-<br>ште - указательная.                                                                              |     |
| —  | indicis, s. indicator.                                                                                                            | 102 |
| —  | большой персть длинная.                                                                                                           |     |
| —  | pollicis longus.                                                                                                                  |     |
| —  | — короткая.                                                                                                                       |     |
| —  | — brevis, s. minor.                                                                                                               | 105 |
| —  | предберцовая длинная над - паль-<br>цовая.                                                                                        |     |
| —  | commissis digitorum pedis longus.                                                                                                 | 113 |
| —  | большой палец длинная.                                                                                                            |     |
| —  | halucis longus.                                                                                                                   | 119 |
| —  | разширяющая задницу поперечная, или<br>поперечная междупроходная - trans-<br>versus superficialis perinei, s. dilata-<br>tor ani. |     |
| —  |                                                                                                                                   | 73  |
| —  | реберная подгрудниковая.                                                                                                          |     |
| —  | subclavius.                                                                                                                       | 95  |
| —  | ручные - m. manus.                                                                                                                | 89  |

Разширяющая задницу попереч. внутрен.

междупроходная — transversus proiun-  
dus perinaei, s. dilatator profundus, 78

|                                                                   |         |     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| М. Санторинова.                                                   |         |     |
| — risorius Santorini.                                             | - - - - | 25  |
| Сухие жилы.                                                       | - - - - | 12  |
| Сухожильные плевы — aponeuroses, s. mem-<br>branae tendineae.     | - - -   | 15  |
| Сухожильная ладонная плева.<br>aponeurosis palmaris.              | - - -   | 96  |
| М. съделищно-дудочная двуначальная.                               |         |     |
| — biceps-cruris.                                                  | - - - - | 115 |
| — предберцовая полу-сухожильная.                                  |         |     |
| — semitendineus.                                                  | - - -   |     |
| — съделищная пошочная,<br>erector clitoridis.                     | - - - - | 81  |
| — сгибающая персты виѣшняя, или под-<br>кожная.                   |         |     |
| — flexor digitorum sublimis, s. perforatus.                       | - - -   | 97  |
| — — глубокая.                                                     |         |     |
| — — profundus. s. perforans.                                      | - -     | 98  |
| — — большой перстъ длинная.                                       |         |     |
| — — pollicis longus.                                              | - - -   | 99  |
| — — короткая.                                                     |         |     |
| — — brevis.                                                       | - - -   | —   |
| — — мизинецъ.                                                     |         |     |
| — — auricularis.                                                  | - - -   | 101 |
| — — пальцы короткая.                                              |         |     |
| — — communis digitorum brevis.                                    | - -     | 119 |
| — — большой палецъ длинная.                                       |         |     |
| — — halucis longus.                                               | - - -   | 120 |
| — сгибающая пальцы длинная, или бер-<br>цовая подзапястная общая. |         |     |
| — flexor digitorum communis longus.                               | - -     | 120 |
| — — большой палецъ короткая.                                      |         |     |
| — — brevis halucis,                                               | - - -   | 127 |

|        |                                                             |     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|
| M.     | сгибающая мизинецъ коропская.                               |     |
| —      | — brevis digiti quinti.                                     | 124 |
| —      | сжимающая предпузирной железы.                              |     |
| —      | transvers. s. compressor prostatae.                         | 79  |
| —      | сжимающая ноздрю.                                           |     |
| —      | compressor naris.                                           | 28  |
| —      | малочный рукавъ.                                            |     |
| —      | constrictor vaginae s. cunni.                               | 81  |
| —      | внѣшняя, или задне-проходная хвостовая.                     |     |
| —      | sphincter externus, s. major ani.                           | 77  |
| —      | задній проходъ внутренняя, или задне-проходная кишечная.    |     |
| —      | internus, s. minor ani.                                     | 77  |
| —      | скуло-губная.                                               |     |
| —      | zygomaticus minor.                                          | 27  |
| —      | скуло-угловая.                                              |     |
| —      | zygomaticus major.                                          | —   |
| —      | спины и реберь.                                             | 56  |
| —      | спинно-хребтовая,                                           |     |
| —      | erector, s. spinalis dorsi.                                 | 60  |
| —      | спремянная — m. stapedius                                   | 24  |
| <br>M. | шреугловая зашнейная или намешная.                          |     |
| —      | splenius, s. triaangularis.                                 | 44  |
| —      | шреугловая плечная,                                         |     |
| —      | deltoideus.                                                 | 86  |
| —      | шоловища — trunci,                                          | 49  |
| —      | триначальная плечная.                                       |     |
| —      | triceps,                                                    | 90  |
| —      | бедра,                                                      |     |
| —      | femoris.                                                    | 112 |
| —      | сѣдалищная предберцовая полуплевочная — m. semimembranosus. | 114 |
| —      | трубо-молошковая,                                           |     |
| —      | tensor tympani s. Eustachianus                              | 25  |

|       |                                                                   |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| M.    | уха — m. auris.                                                   | 20  |
| —     | ускоряющая — accelerator.                                         | 79  |
| —     | устная или губная — orbicularis oris,<br>s. constrictor labiorum. | 25  |
| <hr/> |                                                                   |     |
| M.    | хребтовая длинная.                                                |     |
| —     | longissimus colli.                                                | 59  |
| —     | хребтоваа широкая, или поясничная<br>плечевая широкая.            |     |
| —     | latissimus s. maximus dorsi.                                      | 85  |
| —     | хвостовая — m. coccygeus, s. spinoso-<br>sacro - coccygeus.       | 80  |
| <hr/> |                                                                   |     |
| M.    | челюстно - дужковая.                                              |     |
| —     | mylo-hyoideus s. transversus mandibulae.                          | 40  |
| —     | черво-образный или сухожильный пер-<br>спицкий.                   |     |
| —     | lumbricales.                                                      | 98  |
| —     | — — — подпальцевый.                                               |     |
| —     | pedis.                                                            | 121 |
| —     | четверо - угловая; или спино - лопа-<br>точная.                   |     |
| —     | romboideus.                                                       | 87  |
| —     | — — — съдалицкая между-вер-<br>шневая — quadratus femoris.        | 118 |
| —     | четыре - зубая или спино - реберная.                              |     |
| —     | serratus posticus superior.                                       | 56  |
| —     | — — — пояснице - реберная.                                        |     |
| —     | inferior.                                                         | 57  |
| <hr/> |                                                                   |     |
| M.    | шейно - реберная передняя.                                        |     |
| —     | scalenus anticus superior.                                        | 57  |
| —     | — — — средняя.                                                    |     |
| —     | — — — medius.                                                     |     |
| —     | — — — задняя — posterior.                                         |     |

|       |                                                                                          |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| M.    | щило - глоопочная, stylo - pharyngeus, s.<br>levator, s. dilatator pharyngis.            | 52 |
| —     | шило - дужковая — m. stylo - hyoideus.                                                   | 41 |
| —     | шило - язычная — stylo - glossus.                                                        | 42 |
| <hr/> |                                                                                          |    |
| M.    | щипо - дужковая.                                                                         |    |
| —     | thyreo - hyoideus.                                                                       | 41 |
| —     | щипо - пирамидная.                                                                       |    |
| —     | thyreo - arythenoideus.                                                                  | 51 |
| <hr/> |                                                                                          |    |
| M.    | языка — M. linguae.                                                                      | 41 |
| —     | язычковая непарная — azygos uvulae.                                                      | 55 |
| —     | язычно - надгортаниковая.                                                                |    |
| —     | glosso - epiglotteus.                                                                    | 42 |
| —     | язычная — lingualis.                                                                     |    |
| —     | язычно - небная — glosso-palatinus, glosso - staphylinus, s. constrictor isthmi faucium. | 54 |
| <hr/> |                                                                                          |    |

---

## ПРИБАВЛЕНИЕ.

Сила Мм. соразмѣрна селипропвору, кисломѣру, краснотѣ, степени различія отъ клепчапки, величинѣ нервовъ, прливу крови, отъ коея части нераздражительная дѣлающа раздражительными, сообразна также съ раздраженіями душевными или внутренними (*psychicus*), произвольными и неожиданными, вѣшними, какъ то: Механическими, Химическими, дубильными началами и минеральными кислошами, на нихъ дѣйствующими. Раздраженные муравы носятъ шагость въ до разъ болѣ себѣ. Волокны Мм. не полыя, нити изъ клея, бѣлка и волокнистости состоятъ. Овѣ окрашены багряносцю (*сциог*), которую кажется онъ отдѣляющъ какъ раздраженіе для себя; ибо послѣ перевязки аршерій подвергающа параличу.

Мм. волокна раздражаютъ отъ гальванизированія въ умершихъ, что нервы, входя въ нихъ, слагаютъ покровы, а мякоть ихъ идетъ съ боку волоконъ. Почему, послѣ перерѣзанія перевязки и прижащія Нн., произвольная Мм. не повинуясь волѣ, не сжимающа клепчапкою и не разширяюща.

Скорость дѣйствія Мм. равна почши скорости движенья свѣта, что обнаруживается действиемъ ихъ при чтеніи, пласти, играли на скрипкѣ, скачкѣ лошадей, бѣгѣ и полетѣ животныхъ, а особливо инсектовъ и при движении людей, въ буйственномъ бреду находящихся. Однѣ изъ нихъ действуютъ почти непрерывно, какъ то: сердце, грудобрюшня и прочія Мм. дыханія, а другія съ перемежкою, какъ то: Мм. произвольныя, пищевый каналъ и проч. дѣйствія Мм. у новорожденныхъ младенцовъ и у старииковъ весьма слабо и неправильно, также въ корчахъ, судорогахъ, содроганіяхъ и проч.

---

НАУКА  
О МОКРОТНЫХЪ СУМОЧКАХЪ  
ТѢЛА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

А Н А Т О М И И.

~~~~~  
ЕФРЕМЪ МУХИНА.

~~~~~  
МОСКВА.

Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1818.

Optimus Anatomicus est etiam optimus Medicus Thomeier. p. 186. Quam funesta et mortifera evaderet possit praxis medica, nisi saniori Physiologiae superstructa fuerit. Blumenbach institut. Physiologicae pag. 565. Non hypotheses conditae, non opiniones vendito, quod vidi, scripsi. L. B. de Stoek, annus medicus; dissertatione praelim.

O quam pulcrum est audire naturam magistrum,  
Quae ad sequentes interiecti temporis  
Inventiones plurimum contulit. Phrl. Carm. IV. 207.



Печатать позволяетъ съ пѣмъ, чтобъ въ  
опечатаніи, до выпуска въ продажу, пред-  
ставлены были въ Цензурный Комитетъ одинъ  
экземпляръ сей книги для Цензурнаго Коми-  
тета, другой для Депаршаменша Министер-  
ства просвѣщенія, два экземпляра для Им-  
ператорской публичной Библіотеки и одинъ  
для Императорской Академіи Наукъ. Москва,  
Января 10 дня 1818 года. Ординарный Профес-  
соръ и Кавалеръ Василій Котельницкий.

---

## О ГЛАВЛЕНИЯ.

### Предисловіе четвертой Части.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НАУКИ

#### о Мокротныхъ Сумочкахъ.

##### ОТДѢЛЕНИЕ I.

О мокротныхъ сумочкахъ вообще.

Справа.

|          |                                                                                                                |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ГЛАВА I. | О названіи мокротныхъ сумочекъ.                                                                                | 11 |
| —        | II. Положеніе Мм. Сс.                                                                                          | 12 |
| —        | III. Видъ и раздѣленіе сумочекъ мокротныхъ.                                                                    | 14 |
| —        | IV. О сумочкахъ мокротныхъ пузырныхъ.                                                                          | 15 |
| —        | V. О мокротныхъ сумочкахъ трубочныхъ или влагалищныхъ.<br><i>Bursae mucosae vaginales, s. vaginae mucosae.</i> | 18 |
| —        | VI. О влагѣ мокротныхъ сумочекъ. <i>Unguen s. mucus.</i>                                                       | 21 |

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ НАУКИ

#### о Мокротныхъ Сумочкахъ.

##### ОТДѢЛЕНИЕ I.

О мокротныхъ сумочкахъ въ особенности.

|          |                                |    |
|----------|--------------------------------|----|
| ГЛАВА I. | О мокротныхъ сумочкахъ головы. | 24 |
|----------|--------------------------------|----|

##### ОТДѢЛЕНИЕ II.

О мокротныхъ сумочкахъ рукъ.

|          |                               |    |
|----------|-------------------------------|----|
| ГЛАВА I. | О мокротныхъ сумочкахъ плеча. | 26 |
|----------|-------------------------------|----|

## II.

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| ГЛАВА II. О мокропныхъ сумочкахъ предплечнаго сочлененія. | Стран. |
| — III. О мокропныхъ сумочкахъ кисти руки.                 | 29     |
| —                                                         | 59     |

## ОТДѢЛЕНИЕ III.

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ГЛАВА I. О сумочкахъ мокропныхъ бедра. | 55 |
| — II. О мокропныхъ сумочкахъ колѣна.   | 58 |
| — III. О мокропныхъ сумочкахъ ступени. | 59 |
| Списокъ предметамъ сей Частии.         |    |
| Оглавленія сей Частии.                 |    |

---

---

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Наука о Мокротныхъ Сумочкахъ никогда не была преподаваема въ Москвѣ, какъ въ Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, также въ Медико - Хирургической Академіи, до вступленія моего въ должность Профессора Анатоміи. Не существовало также до сихъ поръ никакого сочиненія о семъ предметѣ на отечественномъ нашемъ языке. Почему вступивши въ должность предшественниковъ моихъ, по сей часці Врачебныхъ наукъ, мужей толико прославившихся своею ученостію, любовію къ пользѣ наукъ и отличіями заслугъ ихъ, предлежаль мнѣ сугубый трудъ: 1) изобрѣсть приличнѣйшія наименованія, для предметовъ сей науки и сочинить опую въ классическомъ видѣ, для учащихся во врачебныхъ заведеніяхъ, въ коихъ

## IV.

я имѣю честь, между прочимъ, преподавать Анатомическія науки; а здѣсь надлежало мнѣ пріучить Гг. Прозекторовъ, приготовляя мокротныя сумочки, опровергать онъя надлежащимъ образомъ Анатомически, для показанія учащимся при лекціяхъ. По долговременному усиленіи моемъ въ трудахъ сихъ, весьма лестно было видѣть возрасшающіе успѣхи въ семъ новомъ и многотрудномъ начинаніи. Въ слѣдствіе чего я нынѣ имѣю честь съ удовольствіемъ моимъ сказать, что я первый достигъ въ семъ родѣ упражненія желаемой цѣли. Наука сія, сочинена будучи мною въ первой разъ на Россійскомъ языку, была подвержена разсмотрѣнію ученыхъ Мужей Императорскаго Московскаго Университета. Послѣ чего она признана за классическую и напечатана на изданіи Университета. Послѣ изданія преподалъ я практическіи ону, не сколько разъ какъ въ Университетѣ,

шакъ же въ Медико-Хирургической Академії учащимся. Разношь труповъ и способовъ приготовленія на оныхъ сумочекъ сихъ открыла мнѣ, что нѣкоторыя мои изложенія о семъ предметѣ не совсѣмъ показалися мнѣ удовлетворительными. Почему я, изобрѣпши въ замѣну оныхъ другія, приличнѣйшія и удовлетворительнѣйшія выраженія, для предметовъ сей науки, и сдѣлавши нѣкоторыя дополненія въ оной, сыскалъ за полезнѣйшее издать впорично оную, изъ любви къ наукамъ и вящей пользѣ учащихся, для употребленія при лекціяхъ и купно съ цѣллю, что она послужитъ Врачамъ, любезнымъ сооптичамъ моимъ, первымъ и надежнѣйшимъ основаніемъ къ познанію болѣзней мокротныхъ сумочекъ и къ успѣшному врачеванію оныхъ.

При чёмъ разсуждая о порядкѣ Анатомического ученія, которое до сего времени по различію предметовъ

## VI.

раздѣлялося на 7 частей, а именно : на костесловіе, связесловіе, мышесловіе, внутреннословіе,сосудословіе, первословіе и желѣзословіе, я съскажу, что наука о Мм. Сумочкахъ, какъ по устройствѣ (structure) предметовъ ея, также и по цѣли, для каковой Мм. сумочки находятся въ тѣлѣ человѣческомъ, не относится ни къ какой изъ числа 7ми означенныхъ частей Анатоміи ; почему она должна занимать особенное мѣсто въ сказанномъ порядкѣ раздѣленія Анатоміи. А какъ мокротные Сс. принадлежанъ къ числу пособій, находящихся въ тѣлѣ, для лучшаго дѣйствія мышецъ ; то и слѣдуешь, кажется мнѣ приличище, щипать часть сію Анатоміи 4ю. Такимъ образомъ на основаніи различія устройства тѣла человѣческаго, принявши науку сію за самостоятельную и помѣстивши ее между прочими частями Анатоміи, раздѣлилъ я Анатомію на 8 Частей по чи-

## VII.

слишельному порядку. Принявши сіе за правило, открываєшся, что Анастомія, присвоивши себѣ науку о Мокропныхъ Сумочкахъ, получаетъ нарочитое приращеніе въ кругу своихъ предметовъ.

Въ нынѣшнія времена, когда всѣ науки, а между оными Анастомія и Физіологія, какъ надежнѣйшія основанія или опоры Врачебной и Рукодѣятельной науки, взошли и въ Россіи весьма скорыми шагами на верхъ совершенства своего, ясно доказано, что нѣть ни малѣйшаго сомнѣнія между проинимъ въ ипомѣ, что всѣ органическія части тѣла человѣческаго соединены между собою клѣпчашою плеовою; всѣ мягкія части онаго и даже каждое волоконце, составляющее ихъ, имѣютъ большую часть оной въ своемъ составѣ; что всѣ клѣпочки плеевы сей въ здоровомъ состояніи имѣютъ взаимное между собою сообщеніе чрезъ свои отверстія, такъ что воздухъ, будучи

## VIII

вдунуть надлежащимъ образомъ, или самъ случайно взошедши въ одну изъ числа оныхъ, также какъ влага, какъ то: вода, масло, спиртъ, кровь, гной, молоко, пасока и даже рпуть, весьма удобно и довольно свободно входить изъ одной въ другія клѣточки, ей смежныя, что очевидно подшверждаютъ отеки (*oedema*), водянка или водяная болѣзнь клѣтчатой плевы, кровоизліяніе (*ecchymosis*) и гноянки перемѣщенныя (*abscessus metastaticus*), и проч.

Клѣточки таковыя всегда мягки, влажны (*membrana serofa*), въ здоровомъ состояніи отъ жидкости, которая, испаряясь изъ пасочныхъ сосудовъ, орошаетъ, смягчаєтъ ихъ и составляєтъ животную полноту (*turgor animalis*); а избыточествующее количество ея, находящееся въ клѣткахъ, поглощаемо будучи всасывающими сосудами, обыкновеннымъ путемъ поступающими въ кровеносные сосуды. Въ клѣткахъ со-

## IX.

вершається животворный процессъ (processus phlogisticus animalis ).

Пока равномѣрное таковое дѣйствіе всасывающихъ сосудовъ съ испаряющими существуещъ, до тѣхъ поръ не можетъ чрезмѣрно скопляться таковой парь въ клѣточкахъ и быть необыкновенный недоспашокъ онаго; а когда испаряющіе сосуды изливаютъ гораздо болѣе влаги таковой въ клѣточки, нежели вбираютъ всасывающіе сосуды, тогда неизбѣжно рождаются скопленія (stases s. congestiones) оной и другія пасочныя опухоли.

То же бываетъ и въ прочихъ отдаленныхъ или уединенныхъ полостяхъ, какъ то: въ полостяхъ черепа головнаго, глаза, груди, сердечни (pericardium), брюха, шульни или шуляшника, яичниковъ, машки и сусшавовъ. По таковому же закону животнаго организма рождаются животныя явленія здоровыя и болѣзни въ

мокрошихъ сумочкахъ, о коихъ я на-  
мѣренъ здѣсь говориши.

Желая преподать познаніе о Мо-  
крошихъ Сумочкахъ, я сыскалъ за по-  
лезнѣйшее предложить оное въ класси-  
ческомъ порядкѣ, крашко и ясно, въ  
приличномъ видѣ для сей цѣли, для  
вящей пользы обучающихся Апамомі,  
на отечественномъ языкѣ, по неимѣ-  
нію на ономъ такового сочиненія по сіе  
время, кроме перевода весьма крашкаго  
сочиненія (\*).

Я льщу себя надеждою, что люби-  
тели наукъ, удостоивши сей трудъ  
моей благосклоннаго вниманія, подкрѣ-  
пить желаніе мое быть полезнымъ  
любезнѣйшимъ моимъ соопичамъ и  
Врачебной Наукѣ въ Россіи.




---

(\*) Іос. Яков. Пленка первыя черты Анапо-  
міи, переводъ съ Лашинскаго на Российскій  
Гриа. Двигубскаго. Москва, 1796 года.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НАУКИ

о Мокротныхъ Сумочкахъ.

## ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О мокротныхъ сумочкахъ сообще,

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О названии мокротныхъ сумочекъ.

Онъ суть полые и непроходные мѣшечки, изъ плевочныхъ оболочекъ состоящіе и служащіе мышцамъ пособіемъ при движеніи ихъ.

Онъ получили различныя наименованія на Дашиинскомъ языкѣ отъ Анашомикова, а именно: *glandulae mucilaginosaes Haversii*, *vaginae tendinosae*, *s. membranae mucosae*, *s. capsulae tendinum articulares Viaslovii*, *bursae mucosae Albini et Veitbrechti*, *glandulae mucosae Cowperi*, *capsulae synoviales Plenckii et vesiculae unguinosaes Zagorskы*. Таکъ названы онъ отчасти отъ слизи, которой заключающіе въ себѣ, отчасти по виду своему, отчасти отъ употребленія, отчасти отъ устроенія ихъ; а особенные

названия получили онъ ошь Мм., при которыхъ лежашъ и для пользы коихъ онъ определены.



## ГЛАВА II.

### *Положение Мм. сс.*

Положеніе ихъ не вѣхъ постоянно. Онъ преимущественно предъ прочими мышцами находятся всегда при сухихъ жилахъ, такихъ изъ оныхъ, кои при движениі опираются о kostь или другую часть тѣла, какъ бы о блокѣ, и при томъ суть нарочито длинны, или отправляютъ сильныя движенія, каковы суть: Мм. косая глаза, окружающая крючекъ небнаго отростка основной кости, двуначальная лопатко - лучевая, грудная большая, широкая хребетная, многія ручныя и Мм. вершелей и ступени. — Онъ находится при нихъ поодинакѣ, или вмѣсто одной многія, а иногда вмѣсто многихъ малыхъ одна великая, всегда почти при началѣ или при концѣ мм. между наружного или внутреннею поверхностию сухой

жилы и костию, и другими смежными частями, съ которыми онъ соединены болѣе или менѣе плотно и по большей части кѣпчашкою, если только не срослись съ оними.

Мокропыхъ сс. находится гораздо болѣе у совершеннолѣтнихъ нежели у младенцевъ; также у людей, имѣющихъ большія Мм. и мало жиру, какъ собственныя безчисленные опыты научаютъ. Ихъ удобнѣо отыскивать въ шаковыхъ трупахъ, а особенно кои скоропостижно умерли, не спрадавши предварительно предъ смертью какою - либо изнурительною болѣзнию. Какъ число, также и бытіе вѣкоторыхъ изъ Мм. сс. непостоянно, то въ семъ отношеніи однѣ изъ нихъ называются *постоянными* (*regitentes*), а другія *временными* (*temporariae*).



## ГЛАВА III.

*Видъ и разделение сумочекъ мокротныхъ.*

Мм. сумочки по первому взгляду кажутся нѣсколько сходны съ мокротными железами; но какъ сіи малы, имѣющъ изпрахнительные каналы, кои оканчиваются въ открытия полости или на поверхность тѣла, то онѣ совершенно отличаются симъ однѣ отъ другихъ.

Сочленовныя сумочные связки также имѣющъ нѣкоторое сходство съ Мм. сумочками; но какъ онѣ опредѣлены настурою для соединенія двухъ явно-движимыхъ костей: то сею цѣлью явно отличаются отъ оныхъ.

Очерпавіе Сс. мм. вообще различно по возрасту, полу, сложенію и трудамъ тѣлеснымъ. Оно неопределеннное: ибо онѣ сушь или округлы, или яйцеобразны; или имѣющъ видъ трубочекъ, или вовсе неправильны; почему Сс. мм. по виду раздѣляются на *сумочки мокротныя лузырныя* (*bursae mucosae vesiculares*) и на *трубочныя или влагалищныя* (*bursae mucosae vaginales*, *s. vaginae mucosae*). Сверхъ сего Мм. со-

раздѣляются по частямъ тѣла человѣческаго на с. головы, руки и ноги.



## ГЛАВА IV.

### О сумочкахъ мокротныхъ пузирныхъ.

Онъ лежатъ по большей части при суставахъ плеча, локтя, бедра и колѣна, также при сухихъ жилахъ Мм., кои, слабо или плотно прикреплены будучи бокомъ къ одной части сухой жилы, или къ прочимъ частямъ посредствомъ сухожильныхъ нитей или тесемочекъ, разнообразно расположенныхъ, опираются при движениі о kostи, хрящи, слизки и проч.

Онъ по большой части короче и гораздо шире влагалищныхъ сумочекъ, имѣющъ видъ пузирка округлого, овального или неправильного; оболочки ихъ тонкѣ оболочекъ трубочныхъ сумочекъ, а полость ихъ соответствуетъ вышнему виду ихъ.

Онъ имѣютъ полости, умощенные слизью, а весьма немногія содержатъ въ себѣ жиръ; когда же онъ порожнякъ, то ихъ можно на-

дуть, налишь или заморозить, а потомъ ошѣлишь, при чёмъ вѣщая оболочка ихъ кажется особеною или продолженіемъ клѣтчатой плевы, покрывающей смежную м. — Овъ снаружи неровны и волокнины, а внутри въ полостяхъ гладки и влажны (*serosus s. mucosus*), и лоснящіяся имѣющъ разгородки, складки, нити и прицѣпочки. Жиръ, въ нихъ находящійся, образуетъ извнѣ сальные опросочки, подобные прибавочнымъ сальникамъ; вероятно, что сіи суть слѣдствія испаряемаго жира, а особенно при движениіи или при прижатії ихъ; жиръ и влажный паръ дѣлаютъ ихъ мягкими и способнѣйшими, для ихъ отправлений.

Приготовивши Мм. сс. для показанія при лекціяхъ, хранить должно ихъ сырыми и влажными: ибо безъ сего внутреннія спѣнки ихъ слипаются или вѣщаія присыхаютъ къ смежнымъ частямъ такъ, что сс. дѣлаются вовсе неспособными, для надуванія и надлежащаго обозрѣнія и показанія.

Хотя нѣкоторые Анатомики и Физиологи думали, что таковые жирные опросочки, подобные сальничкамъ, суть выпу-

сники ( *ductus excretorii* ) мокротныхъ сумочекъ ; но какъ они не имѣютъ полости , чрезъ кои бы можно было наливъ или надуть : то и не лѣзя принять ихъ за таковые испражнительные каналы , тѣмъ болѣе , что ихъ при влагалищныхъ сумочкахъ вовсе не находятся .

Нѣкоторыя изъ числа сумочекъ иногда имѣютъ выпускники ( *emissaria s. ductus* ) , кои однимъ или многими отверстіями вѣроятно сообщають мокроту въ полости сумочныхъ связокъ . Сабашъ говорилъ , что концы выпускниковъ сихъ сборчные или опущающие ( *simbriatus* ) ; но опыты не доказываютъ сего . — Отверстія сіи бывають иногда по большей части у стариковъ и спраждущихъ болью суставовъ , золопухою , цинготною и любострасными болѣзнями . —

Для показанія сумочки пошребно впервыхъ , перерѣзавши мышечную средину мышцы поперегъ , нижнюю часть ея отдѣлять отъ прочихъ смежныхъ частей постепенно , а поштомъ сухую жилу до мокротной сумочки и съ осторожностью .

Сумочки сіи отврашаютъ преніе сухихъ жиль при движеньї м. ; нѣкоторыя же изъ

нихъ служатъ имъ вмѣсто подкладокъ или подстилокъ, какъ то: находящіяся Се. ми., при ми. заграждающей внутренней вертеле-вой, основно - язычковой и подвздошно - вер-телевой внутренней. — Онъ увлажняющъ слизью своею сухія жилы и другія части, какъ то: блокъ косой глазной м., связку предколѣнниковую берцовую, и проч. —



## ГЛАВА V.

*O монротинъхъ сумочкахъ трубочнѣхъ  
или слагалищнѣхъ.*

( *Bursae mucosae vaginales, f. vaginae mu-  
cosae.* )

Онъ лежатъ по большей части во влагалищныхъ связкахъ и заключающъ въ себѣ сухія жилы ми., разгибающихъ и сбигающихъ персты рукъ и пальцы ногъ; въ дру-гихъ же мѣстахъ не находятся.

Онъ вообще длиннѣе пузырныхъ сумочекъ и имѣютъ видъ трубочекъ по большей ча-сти цилиндрическихъ, раздѣляющихся на двое или болѣе; почему онъ сушъ одинаковъ (*simplices*), или двойныя (*duplices* s. *ramosae*,

s. loculomentosae) и проч. — Первая изъ нихъ включаютъ въ себѣ одну, а другія двѣ и болѣе сухихъ жилъ, или имѣютъ по-  
дости.

Сумочки сіи вообще состоятъ изъ тон-  
кой нѣжной оболочки, составляющей вну-  
треннюю поверхность пузырныхъ сумочекъ. —  
Оболочка сія нечuveсткимъльна, сосудиста,  
прозрачна, снаружи неглазкая отъ соедине-  
нія съ влагалищными связками или другими  
смежными частями клѣпачикою, а вну-  
тренняя поверхность ея гладкая, влажная  
(serosus) и соединяется прицѣпочками (fila  
tendinea) съ сухими жилами; чрезъ сіи  
прицѣочки проходятъ сосуды.

С. м.м. хотя не имѣютъ въ систавѣ  
своемъ чувственныхъ жилъ, кромѣ весьма  
немногихъ, проходящихъ чрезъ нихъ; одан-  
ко же, будучи растянуты, какъ то: при  
ревматизмахъ, воспаленіяхъ и вывихахъ,  
подвергаются весьма жестокимъ болямъ и  
воспаленіямъ, также какъ и пузырный С. м.м.

С. сіи вышеи по числу сухихъ жилъ,  
въ нихъ находящихся, раздѣляются разго-  
родками, такъ что когда одна сухая жила

раздѣляется на двѣ или болѣе, шо и общая сумочка ихъ по числу сему раздвоется или дѣлается вѣшивистою; и напротивъ, когда сухія жилы ми. соединяются въ одну жилу, шо и сумочка изъ вѣшивистой дѣлается однавкою.

Онъ внутри соединяются съ сухими жилами, а снаружи съ смежными частями слабо или плотно; а какъ многія изъ Мм. сс., а особливо влагалищныхъ, лежатъ по большей части во влагалищныхъ связкахъ: то, для открытия оныхъ, потребно вскрыть прежде и съ надлежащею осторожностию влагалищную связку. Какъ онъ имѣютъ явную полость, то можно ихъ валить, надуть, а иногда цѣлую сумочку опадѣлишь съ мокротою, въ ней находящуюся.

Польза или употребление сихъ сумочекъ состоится въ томъ, что онъ защищають сухія жилы отъ вліянія костей, хрящей и другихъ смежныхъ частей при движениі; онъ умѣшаютъ идерживающіе ихъ въ надлежащемъ положеніи, чѣмъ онъ, какъ блоки или опоры и подставки (*hypomochlum*), вспомоющеествуяющіе ихъ отправленію.



## ГЛАВА VI.

*О влагѣ мокротныхъ сумоченъ.*

( *Unguent s. mucus.* )

Влага сія по виду желтоватая, масляная, сходная съ яичнымъ белкомъ и съ слизью мокротныхъ плевъ и сумочныхъ свицокъ. Она гуще, красноватѣ и клейче въ сумочкахъ, находящихся при сочлененіяхъ, какъ то: при сухихъ жилахъ, при надпяточной предколѣнной и другихъ, подверженныхъ сильному и частному прижатію при движении, нежели въ прочимъ мышахъ.

Какъ всякое испареніе, даже то, которое изъ тончайшихъ плевъ испаряется, есть видъ определенія; почему слѣдуетъ, что слизь Мм. сс., также какъ сукровица, сочлененная влага, жиръ и мозгъ кости, есть определеніе плевъ.

Слизь Мм. сумочекъ испаряется чрезъ скважины (*poros*) изъ сосудовъ въ полоски ихъ и преимущественно, кажется, въ мышахъ ихъ, где находятся складки, приспособки и жиры: ибо въ сихъ мышахъ больше прочихъ открывавшихъ шаковыхъ сосудовъ.

Влага сія, подвержена будучи испытанию, измѣняется точно такъ же, какъ влага сочлененій, какъ то: отъ минеральныхъ кислотъ дѣлается мутною, отъ раствора солемы со спиртомъ сгущается, съ водою и съ масломъ смѣшивается, отъ жару степени кипящей воды, отъ спирту, также отъ морозу съдѣается (*coagulatur*), какъ яичный бѣлокъ, а отъ фіалковаго сыропу зеленѣетъ, смѣщана будучи съ водою, бѣльшъ, высушенная горитъ, какъ клей или рогъ.

Влага сія свойствомъ своимъ сходна съ яичнымъ бѣлкомъ и со слизью суппозиторій. Это доказываетъ безболѣзное излитіе влаги Мм. с. въ сумочныхъ связки, и напротивъ.

Она похожа цвѣтомъ на бѣлокъ яичный, прозрачна, кляйка, слизиста, запаху не имѣетъ; почему, кажущаяся, она состоять изъ воды, волокнистости (*Lympha coagulabilis*), изкопаемой попаши, коваренной соли и офтосфоренной извести.

Влага Мм. сумочекъ способствуетъ движению Мм. сухихъ жилъ, связокъ и суставовъ. — Какъ сумочки сіи, а особенно имѣющія жиръ въ болѣзняхъ скромпечныхъ, находят-

ся порожними; то вѣроятно, что онѣ тогдѣ доставляютъ питаніе пречимъ часцамъ тѣла открыша. Будучи открыта какая-либо большая изъ нихъ въ живомъ человѣкѣ, изливаетъ сполько влаги, что въ извѣстное время изнуряетъ больнаго. Посему кажется вообще, что Сс. мм. весьма полезны и необходимы, для здоровья нашего и самой жизни. —

Въ заключеніи сказать дѣжно, что не сполько вообще тѣло человѣческое, какъ пре- восходнѣйшее твореніе прочихъ животныхъ, но и каждая часть оваго получили въ удѣлѣ свой определенный средства и пособія, для враща- го исполненія отправленія своего, что нѣпѣ- ни одной части, которая бы не имѣла какого- либо рода всевозможной привадлежности.

Въ числѣ частей тѣла нашего могутъ служить намъ явнымъ доказательствомъ мышцы. — Натура, для предохраненія ихъ отъ сѣдловій трезія, каковыя неизбѣжно бывають за оными послѣ взаимнаго дѣйствія двухъ сухихъ тѣлъ, снабдилъ ихъ не споль- ко жиромъ, паромъ, но сверхъ сего мокромъ- выми сумочкамиъ, для вращающаго и успѣшнѣй- шаго ихъ отправленія. —



---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ НАУКИ

о Мокротныхъ Сумочкахъ.

### ОТДѢЛЕНИЕ ПЕРВОЕ.

О мокротныхъ сумочкахъ єъ особенности.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О мокротныхъ сумочкахъ головы.

Сумочка мокротная влагалищная блоковая или косой надглазной мышцы (*bursa trochlearis*).

Она есть продолговато - овальная сумочка, обекающая сухую жилу сей м. сзади блока до разширения ея при концѣ у глазного шара.

С. м. пузырная сосковая или задняя подбородко - сосковой мышцы (*b. mastoidea*).

Она лежитъ у сосковой выемки между концами подбородко - сосковой м., грудино - сосковой, намешной и зашейно - сосковой; она состоитъ изъ швердой оболочки, имеющей

овальный видъ и прикрѣпляется въ сухой жилѣ подбородко-соковой м.; она часто бываетъ наполнена жаромъ.

*C. m. пузырь дужковая или средней сухой жилы м. подбородковой - соковой* ( b, hyoidea ).

Она яйцеобразная, лежитъ спереди конца шило-дужковой м., прикрѣплена плотно кѣщечкою въ внутренней сторонѣ жилы м. подбородко-соковой въ прицѣпочкѣ, которая соединяетъ м. съ дужкою. — Она состоитъ изъ тонкой пленки и имѣетъ видъ овальный. —

*C. m. пузырь челюстная междуорганных скелетных* ( b. masseterica ).

Одна или двѣ округлые ( circulares ) Мм. сс. лежатъ въ полуулунной междуорганных скелетных выемкѣ, между челюстью и м. кусательною и жевательною наружною.

*C. m. пузырь на небнаго крючка или основно - язычковой м. ( м. circumflexi parati s. b. hamularis ).*

Лежитъ между сухою жилою сей м. и крючкомъ, гдѣ она зацѣпляется за онай; она имѣетъ овальный видъ и, будучи при-

креплена плотно, служитъ сей жилъ вмѣсто мягкой подкладки: ибо она находится всегда почти наполнена жиромъ.

*С. м. лузырная предщипная или грудино-дужновой м. (b. thyreoidea).*

Она лежитъ предъ верхнею выемкою щипного хряща, между переднею дужко-щипною связкою и концами щипно-и грудино-дужковой м. имѣетъ треугольный видъ, и соединена будучи клѣшчашкою съ оними, служитъ имъ вмѣсто мягкой подшилки.



## ОТДѢЛЕНИЕ ВТОРОЕ.

*О монротныхъ сумочкахъ руки.*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

*О монротныхъ сумочкахъ плеча.*

*С. м. лузырная реберно-надгрудниковая (subclavia s. costo-clavicularis).*

Она иногда находится между надгрудникомъ, ребромъ и наружнымъ краемъ ребро-надгрудниковой связки, имѣетъ видъ небольшой и овальной, а будучи наполнена жиромъ, неправильный. —

*С. м. пузырная надносковая между-  
связочная* (*supracoracoidea interligamentosa*).

Лежитъ подъ заднимъ концемъ надгру-  
дника надъ носковымъ отросткомъ и между  
связками носко-надгрудниковыхъ: заднею и  
переднею.

*С. ж. пузырная остиного отростка  
лопатки или надсуставная* (*b. supraar-  
ticularis s. subacromialis*).

Она лежитъ между м. треугольною плеч-  
ною, связками, сумочною плеча и между т.  
отростковою, по большей части довольно  
велика, почти окружлая, прикрѣпляется плош-  
но къ верхней части сумочной связки плеча,  
и имѣетъ иногда отверстіе въ сонцевовную  
связку.

*С. ж. пузырная подшейная лопат-  
ки или подлопатко-бугорковой мышцы.*  
(*b. coracoidea, s. subscapularis*).

Лежитъ между корнемъ носковаго отро-  
стка, между шейкою лопатки и сухою жи-  
лою подлопаточной м.; иногда ихъ нахо-  
дится двѣ.

*С. ж. пузырная грудно-плечевой м.*  
(*b. m. pectoralis majoris*).

Она лежитъ между сухою жилою сей м. и остью, идущею отъ большаго бугорка плечевой кости; состоятъ изъ тонкой плены, и иногда она заключаетъ въ себѣ шарики жира.

*C. m. лузырн. реберн - сосковой м.  
(b. pectoralis minoris).*

Она лежитъ между сухою жилою сей м., концомъ носка, сумочною связкою плеча и м. сумочкою надсуспавною.

*C. m. лузырная носко - плечевой м.  
(b. m. coraco - brachialis).*

Она лежитъ между сухими жилами сей м. и подлопатко - бугорковой.

*C. m. влагалищная между - бугорковая  
или бороздновал (b. bicipitalis).*

Она лежитъ во влагалищѣ сухой жилы сей м. въ между - бугорковой браздѣ и покрываетъ всю почки сухую жилу лопатко - лучевой м. до мышечной части ея.

*C. m. лузырная хребетной широкой,  
м. (b. latissimi dorsi).*

Она лежитъ между сухою жилою сей м. и плечевою kostью, состоятъ изъ тонкой кляшчашки, плотно прикрепленной къ сухой

жилъ сей м. и кругловатой лопатко - плечевой.

*С. м. пузырьная наружная и с внутренняя лопатно - плечевой кругловатой м. (в. teretis majoris externa et interna).*

1 я Изъ нихъ лежишъ между концомъ сухой жилы сей м., плечевою костью и сухою жилою хребеиной широкой м., а 2 я где сухожильныя волокна сей м. раздѣлены на 2 доли.



## ГЛАВА II.

*О мокротныхъ сумочкахъ предплечнаго сочлененія.*

*С. м. пузырная локотковая или триначальной плечевой м. (в. anconeа).*

Она лежишъ посрединѣ локотка подъ сухою жилою сей м.

*С. м. пузырь. лучевая бугорковая или лучеваго конца лопатно-лучевой м. (в. radiobicipitalis).*

Она находится между гладкою половиною двойчатаго бугорка луча и сухою жи-

лою сей м. подъ ми. плечелокшевой и на-  
взничковой короткой.

*C. m. пузир. головки луча* (*L. capitulo - radialis*).

Она находится болѣе съ наружнаго боку  
шейки между головкою луча и общимъ нача-  
ломъ ми. короткой луچевой, разгибающей  
персты и мыщелковой пястной.



### ГЛАВА III.

*О мокротныхъ сумочкахъ кисти руки.*

Всѣ слѣдующія мокротныя сумочки по-  
лучающъ свое наименованіе по *Лапинеки*  
отъ ми., коимъ принадлежатъ въ пр. *b. va-  
ginales externae m. flexoris longi pollicis* и  
проч., выключая нѣкоторыя, ниже особенно  
названныя.

*C. m. влагалищная внѣшняя м. сги-  
бающей большой перстъ длинной.*

Она обвѣмлетъ почти до конца всю су-  
хую жилу сей м. и лежитъ между kostями,  
угловатикомъ меньшимъ и сумочною связкою  
предплечною пястной.

*С. ж. влагалищ. средняя большого перстя и всѣхъ сгибающиxъ л.м.*

Она объемлетъ сухія жилы означеныхъ м.м., лежитъ подъ связкою общую предплечной, переднею частью нижняго конца луча и между сумочною связкою предплечной пястною. — Она весьма обширна.

*С. ж. нижняя трубочная сухихъ жилья л. подкожной, сгибающей 4 перстя.*

Она объемлетъ вѣсъ сей м. 4 начала сухихъ жилья, и постомъ каждую изъ нихъ даже въ связочныхъ влагалищахъ порознь до концовъ предпастныхъ костей.

*С. ж. влагалищ. сгибающиxъ сухихъ жилья глубокой л. внутренней.*

Она объемлетъ сухія жилы глубокой м. сгибающей персты, лежитъ между нижнимъ концомъ луча и сумочною связкою предплечья съ пястью, а постомъ, слѣдя съ каждою жилою порознь, покрываетъ ихъ во влагалищахъ связкахъ до конца.

*С. ж. влагалищ. лучевой внутренней м.*

Она прикреплена къ сухой жилѣ сей м. и объемлетъ ее такъ, что между ею, большимъ угловатикомъ и поперечной ладонною связкою находится межушокъ.

*С. м. пузырь. локтевой внутренней м.*

Она весьма мала и лежитъ между сухою жилою сей м. и косточкою кругловатикомъ.

*С. м. влагалище. м. отводящей большої перстъ.*

Она объемлетъ сухую жилу сей м. и лежитъ предъ концомъ лучевой кости.

*С. м. влагалище. лучевая общая верхняя.*

Она, будучи длинна и велика, вмѣщающа сухія жилы двуконечной мышцы лучевой отъ мышечной части ихъ до мокрот. с. ихъ нижней и продолжается съ ними подъ м. длинною, отводящею большой перстъ.

*С. м. влагалищная лучевая общая нижняя.*

Она также велика, какъ предыдущая, и вмѣщающа обѣ сухія жилы м. лучевой двуконечной предъ пястью подъ м. с. ихъ верхнею.

*С. м. влагалищная лучевой длинной м.*

Она облекаешь одну сухую жилу сей м. въ браздѣ снаружи предъ нижнимъ концемъ луча подъ мокрошною с. нижею общю. — Сверхъ сей находящаяся пузырная между сею жилою и предпастною 2 ю костью.

*С. м. пузырная лучевой короткой м.*

Она ве велика, лежитъ между концомъ сухой жилы и 2 ю костью предпастія и не всегда находится. Сверхъ сего конецъ сухой жилы сей м. покрытъ влагалищн. с.

*С. м. трубочная верхняя разгибающей длинной м. большой перстъ.*

Она продолговата, объемлетъ сухую жилу сей м. до сушава предплечія.

*С. м. влагалищная нижняя м. большой разгибающей большой перстъ.*

Она объемлетъ сухую жилу сей м. при kostи предпастной большаго перспа, ниже сумочки верхней м. сей.

*С. м. влагалищ. м. разгибающей персты.*

Сія сумочка заключаетъ въ себѣ до сушава ручной кисти сухія жилы м. разги-

бающеи перстны, потомъ, раздѣлившияся при концѣ лука на 3 трубочки, изъ коихъ каждая заключаетъ въ себѣ по одной сухой жилѣ сей м., даже въ полостяхъ связочныхъ влагалищъ, идетъ къ 3 среднимъ першамъ до конца ихъ.

*С. м. влагалищ. собственная м. разгибающей мизинецъ.*

Она лежитъ между сухими жилами Мм. лакотной вѣшней и разгибающей перстны, и обвемлетъ сухую жилу сей м., съ кою идетъ подъ связкою пястною почти до конца перста.

*С. м. пузыри. лакотной внутренней м.*

Она лежитъ между сухою жилою сей м. между костью, кругликомъ, сверхъ сего конецъ сухой жилы сей покрытъ влагалищн. с. до конца ея.

*С. Мм. пузырныхъ червообразныхъ м. или между перстня.*

Ихъ числомъ 3 : 1 я лежитъ въ межушкѣ мизинца, а прочія между слѣдующими перстнами у корней ихъ, при соединеніи

він сухожильныхъ концовъ сихъ мышецъ съ сухими жилами и общей разгибающей персы.



## ОТДѢЛЕНИЕ ТРЕТИЕ.

*О мокротныхъ сумочкахъ ногъ.*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

*О сумочкахъ мокротныхъ бедра.*

*С. л. лузырная предтазовая ( b. puberalis ).*

Сія с. весьма пространная, лежитъ между Мм. подвздошно-вертелевою внутреннею и пояснично-вертелевою, также между сумочною связкою бедра ниже подвздошной нижней выемки, предъ тазомъ, где приступаетъ къ сухимъ жиламъ сихъ Мм.

*С. л. лузырн. корня меньшаго вертелля ( b. trochanteris minoris ).*

Она лежитъ между корнемъ его и м. предтазовою вертелевою.

*С. л. лузырн. корня большаго вертелля ( b. radicis trochanteris majoris ).*

Она очень велика, лежитъ между корнемъ большаго вертеля и сухими жилами Мм. подвздошно - крестцовой, бедро - влагалищной и бедрово - предколѣнной. — Въ ней находятся по большей части сухожильныя нити, плевы, жиръ и складки. Она имѣетъ иногда мноғія пещерки (*antra*), или мѣстечки (*loculamenta*).

*C. m. лузырн. у верхушки большаго вертеля* ( b. apicis troch. majoris ).

Она лежитъ между сухими жилами Мм. подвздошно - вертелевой большой, крестцово - вертелевой и верхушкою вертеля.

*C. m. лузырн. м. подвздошно - вертелевой меньшой.*

Она лежитъ между сухою жилою сей м. и верхушкою большаго вертеля.

*C. m. лузырн. задняя м. заграждающей вертелевой внутренней.*

Она лежитъ въ выемкѣ, находящейся между сѣдалищнымъ бугоркомъ и остью подъ сухою жилою сей м., при соединеніи ея съ двойничными Мм.

*C. m. лузыр. передняя м. заграждающей вертелевой внутренней.*

Она лежитъ между сухими жилами Мм. сей двойничной, сѣдалищно - вертелевой и сумочкою связкою вертлюжною. Она длинна и доходитъ почти до конца означенныхъ Мм.

*С. м. пузыри. м. двойничной сѣдалищно-вертелевой верхней.*

Лежитъ подъ сухою жилою сей м.

*С. м. пузыри. м. полусухожильной сѣдалищной предберцовой м.*

Она лежитъ подъ началами сей и двуначальной, при соединеніи ихъ.

*С. м. пузыри. полуулевочной м.*

Она лежитъ между началомъ сей м. чеп-вероуголовой сѣдалищной между - вертелевой, и длиннымъ началомъ м. дву-начальной. —

*С. м. пузыри. м. внутренней подвздошно - вертелевой.*

Она лежитъ между сухою жилою сей м. и меньшимъ вертелемъ.



## ГЛАВА II.

*О монротныхъ сумочкахъ колѣна.*

*С. м. лузыри. предколѣнная (в. patellaris).*

Она лежитъ между сухожильными волокнами влагалища бедра, сухою жилою надколнинною и между костною плевою и спереди предколѣнника.

*С. м. лузыри. подколѣнниковая (в. infrapatellaris).*

Она лежитъ подъ верхушкою предколѣнника надъ предберцовыми бугоркомъ подъ связкою предколѣнниковою берцовою. — Она заключаетъ въ себѣ комокъ или выпуклость покрытаго жира.

*С. м. лузыри. передняя у внутренняго мышечка берца.*

Она лежитъ между внутреннею связкою бедро-берцовою боковою и концами сухихъ жилъ Мм., сгибающихъ берцо.

*С. м. лузыри. задняя внутренняго мышечка берца.*

Она лежитъ между сумочною связкою и сухими жилами Мм. полуплевоочной и внутренняго начала пузашика.

*С. м. пузырн. задняя сустава еоловки дудки.*

Она лежитъ между головкою дудки, сухою жилою м. заколѣнной, наружнымъ началомъ м. пузашика и сумочною связкою дудки.

*С. м. пузырн. м. двуначальной свадалищно-трубочной (в. bicipitalis genu).*

Она лежитъ между окончаниемъ м. сумочною связкою головки дудки и бедротрубочной боковою связкою.



### ГЛАВА III.

*О мокротныхъ сумочкахъ ступени.*

*С. м. пузырн. надпяточная (в. Achyllea s. supra-calanea).*

Она лежитъ сзади плюсна между пяткою, концомъ сухой жилы надпяточной, и весьма часто включаетъ въ себѣ шарики жиры.

*С. м. влагалищная м. предберцовой клинной надплюсневая.*

Она вмѣщаетъ въ себѣ сухую жилу сей м., лежитъ предъ внутреннею лодыжкою голени и сумочкою связкою надпяшочно-голеневою и надъ плюсномъ.

*С. м. влагалище. длинной м. разгибающей большой палецъ.*

Она лежитъ предъ сумочкою связкою пяшечно - голеневою, где сухая жила сей м. вдѣлѣ въ браздѣ; она включаетъ жилу сей м. —

*С. м. влагалищная м. разгибающей берцовой длинной надпальцевой.*

Она лежитъ подъ херообразною предплюсневою связкою берца и плюсна, и объемлетъ сперва вмѣстѣ, а потомъ порознь сухія жилы сей м.

*С. м. трубочная общая Мм. трубочкихъ длинной и короткой.*

Она лежитъ предъ наружною лодыжкою голени на плюснѣ, включаетъ въ себѣ сухія жилы сихъ Мм. сперва вмѣстѣ, а потомъ порознь, будучи разделена разгородкою. — Одна изъ сихъ м. с. подъ плюсномъ объемлетъ сухую жилу длинной сей м.; а другая ниже общей сумочки вмѣщаетъ въ се-

бѣ сухую жилу короткой м. трубочнай до конца.

*С. м. трубочная м. длинной сгибающей большой палецъ пяточной.*

Она находится у наружной лодыжки въ браздѣ пятки и надпяточной kostи, и даже подъ большимъ пальцомъ, гдѣ вмѣщаетъ въ себѣ сухую жилу сей м.

*С. м. трубоч. м. длинной сгибающей пальцы.*

Она покрываетъ сухую жилу сей м. до конца трубки съ боку пяточной kostи и сзади вѣшней лодыжки.

*С. м. влагалищная м. берцовой задней.*

Она одѣваетъ сухую жилу до конца трубки и съ боку надпяточной kostи, сзади вѣшней лодыжки и подъ пяткою.

*С. м. влагалищ. общая Мм. сгибающихъ пальцы.*

Она лежитъ подъ ступеню, и есть общая Мм. сгибающей большой палецъ и глубокой, сгибающей прочіе пальцы; она одѣваетъ ихъ всѣ вмѣстѣ, а по помѣ порознь даже во влагалищныхъ связкахъ.

*С. м. влагалищи. м. длинной, сгибаю-  
щей большой палецъ.*

Она лежитъ подъ косточками большаго пальца.

*С. м. трубочная м. поверхней сги-  
бающей пальцы.*

Ихъ 4, по одной для каждой сухой жи-  
лы. — Овь начинаются отъ косточки ко-  
ренної, а оканчиваются въ верхушечной  
пальца вмѣстѣ съ сухими жилами, и лежащі  
во влагалищныхъ связкахъ.

*Сс. Мм. между-пальцовыя или влага-  
лищныя Мм. червообразныя.*

Сколько Мм. сихъ, столько же находиш-  
ся влагалищныхъ мокротныхъ Сс., по одной  
для каждой изъ нихъ; сверхъ сихъ находят-  
ся Мм. сс. пузырные, округлые небольшія  
между корнями пальцовъ.

КОНЕЦЪ.



# С П И С О КЪ

*предметовъ, содержащихся въ 4й Ча-  
сти Анатоміи.*

|                                                     | Стран. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Мокротные сумочки вообще. -                         | 11     |
| — въ особенности. —                                 | 24     |
| <br>                                                |        |
| С. м. влагалищная м. берцовой задней.               | 41     |
| — блоковая или косой над-                           |        |
| глазной м. — <i>bursa trochlearis.</i>              | 24     |
| С. м. времянная — <i>temporariae.</i>               | 15     |
| Басть и раздѣление С. м.                            | 14     |
| Влага мокротныхъ сумочекъ — <i>unguen s. mucus.</i> | 21     |
| С. м. пузырная верхушки большаго вер-               |        |
| шеля — <i>b. apicis trochanteris majoris.</i>       | 56     |
| <br>                                                |        |
| С. м. головы. - - - -                               | 24     |
| С. м. пузырн. головки луча — <i>b. capitulo-</i>    |        |
| <i>radialis.</i> - - - -                            | 30     |
| — грудноплечевой м. — <i>b. m. pectoralis</i>       |        |
| <i>majoris,</i> - - - -                             | 27     |
| <br>                                                |        |
| С. м. пузыр. м. двойничной сѣдалищно-               |        |
| вершловой верхней. - -                              | 57     |
| — дужковая или средняя сухой                        |        |
| жилы — <i>b. hyoidea.</i> - -                       | 25     |
| — дву-начальной сѣдалищ-                            |        |
| но-шрублочной — <i>b. bicipitalis genu.</i>         | 59     |

|         |                                                                                           |    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| С. м.   | пузырь, задняя м. заграждающей вершево-<br>вой внутренней.                                | 56 |
| — — —   | внутренняго мышеч-<br>ка берца.                                                           | 58 |
| — — —   | сuspava головки дудки.                                                                    | 59 |
| — — —   | заграждающей внутрен. вер-<br>шев. м. передняя.                                           | 56 |
| <hr/>   |                                                                                           |    |
| С. м.   | пузырь, корня большого вершеля.<br>b. radicis trochanteris majoris.                       | 55 |
| — — —   | меньшаго — minoris.                                                                       | —  |
| Сс. Мм. | пузырь, лопатко-плечевой кругло-<br>вой м. — bb. teretis majoris exter-<br>na et interna. | 29 |
| — — —   | локотковая или три-начальной пле-<br>чевой м. — b. anconeae.                              | —  |
| — — —   | лучевая бугорковая или лучеваго<br>конца лопатко-лучевой м. — b. ga-<br>diobicipitalis.   | —  |
| — — —   | лоцкной внутренней м.                                                                     | 54 |
| — — —   | лучевой коропкой м.                                                                       | 55 |
| — — —   | влагалищная лучевой длинной м.                                                            | —  |
| — — —   | влагалищная лучевая общая верхняя.                                                        | 52 |
| — — —   | нижняя.                                                                                   | —  |
| — — —   | внутренняя.                                                                               | 51 |
| <hr/>   |                                                                                           |    |
| С. м.   | влагалищн. между-бугорковая — b.<br>bicipitalis.                                          | 28 |
| — — —   | между - пальцевая или<br>Мм. червообразныхъ.                                              | 42 |
| <hr/>   |                                                                                           |    |
| С. м.   | пузырь, надносовая между - связоч-<br>ная — suptacoracoidea interligamentosa.             | 27 |
| — — —   | надпяточная — b. Achillea s.<br>supracalcanea.                                            | 59 |
| С. м.   | ногъ.                                                                                     | 55 |

С. м. пузырн. носкоплечевой м. — б. м.  
coraco - brachialis. - - - - - 28

---

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| С. м. п. м. отводящей большой перстъ.                                                    | 52 |
| — — — основноязычковой — m. circumflexi palati s. b. hamularis.                          | 25 |
| — — — осшнаго опросшка лопашки, или надсуставная — b. supraarticularis s. subacromialis. | 27 |

---

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Положение М. с. - - - - -                                                | 12 |
| С. м. посшоянныя persistentes. - - - - -                                 | 13 |
| Польза М. с. - - - - -                                                   | 20 |
| С. м. пузырный.                                                          | 15 |
| — подбородко - сосковой м.                                               |    |
| задняя — b. mastoidea. - - - - -                                         | 24 |
| — подлопашко бугорковой м.                                               |    |
| b. coracoidea s. subscapularis. - - - - -                                | 27 |
| — передняя внутренн., мыщелка берца.                                     | 38 |
| С. м. пузыр. подвздошно - вершевной м.                                   |    |
| меньшой. - - - - -                                                       | 36 |
| — — — — — внутренней.                                                    | 57 |
| — подколѣнниковая — b. infrapatellaris. - - - - -                        | 58 |
| — влаг. м. предберцовой клинной над-<br>плюсневой. - - - - -             | 59 |
| — пузыр. полусухожильной сѣдалищ-<br>ной предберцовой м. - - - - -       | 57 |
| — — — полуплевечной м.                                                   |    |
| — — — предколѣнная — b. patellaris. - - - - -                            | 58 |
| — — — предшазовая — b. puberalis. - - - - -                              | 55 |
| — — — предщипная или грудино-дуж-<br>ковой м. — b. thyreoidea. - - - - - | 26 |

---

|                  |                                                                                        |           |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| <b>С. м.</b>     | <b>рукъ.</b>                                                                           | - - - - - | 26 |
| <b>С. м.</b>     | <b>влаг. м.</b> разгибающей перстъ. -                                                  | -         | 53 |
| — — — — —        | <b>большой перстъ нижняя.</b> —                                                        | -         |    |
| — — — — —        | <b>мизинецъ собственнаяя.</b> 54                                                       | -         |    |
| — — — — —        | <b>большой палецъ длинной.</b> 40                                                      | -         |    |
| — — — — —        | <b>берцовой длинной над-<br/>пальцовой.</b> - - - - -                                  | -         |    |
| <b>С. м.</b>     | <b>пузыр.</b> реберно-надгрудниковая — б.                                              | -         |    |
|                  | <i>subclavia s. costo-clavicularis.</i> -                                              | -         | 26 |
| — — —            | <b>реберно-сосковой м.</b> <i>m. p. minoris.</i> 28                                    | -         |    |
| <b>С. м. вл.</b> | <b>Мм.</b> сгибающихъ пальцы общая. 41                                                 | -         |    |
| — — —            | <b>м.</b> — — большой перстъ виѣшняя. 50                                               | -         |    |
| — — —            | — — — — и всѣхъ Мм. средняя. 51                                                        | -         |    |
| — — —            | — — — — сухихъ жиль внутренняя. —                                                      | -         |    |
| — — —            | <b>м. сгиб.</b> — большой палецъ длинной. 42                                           | -         |    |
| — — —            | — — — — пальцы поверхняя. —                                                            | -         |    |
| <b>С. Мм.</b>    | <b>трубочная или влагалищная</b> — б. <i>mucosae vaginales, s. vaginae mucosae.</i> 16 | -         |    |
| — — —            | <b>верхняя разгибающей</b> длинной м. большей перстъ. - - - -                          | -         | 55 |
| — — —            | — — — — нижняя сухихъ жиль м. подкожной, сгибающей 4 перста. 51                        | -         |    |
| — — —            | — — — — общая Мм. трубочныхъ длинной и коронкой. - - - -                               | -         | 40 |
| — — —            | — — — — м. длинной сгибающей больш. палецъ пяточная. - - - -                           | -         | 41 |
| — — —            | — — — — сгибающихъ пальцы. - - - -                                                     | -         |    |
| <b>С. м.</b>     | <b>пузыр.</b> хребетной широкой м. — б. <i>m. latissimi dorsi.</i> - - -               | -         | 28 |
| <b>С. м. п.</b>  | <b>челюстная</b> междуупростковая — б. <i>masseterica.</i> - - -                       | -         | 25 |
| — — —            | <b>червообразныхъ</b> Мм. или между-перстия. - - -                                     | -         | 54 |



---

## ПОГРѢШНОСТИ

въ наукѣ о Монротныхъ Сумочкахъ.

Налечатано.

Читай.

Стран. Строк.

|    |    |               |          |
|----|----|---------------|----------|
| 21 | 15 | прочимъ       | прочихъ  |
| 25 | 4  | шѣла открыша. | шѣла.    |
| 59 | 17 | Ahyllea       | Achyllea |

---

ПРОДЛЕНІІ

ВІНОЧКУ СПІВАЮЩІМ О БОГІІ

ДЛЯ ДІТЕЙ

